



Îmbătrânire sănătoasă și demența.
O viață mai bună!

Interreg - IPA CBC
România - Serbia



FACTORI DE RISC MODIFICABILI ȘI PREVENIREA DEMENTEI

MODIFIED RISK FACTORS AND DEMENTIA PREVENTION

Violeta Moroșoi

Tatjana Voskresenski

Interreg - IPA CBC
România - Serbia



Cooperare dincolo de frontiere.

Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) și cofinanțat de statele partenere în program.



Promovarea ocupării forței de muncă
și servicii pentru creșterea incluziunii

Titlul proiectului: Îmbătrânirea și demența - o viață mai bună. (Cod e-MS: RORS-241)
Editorul materialului: Spitalul Județean de Urgență Reșița
Data publicării: iunie 2021

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
Pentru eventuale sesizări, contactați: romania: romania-serbia@mdrap.ro

www.romania-serbia.net



Spitalul Special pentru Boli Psihiatrice
"Dr Slavoljub Bakalović" Vârșet


SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ
Reșița

PRO MARKETING, REȘIȚA
2021

Violeta Moroşoi

Tatjana Voskresenski

**FACTORI DE RISC MODIFICABILI
ŞI
PREVENIREA DEMENTEI**



Violeta Moroșoi - autor

Tatjana Voskresenski - coautor

Liana-Oana Filimon - traducător limba engleză

Liubița Raichici - traducător limba sârbă

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

MOROȘOI, VIOLETA

**Factori de risc modificabili și Prevenția demenței = Modified
risk factors and dementia prevention /**

Violeta Moroșoi, Tatjana Voskresenski – Reșița, Pro Marketing, 2021

Contine bibliografie

ISBN 978-606-8022-51-2

I. Voskresenski, Tatiana

616

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE	8
INTRODUCERE	11
1. DATE GENERALE : DECLINUL COGNITIV ȘI DEMENTA - IMPACTUL ACESTORA ASUPRA VIEȚII ȘI SOCIETĂȚII	11
1.1 IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI.....	11
1.2. MOTIVAȚIA TEMATICII	12
2. ÎMBĂTRÂNIREA NATURALĂ A CREIERULUI – SENESCENTA.....	14
2.1 SCHIMBĂRILE STRUCTURALE ȘI FUNCȚIONALE ALE CREIERULUI ODATĂ CU ÎNAINȚAREA ÎN VÂRSTĂ	14
2.2 DOMENIILE SPECIFICE ALE COGNIȚIEI și exemple de procese cognitive care stau la baza acestor mecanisme	17
2.3 ÎMBĂTRÂNIREA NATURALĂ VS DEMENTĂ	18
3. FACTORI DE RISC ÎN DECLINUL COGNITIV MINOR ȘI DEMENTĂ	22
3.1 FACTORI DE RISC DOBÂNDIȚI MODIFICABILI	24
3.2 FACTORI DE RISC CARDIOVASCULAR	25
3.3 FACTORI DE RISC MAJORI MODIFICABILI ȘI NEMODIFICABILI ÎN BOALA ALZHEIMER	37
3.3.1 Factorii genetici	37
4.2 EPIDEMIOLOGIE. INDICATORI DEMOGRAFICI	45
4.3 ETIOLOGIE	45
4.4 CRITERII DE DIAGNOSTICE PENTRU MCI:	46
4.5 DECLINUL COGNITIV MINOR VASCULAR (VaMCI)	46
4.6 CORELAȚII NEUROIMAGISTICE – DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC AL MCI	47
4.7 PROGNOTICUL MCI	48
4.7.2 Factorii predictivi pentru virarea MCI către debutul demenței Alzheimer sunt:	49
4.8 TRATAMENTUL MCI.....	49
5. DEMENTA.....	51
5.1 DEFINIȚIE	51
5.2 CLASIFICARE.....	51
5.3 EPIDEMIOLOGIA DEMENTEI	52
5.4 DIAGNOSTICUL DEMENTEI	52

5.5 DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL AL SINDROMULUI DEMENTIAL (PSEUDODEMENTĂ):	53
6. DEMENTA VASCULARĂ	54
6.1 EPIDEMIOLOGIE VaD	54
6.2 ETIOLOGIA VaD. CORELAȚII NEUROPATHOLOGICE ȘI BIOLOGICE	55
6.3 CORELAȚII NEUROPATHOLOGICE-IMAGISTICE	55
6.4 DIAGNOSTIC POZITIV	56
6.4.1 Diagnosticul pozitiv de VaD probabilă:	56
6.4.2 Diagnosticul pozitiv de VaD posibilă	57
6.4.3 VaMCI instabil (variabil):	57
7. TRATAMENTUL CLASIC ÎN DEMENTĂ. NOI PERSPECTIVE TERAPEUTICE	59
7.1 MANAGEMENTUL FACTORILOR DE RISC	59
7.1.1 Prevenția primară se adresează factorilor de risc modificabili:	59
7.1.2 Prevenția secundară	59
7.2 TRATAMENTUL DEMENTEI	59
7.2.1 Tratatamentul nonfarmacologic	59
7.2.2. Tratatamentul farmacologic al Dementei	60
7.3 TRATAMENTUL ETIOLOGIC ÎN PSEUDODEMENTĂ	62
7.4 ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI CU DEMENTĂ	62
8. DIAGNOSTICUL PRECOCE AL DECLINULUI COGNITIV	64
8.1 IMPORTANȚA DETECTĂRII PRECOCE A DETERIORĂRII UȘOARE A FUNCȚIEI COGNITIVE	65
8.2 DIAGNOSTICUL PREZUMTIV AL DETERIORĂRII MINORE A FUNCȚIEI COGNITIVE	65
8.3 STADIUL PRECLINIC AL DEMENTEI ALZHEIMER	66
8.4 STADIUL DISFUNCȚIEI COGNITIVE UȘOARE	70
8.4.1 Simptomele demenței	70
8.4.2 Evaluarea medicală a unui pacient cu sindrom demential	71
8.4.3 Examinarea neuropsihologică:	72
8.4.4 Analize de laborator:	74
8.4.5 Investigații neuroimagistice:	74
8.5 AVANTAJELE DIAGNOSTICĂRII PRECOCE A DEMENTEI	75
9. ALCOOLUL ȘI CREIERUL. CONSUMUL EXCESIV DE ALCOOL – FACTOR DE RISC ÎN DEMENTĂ	76

9.1 CUM ESTE PROCESAT ALCOOLUL DE CĂTRE CORP	77
9.2 IMPACTUL ALCOOLULUI ASUPRA CREIERULUI.....	77
9.2.1 Structuri cerebrale afectate de alcool:.....	77
9.2.2. Efectele alcoolului asupra creierului.....	78
9.3 COMPLICAȚIILE NEUROLOGICE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL.....	79
9.4 ALTE COMPLICAȚII SOMATICE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL	80
9.5 TULBURĂRI PSIHIATRICE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL	81
10. PREVENȚIA ÎN DEMENȚĂ	84
10.1 Prevenția primară și secundară a declinului cognitiv și a demenței prin intervenție asupra factorilor de risc modificabili	86
10.2 Strategii recomandate pentru reducerea riscului de demență	93
BIBLIOGRAFIE	98
INTRODUCTION	108
1.1 GENERAL DATA: COGNITIVE DECLINE AND DEMENTIA - THEIR IMPACT ON LIFE AND SOCIETY.....	108
1.2 MOTIVATION OF THE TOPIC:	109
2. THE NATURAL AGING OF THE BRAIN – SENESCENCE	111
2.1 STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF THE BRAIN WITH AGING	111
3. RISK FACTORS IN MINOR COGNITIVE IMPAIRMENT AND DEMENTIA ..	119
3.1.MODIFIABLE ACQUIRED RISK FACTORS	120
3.1.1 Cardiovascular risk factors	121
3.2 MAJOR RISK FACTORS MODIFYING AND NON-MODIFYING ALZHEIMER'S DISEASE	132
3.2.1 Genetic factors.....	132
4. MINOR COGNITIVE DECLINE - MILD COGNITIVE IMPAIRMENT.....	139
4.1 MCI CLASSIFICATION	139
4.2 EPIDEMIOLOGY, DEMOGRAPHIC INDICATORS.....	140
4.3 ETIOLOGY	140
4.4 DIAGNOSTIC CRITERIA FOR MCI:	141
4.5 MINOR VASCULAR COGNITIVE DECLINE (VaMCI).....	141
4.6 NEUROIMAGING CORRELATIONS – RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF MCI	142
4.7 MCI PROGNOSIS.....	143
4.7.1 Predictive factors for the progression of MCI	143



4.7.2 Predictive factors for MCI's shift to the onset of Alzheimer's dementia are: ..	143
4.8 MCI TREATMENT	144
5. DEMENTIA	145
5.1 DEFINITION.....	145
5.2 CLASSIFICATION	145
5.2.1 After localization, dementia may be:	145
5.3 EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA	146
5.4 POSITIVE DIAGNOSIS OF DEMENTIA	146
6. VASCULAR DEMENTIA	148
6.1 EPIDEMIOLOGY OF VaD	148
6.2 VaD ETIOLOGY. NEUROPATHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CORRELATIONS.....	149
6.3 NEUROPATHO-IMAGING CORRELATIONS.....	150
6.4 POSITIVE DIAGNOSIS	150
6.4.1 Probable positive diagnosis of VaD:	151
6.4.3 Unstable (variable) VaMCI:.....	151
7. THE CLASSIC TREATMENT IN DEMENTIA. NEW THERAPEUTIC PERSPECTIVES	153
7.1 MANAGEMENT OF RISK FACTORS	153
7.1.1 Primary prevention	153
7.1.2 Secondary prevention	153
7.2 Dementia Treatment	153
7.2.1 Non-pharmacological treatment	153
7.2.2 Pharmacological treatment of Dementia.....	154
7.3 ETIOLOGICAL TREATMENT IN PSEUDODEMENTIA	156
8. EARLY DIAGNOSIS OF COGNITIVE IMPAIRMENT	157
8.1 THE IMPORTANCE OF EARLY DETECTION OF MILD IMPAIRMENT OF COGNITIVE FUNCTION	158
8.2 PRESUMPTIVE DIAGNOSIS OF MINOR IMPAIRMENT OF COGNITIVE FUNCTION	158
8.3 PRECLINICAL STAGE OF ALZHEIMER'S DEMENTIA	159
8.4 STAGE OF MILD COGNITIVE DYSFUNCTION	162
8.4.1 Symptoms of dementia	162
8.4.2 Medical evaluation of a patient with dementia syndrome	163
8.4.3 Neuropsychological examination:	164

8.4.4 Laboratory tests:	166
8.4.5 Neuroimaging investigations:	167
8.5 BENEFITS OF EARLY DIAGNOSIS OF DEMENTIA	167
9.ALCOHOL AND THE BRAIN EXCESSIVE ALCOHOL CONSUMPTION - RISK FACTOR IN DEMENTIA	169
9.2 THE IMPACT OF ALCOHOL ON THE BRAIN	170
9.2.1 Brain structures affected by alcohol:	170
9.2.2 The effects of alcohol on the brain	171
9.3 NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF ALCOHOL CONSUMPTION	172
9.4 OTHER SOMATIC COMPLICATIONS OF ALCOHOL CONSUMPTION	173
9.5 PSYCHIATRIC DISORDERS ASSOCIATED WITH ALCOHOL CONSUMPTION	174
10.DEMENTIA PREVENTION	177
10.1 Primary and secondary prevention of cognitive decline and dementia through intervention on modifiable risk factors . Possible brain mechanisms for improving or maintaining cognitive reserve and reducing the risk of potentially modifiable risk factors in dementia	179
10.2 RECOMMENDED STRATEGIES TO REDUCE THE RISK OF DEMENTIA	185

CUVÂNT ÎNAINTE

Europa se confruntă cu provocarea enormă de a oferi o calitate optimă a vieții cetățenilor de toate vârstele. Categoria de vârstnici este una specială și este tratată special și de Instituțiile Europene. Este o provocare pentru țările membre să abordeze problemele vârstnicilor într-un mod eficient. În cadrul provocărilor datorate diverselor boli cu care se confruntă persoanele vârstnice, bolile mintale constituie o provocare cheie. Demența este una dintre cele mai frecvente boli mintale care nu sunt încă vindecabile. În UE, în ansamblu, se preconizează că speranța de viață va crește în următorii ani, până în 2080 de la 65 de ani, cât era în 2015, cu șase ani și o lună pentru bărbați și cu șase ani și șase luni pentru femei. Ca o consecință a creșterii speranței de viață și a îmbătrânirii populației, previziunile de prevalență și incidență indică faptul că numărul persoanelor cu demență va fi în creștere în următorii ani.

Colaborarea internațională în cercetare și fluxul de cunoștințe peste granițele naționale sunt esențiale, în condițiile în care trebuie găsite soluții viabile în cazul acestor provocări, care sunt globale. În regiunea de frontieră, stilul de viață al locuitorilor este asemănător, la fel și situația socio-economică, astfel încât problemele medicale sunt similare. Din acest considerent rezultă o nevoie de cooperare pentru găsirea de soluții la probleme comune.

Plecând de la o situație concretă, creșterea speranței de viață, creșterea populației îmbătrânite va duce implicit și la creșterea numărului populației cu boli degenerative precum demența. Din păcate în acest moment nu există nici un remediu pentru demență. Prin urmare, prevenirea primară este foarte importantă. Mulți factori au fost asociați cu demența și orice lucru care poate ajuta la prevenirea demenței este important.

Mai multe studii recente au proiectat că până la 30% din cazurile de demență pot fi prevenite prin direcționarea factorilor de risc modificabili.

Studiile bazate pe populație arată că, deși numărul total de cazuri de demență este în creștere, ratele de incidență specifice vârstei sunt în scădere în paralel cu reducerile la nivel de populație ale factorilor de risc precum educația scăzută, fumatul, bolile cardiovasculare etc.

Scopul publicării acestei lucrări este multiplu: creșterea nivelului de conștientizare a faptului că factorii de risc pot reduce apariția sau încetinirea dezvoltării

demenței, prezentarea unui public mai larg, educația, schimbarea stilului de viață (activitatea fizică și socială, reducerea riscului vascular, dieta, renunțarea la fumat sau la consumul de alcool) sunt determinante în reducerea riscului de demență. Lucrarea se adresează atât personalului de specialitate cât și publicului larg, care poate înțelege care sunt riscurile, dar și cum se poate aborda tratamentul unei persoane cu demență, cum se poate schimba viața unei astfel de persoane, dar și a unei familii care are un membru afectat de această boală.

Prin publicarea acestei lucrări, Uniunea Europeană contribuie direct la îmbunătățirea vieții oamenilor din zona transfrontalieră, în acest caz din județele Caraș-Severin și Vojevodina.

Această publicație este finanțată de Uniunea Europeană în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia prin proiectul „ÎMBĂTRÂNIRE SĂNĂTOASĂ ȘI DEMENTĂ - O VIAȚĂ MAI BUNĂ” cod RORS 241

Parteneri în cadrul acestui proiect:

- Spitalul de boli psihice " Dr Slavoljub Bakalovic" Vrsac, Serbia – lider de proiect
- Spitalul Județean de Urgență Reșița

Obiectivul general al proiectului este „Îmbunătățirea calității vieții pentru pacienții cu demență din zona transfrontalieră”.

Obiectivele specifice sunt: creșterea capacității spitalului din Vrsac, identificarea factorilor de risc majori pentru demență în regiunea de frontieră și reducerea riscului de stigmatizare și de excludere socială a pacienților cu demență.

Colectivul de implementare al proiectului

Îmbătrânirea și demența - o viață mai bună.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și statele partenere.



INTRODUCERE

1. DATE GENERALE : DECLINUL COGNITIV ȘI DEMENTA - IMPACTUL ACESTORA ASUPRA VIEȚII ȘI SOCIETĂȚII

1.1 IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI

Demența cu diferitele ei subtipuri, reprezintă o categorie largă de boli cerebrale cu evoluție cronică, caracterizată prin regresie cognitivă globală progresivă și ireversibilă, afectând funcționalitatea zilnică, ducând deseori la invaliditate permanentă și chiar moarte prematură; de regulă, asociază o gamă variată de simptome neuropsihice – tulburări emoționale, de personalitate, precum și simptome psihiatrice (depresie, tulburări psihotice, tulburări comportamentale). Funcția cognitivă cuprinde cinci sectoare/domenii: învățarea și memoria, limbajul, percepția vizuo-spațială, executiv și psihomotor, toate acestea fiind afectate în grade diferite în declinul cognitiv minor (MCI-mild cognitive impairment) și în demență.

Este o problemă de foarte mare importanță socială, medicală, etică, economico-financiară și chiar culturală întrucât constituie una dintre cele mai mari cauze de invaliditate în cadrul populației vârstnice fiind frecvent asociată cu semnificative dizabilități psihice, psihiatrice și sociale.

IMPACTUL SOCIAL AL DEMENTEI: demența a devenit o problemă majoră de sănătate publică la nivel global, în multe țări tratarea și îngrijirea bolnavilor cu demență se consideră a fi o prioritate națională, investindu-se în cercetare, educație sanitară, asistență și servicii sociale. Costul social al demenței este foarte mare, fiind suportat atât de către familie cât și de către societate. Magnitudinea impactului social al demenței derivă și din numărul imens de persoane afectate la nivel global (potrivit OMS, în anul 2012 existau aproximativ 35,6 milioane de persoane cu demență, iar în anul 2015 numărul acestora a ajuns la 47,5 milioane, anticipându-se faptul că numărul lor se va tripla în anul 2050). În fiecare an apar 7,7 milioane de noi cazuri de demență, impunând o povară enormă familiei, îngrijitorilor primari, asistenților sociali și costurilor financiare pentru societate. De asemenea, s-a constatat că cca 3% din populația cu vârstă cuprinsă între 65-74 ani, 19% din grupa de vârstă 75-84 ani și aproape 50% din cei peste 85 ani, prezintă demență. Prevalența demenței variază între 5-10% la persoanele peste 65 de ani, prevalența bolii Alzheimer se dublează la fiecare 4,3 ani, iar prevalența Demenței vasculare se dublează la fiecare 5,3 ani. În anul 2013 s-au înregistrat 1,7

milioane de decese datorate demenței, comparativ cu 0,8 milioane decese în anul 1990. Demența rămâne o boală covârșitoare și costisitoare.

IMPACTUL ECONOMIC-FINANCIAR AL DEMENTEI: costurile economice cu tratamentul, întreținerea și îngrijirea acestor bolnavi sunt uriașe, motiv pentru care reprezintă o covârșitoare povară pentru societatea umană. Se consideră că se cheltuiesc cca 604 bilioane USD/an în SUA, acest cost depășindu-l pe cel al costurilor pentru cancer și bolile cardiace (Hurd et al.2013) și cca 55 bilioane EURO/an în Europa.

IMPACTUL MEDICAL AL DEMENTEI: în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani în domeniul etiopatogeniei demențelor de diferite tipuri, în realitate s-a reușit doar perfectarea și dezvoltarea clasificării demențelor, fără prea mare valoare practică, întrucât nu s-au descoperit medicamente pentru a preveni sau vindeca demența; nu există un tratament specific pentru demență -INHIBITORII DE ACETILCOLINESTERAZĂ (Donepezil) se utilizează în formele ușoare și moderate, dar beneficiul terapeutic este minor și pot apare efecte adverse ca bradicardia sau sincopa; BLOCANȚII RECEPTORILOR NMDA- Memantina- pot fi utili și benefici, dar dovezile sunt mai puțin concludente decât pentru inhibitorii de acetilcolinesterază; cele două categorii terapeutice se pot combina, dar eficiența este foarte redusă. Pentru tratamentul simptomatic - tulburările comportamentale se pot folosi antipsihotice, dar acestea nu influențează procesul de bază al bolii, putând avea chiar efecte adverse severe- AVC sau chiar decesul. Alte măsuri care pot ameliora calitatea vieții acestor bolnavi sunt intervențiile cognitive și comportamentale, terapia paliativă.

IMPACTUL ETIC ȘI CULTURAL AL DEMENTEI: pacienții cu demență sunt stigmatizați social și datorită faptului că sunt deseori total dependenți, mulți dintre ei putând supraviețui atâta timp cât există sprijin din partea societății, în unele țări existând chiar strategii naționale pentru managementul acestor bolnavi.

1.2. MOTIVAȚIA TEMATICII

Data fiind frecvența crescută a demenței în rândul populației (46 de milioane persoane afectate în anul 2015), caracterul invalidant al acestei afecțiuni până la dependență funcțională totală, riscul mare de deces, costurile sociale enorme, precum și lipsa unui tratament specific etiopatogenic adresat ținând procesului patologic de bază și având în vedere faptul că aceste medicamente unanim acceptate pentru terapia demenței nu numai că aduc un beneficiu minor, dar ele sunt comercializate și la prețuri exorbitante, iar în România sunt necesare aprobări speciale din partea Casei de Asigurări pentru prescrierea acestora, venim în întâmpinarea acestor probleme cu o posibilă strategie, eficientă și mai puțin costisitoare, și anume: prevenirea demenței și a declinului cognitiv prin intervenția asupra factorilor de risc modificabili ai acestora „**Praevenire melius est quam curare**”.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă țărilor membre să dezvolte politici publice multi-sectoriale cuprinzătoare pentru a îmbunătăți calitatea vieții

pacienților, a le crește accesul echitabil la servicii și a reduce stigma și izolarea socială cu care se confruntă pacienții și îngrijitorii lor. De asemenea, OMS a inițiat procesul de pregătire a unor recomandări pentru reducerea riscului de declin cognitiv și demență. Studiile au arătat existența unei legături între riscul de apariție a declinului cognitiv și a demenței și factori de risc legați de stilul de viață, precum lipsa de activitate fizică, fumatul, dietele nesănătoase și abuzul de alcool. Câteva condiții medicale sunt asociate cu un risc crescut de apariție a demenței, inclusiv hipertensiunea arterială, diabetul, hipercolesteromia, obezitatea și depresia. Alți factori de risc care pot fi potențial modificați sunt izolarea socială și inactivitatea cognitivă.

De un interes crescut este evaluarea factorilor de risc și a factorilor protectivi, în vederea promovării sănătății cerebrale și cognitive până la bătrânețe; existența factorilor de risc și a celor protectivi, explică în mare parte variațiile interindividuale referitoare la performanța cognitivă și modificările structurale cerebrale în rândul populației adulte.

De asemenea, existența tuturor acestor factori potențial modificabili înseamnă că prevenția demenței este posibilă prin abordări de sănătate publică, inclusiv implementarea unor intervenții cheie care întârzie apariția sau evoluția declinului cognitiv sau al demenței. Astfel, reducerea riscului de apariție a demenței a devenit unul dintre cele 7 domenii strategice de intervenție din planul global de acțiune 2017-2025 cu privire la răspunsul de sănătate publică pentru problema demenței.

2. ÎMBĂTRÂNIREA NATURALĂ A CREIERULUI – SENESCENTA

Modificările structurale cerebrale legate de vârstă, cum ar fi scăderea volumului hipocampal, lobului frontal și temporal, reprezintă un aspect comun a îmbătrânirii naturale care contribuie la unele schimbări ale proceselor neurocognitive.

Aspectele majore ale funcției cognitive umane sunt influențate de o varietate de factori, printre care moștenirea genetică, stilul de viață, alimentația, bolile, traumele, medicamentele, precum și îmbătrânirea normală și patologică. S-a constatat că un declin notabil al funcției neurocognitive corelat cu vârsta, are loc la persoanele sănătoase începând de la vârsta de 20 de ani și continuă de-a lungul vieții adulte.

Acest declin apare la toți indivizii, cuprinzând o gamă largă de aspecte majore ale funcției cognitive: memoria, gândirea coerentă și fluidă, viteza de procesare a informației, atenția, memoria nondeclarativă, limbajul, abilitățile visuospatiale, abilitățile raționale, funcția executivă. Schimbările cognitive ca proces normal de îmbătrânire au fost bine documentate în literatura științifică. Unele abilități cognitive, cum ar fi: vocabularul, sunt rezistente la trecerea timpului și pot chiar să se îmbunătățească odată cu vârsta. Alte abilități, cum ar fi raționamentul conceptual, memoria și viteza de procesare, scad treptat în timp. Există o heterogenitate semnificativă în rândul adulților, pe măsură ce înaintează în vârstă, în rata de scădere a unor abilități, ca de exemplu capacitatea de raționament perceptiv și viteza de procesare a informației, această diferențiere fiind dictată de multipli factori individuali care influențează dotarea cognitivă (genetici și dobândiți).


2.1 SCHIMBĂRILE STRUCTURALE ȘI FUNCȚIONALE ALE CREIERULUI ODATĂ CU ÎNAINȚAREA ÎN VÂRSTĂ

Odată cu înaintarea în vârstă, creierul suferă modificări de structură și funcție; reducerea volumului cerebral este bine documentată, înregistrându-se o scădere anuală de 0,2-0,5% (Hedman et al. 2012); astfel, după 60 de ani se constată scăderea sa în volum cu 7-9 %, reducerea greutateii sale cu 100-150 g, lărgirea șanțurilor corticale și a ventriculilor cerebrali. Aceste modificări sunt semne ale atrofiei corticale (=atrofia neuronilor cu pierderea conexiunilor dintre ei).

Adulții pierd în mod normal 100.000 neuroni pe zi, de-a lungul vieții pierderea neuronală fiind doar de 10%; se consideră că nu pierderea neuronilor e responsabilă de tulburările de memorie, ci atrofia acestora și pierderea conexiunilor dintre ei.


În mod tradițional, lobul Frontal este considerat cel mai vulnerabil la schimbările normale ale îmbătrânirii, inspirând teoria Frontală a degradării cognitive.

Actual, se consideră că reducerea ariilor Temporale la vârstnicii sănătoși, este comparabilă ca magnitudine cu schimbările Frontale, înregistrându-se o rată anuală a atrofiei de 0,79% - 2% pentru hipocamp și de 0,3% - 2,4% pentru cortexul entorinal – Aria 28 Brodman (Fjell et al.2009). Cortexul entorinal este un releu între hipocamp și ariile asociative, are conexiuni cu aria prefrontală (activând regiunea ventrolaterală prefrontală) și asigură performanța memoriei episodice;



În unele cazuri aceste modificări pot să nu determine simptome clinic evidente, datorită capacității compensatorii importante a creierului, care maschează anumite modificări și întârzie manifestarea declinului. Creierul are o mare capacitate de plasticitate, de reparare a deteriorărilor apărute și de remodelare corticală. S-a constatat ca procesul de formare a noi neuroni persistă și în decada a 8-a de viață; neurogeneza în creierul adult este limitată la girusul dentat al hipocampusului și bulbul olfactiv.

Se consideră că în timp ce îmbătrânirea normală afectează sistemul Fronto-Striat, important pentru controlul cogniției și pentru funcția executivă, Demența Alzheimer are efecte adiționale pe circuitele Temporo-Parietale, esențiale pentru memoria episodică (A. Fjell, 2014).



Rețele fronto-striatale vs. temporo-parietale

MODIFICĂRI BIOCHIMICE ȘI METABOLICE:

1. pierderea importanță a receptorilor de care se leagă neurotransmițătorii;
2. reducerea activității sistemului colinergic (acetilcolina);
3. scăderea sintezei de dopamină și noradrenalină, scăderea hormonilor eliberați de hipofiză (cortizol și hormoni sexuali);
4. reducerea noradrenalinei față de serotonină, care rămâne la un nivel constant, duce la depresii noradrenergice și tulburări de somn;

Volumul materiei cenușii scade

Volumul de materie cenușie începe să scadă după vârsta de 20 de ani. Atrofierea este cea mai avansată în cortexul prefrontal, iar modificările legate de vârstă în lobii temporali sunt mai moderate și implică scăderea volumului hipocampului.

Dimensiunea neuronală și densitatea sinaptică

În ciuda numeroaselor teorii care explică pierderea neuronală, scăderea volumului materiei cenușii la adulții mai în vârstă este cel mai bine explicată nu prin moartea neuronilor, ci prin scăderea dimensiunii acestora și a numărului de conexiuni dintre ei. Neuronii suferă modificări morfologice, o scădere a complexității arborizării dendritice, a lungimii dendritelor și o diminuare a prelungirilor dendritice, locurile majore pentru sinapsele excitabile. Aceste modificări morfologice contribuie direct la reducerea densității sinaptice. Cele mai importante proprietăți ale creierului sunt percepția informațiilor, prelucrarea, memorarea și recuperarea acestora din memorie, **cortexul prefrontal** fiind responsabil pentru toate aceste procese.

Problemele legate de activitatea cortexului prefrontal pot fi ușor recunoscute dar aceste semne nu sunt specifice, pot fi cauzate și de alte boli: probleme de atenție, erori de interpretare, imposibilitatea de planificare și implementare a planului, dezorganizare.

Hipocampusul este structura cerebrală care permite învățarea și păstrarea informațiilor, având un rol important în trecerea informației din memoria de scurtă durată în memoria de lungă durată, precum și în navigarea în spațiu. Afectarea hipocampusului conduce la simptome inițiale de pierdere a memoriei și dezorientare.

Substanța albă

Volumul materiei albe scade mult mai mult decât volumul materiei cenușii odată cu înaintarea în vârstă (girusul precentral, girusul drept, corpul calos, girusul parahipocampal). În plus față de modificările din structura materiei albe, s-a observat în vivo și un declin funcțional al substanței albe prin alterarea integrității ei odată cu înaintarea în vârstă (Madden et al).

Integritatea sistemului nervos central este reflectată de performanța funcțiilor cognitive – fiecare funcție referindu-se la o regiune diferită a creierului. Afectarea funcțiilor cognitive apare pe măsura înaintării în vârstă, dar poate fi întâlnită în corelație cu diferite boli și situații (depresie, delir, în urma unei leziuni cerebrale traumatice, a unei infecții sau consumului de substanțe – alcool, cocaină).

2.2 DOMENIILE SPECIFICE ALE COGNIȚIEI și exemple de procese cognitive care stau la baza acestor mecanisme

Cogniții sociale Răspunsul la stimuli induși de emoții	Identificarea emoțiilor Recunoașterea emoțiilor la nivelul expresiilor faciale	Bias emoțional Biasuri la nivelul procesării informației referitor la stimuli pozitivi/negativi
Funcții executive Gândire de nivel superior/ raționament complex și procesul de luare a deciziilor	Flexibilitatea mentală Capacitatea de a se adapta la nivel comportamental și ideativ Memoria de lucru Strategie	Planificare Rezolvarea problemelor Inhibiția la nivel de răspuns Capacitatea de a elimina răspunsurile greșite/inadaptate
Memorie Stocarea informației pe termen lung sau scurt	Memoria episodică Capacitatea de a asocia un eveniment cu un anumit loc și o anumită perioadă Memoria senzorială Recunoașterea unor imagini, obiecte și informații vizuospatiale	Memoria de lucru Stocarea și manipularea informației pe scurtă durată
Atenție Capacitatea de a se concentra pe o anumită informație și a le ignora pe celelalte (atenție selectivă)	Atenția susținută Capacitatea de a se concentra în mod continuu	
Viteza pe plan psihomotor Capacitatea de a detecta și a răspunde la prezența unui stimul	Timpul de reacție Timpul de reacție în fața a mai multor stimuli, nivelul de vigilență	

Evaluarea cognitivă reprezintă măsurarea obiectivă a abilităților cognitive distincte, cum ar fi memoria de lucru, inhibiția, flexibilitatea cognitivă, viteza psihomotorie și atenția susținută. Cunoașterea poate fi măsurată folosind o varietate de metode, cu nivele diferite de obiectivitate și sensibilitate.

Numeroase schimbări legate de vârstă în abilitățile cognitive sunt relevante pentru activitățile de zi cu zi și au o importanță socială substanțială. De exemplu, scăderea abilităților cognitive crește riscul ca adulții în vârstă să facă erori în deciziile financiare și să sufere fraude și abuzuri financiare. Modificările legate de vârstă în cunoaștere pot

afecta performanțele de conducere a autovehiculelor, care aduc după sine implicații asupra siguranței și sănătății publice. Cercetările curente indică faptul că modificările legate de vârstă în procesele cognitive afectează performanța pe sarcini bazate pe tehnologie, cum ar fi căutarea pe Internet a informațiilor despre sănătate. Având în vedere utilizarea omniprezentă a computerelor și a internetului pentru multe interacțiuni de rutină în afaceri, servicii publice și evenimente sociale, declinul cognitiv, natural, determinat de înaintarea în vârstă are implicații substanțiale pentru capacitatea adulților de a participa în multe domenii ale vieții.

2.3 ÎMBĂTRÂNIREA NATURALĂ VS DEMENTĂ


Scăderea abilităților cognitive specifice – viteza de procesare, funcția executivă și memoria episodică sunt experiențe comune procesului de îmbătrânire, în timp ce abilitățile verbale și înțelegerea sunt, tipic, menținute. Dar trebuie reținut și faptul că cele trei semne majore ale demenței Alzheimer (AD) – perturbarea funcționalității memoriei episodice, atrofia cerebrală și acumularea proteinelor amiloidice – au fost identificate și în rândul bătrânilor prezumtiv sănătoși. Există un pattern relativ al atrofiei cerebrale în demența Alzheimer, prin afectarea inițială a unor arii specifice care implică cortexul entorinal și hipocampusul, extinzându-se ulterior în ariile asociative Parietal medial, Temporal lateral și în regiunile Frontale, cuprinzând în stadii avansate, toate regiunile cortexului.

Rata reducerii volumetrică corticale este mai mult decât dublă în MCI (Mild Cognitive Impairment) decât la vârstnicii sănătoși, iar în AD, rata atrofiei este de peste trei ori mai mare. Astfel, putem considera că localizarea atrofiei cerebrale, precum și amploarea acesteia, pot fi utilizate pentru diferențierea îmbătrânirii normale de demență (AD). Rata atrofiei cerebrale la nivelul hipocampusului și a cortexului entorinal diferențiază cel mai bine AD de normal, aceste arii Temporale fiind dominante în patternul riscului pentru AD, iar pentru vârstnicii sănătoși, patternul este afectarea cortexului prefrontal, în special partea orbitofrontală.

Provocarea identificării limitelor dintre modificările cognitive asociate cu îmbătrânirea naturală creierului și cele asociate cu demențele neurodegenerative, inclusiv boala Alzheimer este o preocupare constantă a lumii medicale.

Este destul de dificilă identificarea limitei dintre declinul cognitiv natural și faza inițială a unei tulburări neurodegenerative, însă există suficiente cunoștințe referitoare la declinul cognitiv natural pentru a susține distingerea de neurodegenerare. În domeniul tulburărilor neurocognitive, de exemplu, sindromul de insuficiență cognitivă ușoară (MCI) este considerat o fază intermediară de diagnostic clinic între momentul în care

funcția cognitivă a unui individ se încadrează în intervalul normal și momentul în care persoana respectivă îndeplinește criteriile pentru demență. Deși au fost stabilite criterii de consens care sunt utilizate pe scară largă, rămâne o provocare pentru a determina limita dintre îmbătrânirea cognitivă naturală și MCI.



Demența este adesea acceptată ca parte din procesul obișnuit de îmbătrânire, dar doar pentru că oamenii îmbătrânesc, nu înseamnă că vor dezvolta demență.

Diferența dintre declinul cognitiv normal și demența. Modificări clinice și de personalitate la vârstnici. Simptome

Simptomele declinului cognitiv normal includ:

- imposibilitatea de amintire a fiecărui detaliu al unei conversații;
- uitarea numelui unui prieten;
- dificultăți în găsirea cuvintelor potrivite și conștientizarea faptului că memoria se poate înrăutăți;
- scade abilitatea de învățare și de reținere a unor informații noi;
- scade memoria de lucru și viteza de procesare a informațiilor;
- 25-50% dintre vârstnicii peste 65 de ani percep un declin al memoriei și funcționării intelectuale;
- individul poate deveni egocentric, conservator, apatic, iritabil;
- apar dificultăți de adaptare, de acceptare a criticii, suspiciozitate.

Deficitul cognitiv ușor

- reprezintă un declin al funcțiilor cognitive de intensitate mai mare decât ar justifica vârsta și gradul de instrucție al persoanei, dar fără a se ajunge la nivelul celui din demență;

- se întâlnește la 10-15% din populația vârstnică și poate rămâne staționar sau poate evolua spre demență;
- există o alterare cognitivă evidentă pentru cei din jur, dar activitatea pacientului este păstrată;
- apar tulburări de memorie, atenție, limbaj, performanța pacientului la testele psihologice fiind diminuată.

Simptomele demenței includ:

- uitarea întregă a conversațiilor;
- uitarea numelor membrilor familiei;
- înlocuirea cuvintelor incorecte cu propoziții;
- ignorarea problemelor potențiale de memorie.

Simptomele de demență afectează negativ viața de zi cu zi a unei persoane, diminuând capacitatea lor de a trăi independent. În cazul îmbătrânirii normale a creierului, deși pot avea pierderi de memorie, persoanele respective pot trăi singure și pot îndeplini sarcini zilnice. Deficiența de memorie asociată vârstei și demența pot fi diferențiate în mai multe moduri.

Declinul cognitiv normal datorat înaintării în vârstă	Demența
Persoana nu-și poate aminti detaliile despre o conversație sau un eveniment care a avut loc acum un an	Persoana nu reușește să-și reamintească detalii despre evenimentele sau conversațiile recente
Nu-și mai amintește numele unei cunoștințe	Nu recunoaște sau nu mai știe numele membrilor familiei
Uită lucruri și evenimente ocazional	Uită lucruri sau evenimente mai frecvent
Ocazional întâmpină dificultăți în găsirea cuvintelor	Pauze mari și înlocuiri frecvente la găsirea cuvintelor
Persoana este îngrijorată de memoria sa, dar de la apropiate nu sunt	Rudele apropiate sunt îngrijorate de memoria persoanei, dar nu sunt conștiente de existența unor probleme

Ce simptome trebuie urmărite:

- Frecvente rătăcirii în locuri familiare;
- Întrebări repetate;
- Comportamente ciudate sau nepotrivite cu contextul;
- Uitarea evenimentelor recente;
- Căderi repetate sau pierderi de echilibru;
- Schimbări de personalitate;
- Declin în planificare și organizare;
- Modificări ale alimentației/obiceiurilor alimentare;
- Modificări ale igienei;
- Creșterea apatiei;
- Modificări ale abilităților lingvistice, inclusiv înțelegerea;

Progresia deficitelor cognitive observate în condiții cum ar fi boala Alzheimer poate fi accelerată în câțiva ani înainte de diagnosticare. Astfel, este important să se efectueze verificări medicale regulate pentru a monitoriza amploarea și severitatea tulburărilor cognitive. Viața independentă nu este compromisă în timpul îmbătrânirii normale, spre deosebire de trecerea la o stare neurodegenerativă.



3. FACTORI DE RISC ÎN DECLINUL COGNITIV MINOR ȘI DEMENTĂ

În anul 2015 se înregistra un număr de 47 milioane de persoane cu demență, estimându-se că acest număr se va tripla în anul 2050; în fiecare an apar zece milioane de cazuri noi, arată cifrele OMS. Până în anul 2030, costul îngrijirii bolnavilor ar urma să depășească 2.000 de miliarde de dolari. Având în vedere faptul că nu există încă un tratament adecvat al demenței, care să vindece sau să modifice evoluția bolii, demența fiind încă o boală fără tratament, este salutară intervenția asupra factorilor de risc ai declinului cognitiv, prin diminuarea sau eliminarea acestora.

Boala Alzheimer reprezintă cel mai comun tip de demență (60-70% din toate cazurile de demență) și afectează cca 27 milioane de persoane. Manifestările clinice tipice ale acestei afecțiuni constau în pierderea progresivă a memoriei episodice și a funcțiilor cognitive, deficiențe ale limbajului și ale abilităților vizuospatiale. Se asociază frecvent și tulburări comportamentale: apatie, depresie, agresivitate. Apariția bolii are un imens impact asupra vieții sociale și de familie, însă presupune și cheltuieli financiare uriașe din partea societății.

Se estimează că aproximativ 50 de milioane de oameni din întreaga lume au o formă de demență, dar în momentul actual, încă nu se cunosc cu exactitate cauzele acestei afecțiuni cu foarte multe forme; se consideră că 70% din riscul de a dezvolta boala Alzheimer este reprezentat de cauze genetice. Ghidul de prevenire publicat de OMS punctează 12 factori de risc din stilul de viață și oferă sfaturi referitoare la modul de abordare a acestora. „În următorii 30 de ani, numărul persoanelor cu demență este de așteptat să se tripleze. (...) Trebuie să facem tot ce putem pentru a reduce riscul de demență. Dovezile științifice adunate pentru aceste linii directoare confirmă ceea ce am suspectat de ceva timp, că ceea ce este bun pentru inima noastră este, de asemenea, bun și pentru creierul nostru” puncta, la lansarea ghidului, directorul general al OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Până la identificarea unui tratament eficient al declinului cognitiv și al demenței, reducerea riscului reprezintă o strategie fundamentală pentru diminuarea numărului de pacienți cu aceste afecțiuni.

12 Factori care duc la apariția demenței

„În mod crucial, în timp ce vârsta este cel mai puternic factor de risc cunoscut pentru declinul cognitiv, demența nu este o consecință naturală sau inevitabilă a îmbătrânirii. Mai multe studii recente au arătat o relație între dezvoltarea insuficienței cognitive și demenței cu mai mulți factori de risc legați de stilul de viață”, notează experții OMS în noile linii directoare intitulate „reducerea riscului de declin cognitiv și demență”. Sunt evaluați 12 posibili factori de risc pentru demență și se recomandă sfaturi cu privire la modul de abordare a fiecăruia dintre aceștia. Acești factori posibili care favorizează apariția unei forme de demență sunt: niveluri


scăzute de activitate fizică, fumatul, o dietă săracă, abuzul de alcool, rezervă cognitivă insuficientă sau afectată (capacitatea creierului de a compensa problemele neurale), lipsa activității sociale, creșterea nesănătoasă în greutate, hipertensiunea, diabetul, dislipidemia (niveluri nesănătoase de colesterol), depresia și pierderea auzului.

„Prevenirea demenței este posibilă”

Existența unor factori de risc potențial modificabili înseamnă că prevenirea demenței este posibilă printr-o abordare a sănătății publice, inclusiv punerea în aplicare a intervențiilor-cheie care întârzie sau încetinesc declinul cognitiv sau demența", susține documentul oficial al OMS.

Se consideră ca factori majori de risc pentru boala Alzheimer și alte demențe: vârsta, istoricul familial (antecedente heredocolaterale) și susceptibilitatea genetică (prezența Apolipoproteinei E—alelele Epsilon 4). Niciunul din acești factori de risc nu pot fi modificați în momentul actual de un anume tip de intervenție medicală sau de schimbarea comportamentului individual. Asociat, există factori de risc dobândiți care cresc riscul dezvoltării demenței, dar care pot fi modificați și influențați, diminuând în acest fel riscul declinului cognitiv.

3.1 FACTORI DE RISC DOBÂNDIȚI MODIFICABILI



COGNITIVE DECLINE




KEY:    

Dovezi privind factorii de risc pentru declinul cognitiv



DEMENTIA



KEY:    

3.2 FACTORI DE RISC CARDIOVASCULAR

Riscul cardiovascular se referă în principiu la procesele de ateroscleroză ce antrenează subsecvent un aport deficitar de oxigen și nutrienți la nivelul organelor și țesuturilor corpului uman. Pe lângă efectul cronic, deteriorativ în timp, degenerativ, accelerarea procesului aterosclerotic constituie și platforma pe care survin afectări cardiovasculare acute, coronariene și cerebrale (Accidentul Vascular Cerebral acut). Ca urmare, se consideră că intervențiile medicale pentru limitarea acestora sunt esențiale, configurarea unui profil complet de risc cardiovascular fiind de mare importanță și utilitate practică. Analiza într-un algoritm complex și complet a acestui profil, și nu simpla sumare a unor patologii specifice, oferă o imagine adecvată asupra riscului de accident vascular cerebral sau coronarian acut pentru un pacient. În această evaluare intră în calcul nu numai boli, ci și alți parametri ce țin de bolnav (vârstă, sex, predispoziție ereditară). Rezultă un conglomerat de boli și caracteristici ale pacientului a căror identificare permite o profilaxie primară și secundară pentru bolile cardiovasculare. Factorii de risc cardiovasculari nu sunt nici agenți etiologici, nici markeri de boală (aceștia relevând existența bolii și nu riscul ca aceasta să se producă), factorii de risc cardiovascular reprezintă condiții ce se asociază cu un risc crescut de dezvoltare a bolilor cardiovasculare. Cuantificarea factorilor de risc permite aprecierea exactă a riscului de boală cardiovasculară.

Există factori de risc **majori** (a căror asociere cu riscul de boală cardiovasculară a fost înalt semnificativ)

Factori de risc **contribuitori** (care cresc riscul CV într-o manieră mai puțin semnificativă)

Factori de risc **modificabili** (care pot fi controlați prin dietă sau tratament: fumat, obezitate, dislipidemie, diabet zaharat, HTA)

Factori de risc **nemodificabili** (sex, vârstă, statură, înălțime, ereditate)

Factori de risc **noi** (pentru care există studii mai recente și care pot fi implicați în diverse puncte ale verigii fiziopatogenice: lipoproteina a, homocisteina, factori proinflamatori sau protrombotici)

Clasificarea factorilor de risc cardiovascular:


Există mai multe tipuri de clasificare a factorilor de risc cardiovascular:

A. Factori de risc: modificabili sau nemodificabili

Nemodificabili: vârsta, sexul, istoricul familial de boală cardiovasculară cu debut precoce (prezența manifestărilor aterosclerotice la rudele de gradul I la vârste de sub 65 ani pentru femei și sub 55 ani pentru rudele de sex masculin).



Modificabili: *fumat, alcool, obezitate, dislipidemie, hipertensiune arterială, diabet zaharat*



B. Factori de risc: cauzali (majori)/condiționali/predispozanți/încărcătura ateromatoasă a pereților vasculari/aleatori.

Majori: înalt prevalenți la nivelul populației, cu asociere dovedită ca înalt semnificativă și independentă cu evoluția spre accident vascular cerebral sau coronarian, corecția acestora fiind cu certitudine eficientă în reducerea riscului cardiovascular (fumatul, hipertensiunea arterială, nivelul seric al LDL, HDL, trigliceridelor, diabetul zaharat, sindromul metabolic);

Condiționali: prevalență limitată, rol causal ce nu este pe deplin dovedit (nivelul seric crescut al lipoproteinei a și particulelor mici de LDL, hiperhomocisteinemia, fibrinogenul, inhibitorul activatorului de plasminogen);

Predispozanți: fără relație cauzală cu riscul de boală cardiovasculară, dar care sporesc probabilitatea ca persoana să dezvolte în cursul vieții o anumită patologie cardiovasculară (obezitatea, sedentarismul, antecedentele familiale, sexul masculin, alcoolismul, vârsta peste 45 ani, stresul psihic prelungit, anumite caracteristici de personalitate, rezistența crescută la insulină, statusul socioeconomic, particularitățile etnice);

Încărcătura ateromatoasă a pereților vasculari: riscul dezvoltării de boli cardiovasculare ce derivă ca și complicații ale plăcii ateromatoase arteriale poate fi estimat prin cunoașterea severității leziunilor aterosclerotice (de exemplu, electrocardiograma de repaus, testare electrocardiografică de efort, ecocardiografia, coronarografia, ultrasonografia carotidiană, tomografia computerizată coronariană cu fascicol de electroni);

Aleatori: acționează accidental, limitat în timp, putând însă crește semnificativ riscul de apariție a bolilor cardiovasculare (de exemplu, stresul acut fizic sau psihic, medicație cardiotoxică, contraceptive— efect protrombotic, antiaritmice— efect proaritmice, terapiile intervenționale cardiovasculare).

Factori de risc clasici sau noi

Clasici: fumat, alcool, obezitate, dislipidemie, hipertensiune arterială, diabet zaharat;

Noi: homocisteina și deficitul homozigot al unor enzime din metabolismul acesteia, lipoproteina (a), factorii proinflamatori, protrombotici), sindromul de apnee în somn.

Alte patologii ce cresc riscul cardiovascular

Gripa – crește riscul de evenimente cardiovasculare, astfel că se recomandă vaccinarea anuală a celor cunoscuți cu boli cardiovasculare.

Boala cronică de rinichi–microalbuminuria crește riscul de boală cardiovasculară de 2-4 ori, iar riscul crește de până la 50 ori în boala cronică de rinichi stadiul 5 (cu rată de filtrare glomerulară mai mic 15 ml/min/1,73 m²).

Apneea obstructivă de somn–este asociată cu o creștere a morbidității și mortalității cardio- vasculare de 70%.

Disfuncția erectilă, bolile autoimune (psoriazisul, lupusul eritematos sistemic, artrita reumatoidă) sunt boli care cresc riscul cardiovascular.

Diagnosticul factorilor de risc cardiovascular

Factorii de risc cardiovascular reprezintă riscul de dezvoltare a bolilor cardiovasculare potențând verigile fiziopatogenice ale aterosclerozei prin inducerea unei degenerări accelerate a peretelui arterial, cu risc de complicație a acestuia prin ruptură, fisură, tromboză și subsecvent, accidente vasculare cerebrale și coronariene.

Grila SCORE estimează riscul pe 10 ani pentru un eveniment fatal datorat aterosclerozei (atac de cord, accident vascular cerebral, anevrism de aortă), bazându-se pe următorii factori de risc: vârstă, sex, fumat, tensiune arterială și colesterol total. Un risc calculat de 5% sau mai mare impune intervenție asupra stilului de viață și tratament medicamentos.




Diagrama SCORE: riscul de BCV fatale la 10 ani, pentru populațiile cu risc înalt de BCV, în funcție de următorii factori de risc: vârstă, sex, fumat, tensiune arterială sistolică și colesterol total. Societatea Europeană de Cardiologie (The European Society of Cardiology)

Risc foarte înalt (SCORE $\geq 10\%$):

- subiecți cu boală cardiovasculară documentată prin teste invazive sau neinvazive;
- diabet zaharat tip 1 sau 2 cu unul sau mai mulți factori de risc și/sau afectarea organelor țintă (microalbuminurie 30 – 300 mg / 24 ore);
- boala renală cronică severă (rata de filtrare glomerulară < 30 ml / min / 1,73 m²);
- Risc înalt (SCORE între 5 și 10%):
- prezența unui factor de risc precum hipertensiune arterială severă sau dislipidemia familială;
- diabet zaharat tip 1 sau 2, dar fără afectarea organelor țintă;
- boala renală cronică cu rata de filtrare glomerulară 30 – 59 ml/min / 1,73 m² ;
- Risc moderat– pacienții cu SCORE 1 – 5%

Risc scăzut– pacienții cu SCORE $< 1\%$.

Acest sistem permite configurare unui profil ce poate cunoaște în evoluție, fie îmbunătățiri, fie agravări, fiind astfel util atât în diagnostic cât și pentru monitorizarea evoluției pacientului. Diagrama SCORE se poate constitui într-un valoros instrument de lucru util în motivarea pacienților, eventual prin proiectarea în viitor a riscurilor actuale, potențiale sau viitoare, pentru creșterea complianței acestora la recomandările medicale de corecție a factorilor de risc cardiovascular.

Diabetul Zaharat

Studii recente au demonstrat declinul performanței cognitive și creșterea riscului de a dezvolta demență la persoanele care au diabet zaharat; mai mult, pacienții cu declin cognitiv minor și Diabet, prezintă un risc mai mare de a progresa spre demență, comparativ cu cei care au MCI fără diabet.



Corelațiile dintre diabet și declinul cognitiv: unul dintre mecanismele prin care diabetul influențează funcția cognitivă, este reprezentat de hiperglicemie și de producții finali de glicare, ce pot deteriora țesutul vascular și funcția endotelială, pot crește radicalii liberi, răspunsurile inflamatorii și depozitul de amiloid. Hiperglicemia cronică poate influența fluxul sangvin cerebral, funcțiile neurotransmițătorilor sau transportul nutrienților către creier. În plus, diabetul ar putea influența funcția cognitivă prin declanșarea de evenimente cardiovasculare și accidente vasculare cerebrale. Evenimentele hipoglicemice repetate, afectările metabolice și vasculare pot influența funcția cognitivă pe termen lung. De asemenea, diabetul poate fi un marker al altor factori, precum rezistența la insulină și hipertensiunea, sau poate reprezenta o susceptibilitate genetică pentru boala Alzheimer. În determinismul declinului cognitiv, sunt luate în considerare cinci căi majore care se intersectează:

- **îmbătrânirea** (boli cronice legate de vârstă)
- **calea metabolică:** - hiperglicemia și producții finali ai glicării avansate;
 - interacțiunea cu receptori AGE/RAGE;
 - hiperinsulinemia și rezistența la insulină.
- **stresul oxidativ și nitrosativ** (specii reactive de Oxigen și Nitrogen)
- **inflamația** (macrofage periferice și microglia cerebrală centrală)
- **calea vasculară** (ateroscleroză macrovasculară accelerată, rigidizare vasculară, iar la nivel microvascular, remodelarea unităților neurovasculare și neuroglială; toate aceste modificări au ca rezultat afectarea fluxului sanguin cerebral)

Rezistența periferică la insulină și glucotoxicitatea hiperglicemiei au un rol important în dezvoltarea rezistenței cerebrale la insulină. Obezitatea viscerală omentală induce producerea excesivă de acizi grași liberi toxici, iar hiperglicemia induce producții finali ai glicării avansate (AGE), determinând astfel, permeabilizarea Barierei Hematoencefalice; aceasta este urmată de inflamația neurogliei cerebrale (astrocite și microglie), cu producerea de chemokine și citokine toxice, inducând rezistența cerebrală la insulină și stres la nivelul reticulului endoplasmic, cu disfuncție sinaptică sau pierdere sinaptică, disfuncție neuronală și neurodegenerare.

Indiferent de mecanisme, au fost realizate mai multe studii prospective în ultimii ani ce au găsit o corelație între diabet și declinul cognitiv sau demența. S-a constatat o asocierie semnificativă între diabet și rata declinului cognitiv, evidențiindu-se un risc mai mare de 60% pentru declin cognitiv în rândul persoanelor cu diabet, comparativ cu persoanele care nu au diabet. Asocierile au fost observate în mai multe domenii cognitive, precum atenția, concentrarea, memoria, orientarea vizuo-spațială și viteza psihomotorie. De asemenea, studiile au aratat că diabetul reprezintă un risc mai mare cu 50% pentru demență și boala Alzheimer, iar pentru demența vasculară, riscul este dublu.

Obezitatea la vârsta mijlocie

De asemenea, a fost evidențiată relația strânsă dintre obezitatea la vârsta a II-a și riscul crescut de apariție a declinului cognitiv și a demenței, relație care se poate schimba cu vârsta. Persoanele care au un exces ponderal prezintă un risc crescut de

aparitie a unor boli precum diabetul zaharat, hipertensiunea arterială. Creșterea greutateii corporale contribuie la creșterea riscului cardiovascular prin creșterea rezistenței la insulină, creșterea tensiunii arteriale, creșterea procesului inflamator sistemic și a statusului protrombotic. Aceste boli asociate obezității, produc afecțiuni cardiovasculare, care au ca urmare alterarea memoriei și demență. Studiile arată că regimurile alimentare sărace în grăsimi reduc riscul de instalare a bolii Alzheimer.

S-a constatat o disfuncție a axei Hipotalamo-Pituitar-Adrenală (HPA) în obezitate, sindromul metabolic și în Diabetul zaharat tip 2, determinând un exces de mineralocorticoizi (aldosteron) și de glucocorticoizi (cortisol).

Nivelele ridicate de aldosteron și corticoizi induc rezistența la insulină și pot determina boli cerebrovasculare prin implicarea arteriolelor cerebrale și a unităților neurovasculare (NVU) capilare.

De asemenea, pe lângă controlul inadecvat al feedback-ului HPA, se consideră că excesul de țesut adipos visceral omental, este asociat cu efect compresiv asupra rinichilor, cu afectarea secundară a sistemului Renină –Angiotensină–Aldosteron (RAAS). Poate exista o progresie continuă de la obezitate, sindromul metabolic sau diabetul zaharat tip 2, către demența vasculară (VaD), demența Alzheimer (DA) sau demența mixtă (MD).

Hipertensiunea arterială

Hipertensiunea arterială reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc modificabili pentru bolile cerebro-vasculare, care afectează mai mult de o treime din populație și care, alături de alți factori de risc cardio-vasculari, participă la dezvoltarea bolii aterosclerotice, fiind bine cunoscut faptul că hipertensiunea arterială este un factor de risc major pentru accidentul vascular cerebral și infarctul miocardic. "Tensiunea arterială crescută cel mai probabil duce la demență din cauza unei serii de mici atacuri cerebrale «tăcute», care au loc de-a lungul timpului" (dr. Harkin). Orice valoare a tensiunii arteriale peste cea normală (120/80 mm Hg) crește riscul de accident vascular cerebral (AVC). În plus, hipertensiunea arterială este considerată de mulți medici "inamicul public numărul 1" în ceea ce privește cauza leziunilor cerebrale care pot duce la demență. În acest sens, un studiu SPRINT-MIND (Systolic pressure intervention trial) efectuat în Statele Unite, aduce argumente pentru rolul hipertensiunii arteriale în patogenia demenței, iar un control riguros al tensiunii arteriale poate preveni sau ameliora simptomele bolnavilor afectați sau aflați în zona de risc. Complicațiile acestei boli sunt determinate de efectele pe care valorile crescute ale tensiunii arteriale le au la nivel vascular, HTA fiind un factor de risc important pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare și prin faptul că aceasta participă la dezvoltarea aterosclerozei - boală degenerativă, care afectează difuzarterele mari de tip muscular și elastic și care se caracterizează prin prezența plăcilor de aterom formate din lipide, celule inflamatorii, țesut conjunctiv, componente extracelulare precum proteine ale matrixului, enzime și depozite de calciu. Pe lângă ateroscleroza, HTA determină și alte modificări la nivelul structurii peretelui vascular: disfuncție endotelială, lipohialinoză, creșterea rigidității

peretelui arterial, dar și modificări adaptative la nivelul vaselor cerebrale, precum remodelarea de tip hipertrofic sau eutrofic.

Boala de vase mici cerebrale reprezintă un spectru de procese patologice care afectează vasele mici de la nivel cerebral precum arterele mici, arteriolele, capilarele, venele de calibru mic și venulele, însă, de regulă, acest termen este folosit pentru componenta arterială a circulației cerebrale și pentru a descrie leziunile de la nivelul parenchimului cerebral secundare unor anomalii ale vaselor mici cerebrale. Termenul de BVMC se referă la un sindrom ale cărui manifestări clinice neurologice, neuropsihologice, imagistice și neuropatologice sunt determinate de tulburări care apar la nivelul vaselor mici cerebrale, BVMC afectând cu predilecție vasele de la nivelul ganglionilor bazali și substanței albe periventriculare, arterele leptome-ningeale, vascularizația talamusului, a substanței albe cerebeloase și a trunchiului cerebral, de regulă, vasele corticale nefiind afectate.

Hipertensiunea arterială reprezintă factorul de risc cel mai frecvent pentru toate tipurile de leziuni prezente la nivelul parenchimului cerebral în BVMC.

În BVMC se descriu o serie de modificări imagistice la nivelul substanței albe și a substanței cenușii subcorticale: infarctul subcortical de dimensiuni mici, lacunele, hiperintensitățile substanței albe, microhemoragiile cerebrale, spațiile perivascularare dilatate și atrofia cerebrală.

Boala de vase mici prezintă la pacienții cu MCI se asociază cu disfuncție executivă, scăderea vitezei de procesare și tulburări de memorie. Se presupune că BVMC determină apariția deteriorării cognitive prin întreruperea circuitelor cortico-striate frontale secundar prezenței lacunelor și hiperintensităților de la nivelul substanței albe, consecința tuturor acestor modificări fiind alterarea funcției lobului frontal. Folosind IRM funcțională în stare de repaus și tractografia s-a demonstrat că există o legătură strânsă între funcția cognitivă, integritatea structurală a substanței albe și funcționalitatea rețelelor neuronale.

Terapia antihipertensivă agresivă, care fixează ca țintă o tensiune arterială sistolică sub 120 mmHg (recomandările curente sunt să fie redusă sub 130–140 mmHg), s-a dovedit capabilă să reducă riscul de boală cognitivă ușoară (mild cognitive impairment MCI) cu 19%. De asemenea, prin controlul strict al hipertensiunii s-a redus frecvența leziunilor din substanța albă cerebrală. S-a constatat că toate formele de demență, inclusiv cea de tip Alzheimer, au fost reduse cu 17% la bolnavii care au putut fi aduși la valori tensionale sistolice sub 120 mmHg, în comparație cu pacienții a căror tensiune sistolică a persistat la valori mai mari.

În grupul de bolnavi cu risc pentru demență Alzheimer sau cu forme clinice de predemență, cei care au putut fi tratați eficace cu medicația antihipertensivă și au avut reducerea dorită a presiunii sistolice (sub 120 mm Hg), menținută constant pe o durată mai mare de trei ani, au dovedit o reducere a incidenței sau progresiei bolii de 17%, mai mare decât cea care a fost vreodată obținută prin orice medicație antiamiloid.

Efectele benefice ale controlului tensiunii arteriale au fost de mult confirmate în incidența, complicațiile și mortalitatea bolilor cardiovasculare, renale și oculare, dar studiul SPRINT este primul care pune în evidență o legătură directă între hipertensiunea arterială și demență și, totodată, este primul studiu care raportează o reducere eficace a riscului de progresie în toate formele de demență prin terapia antihipertensivă.

Detecția precoce a leziunilor cerebrale induse de HTA, ar putea determina intervențiile terapeutice necesare pentru scăderea tensiunii arteriale la acești pacienți, fie prin intermediul medicației, fie prin schimbările din stilul de viață (renunțarea la fumat, mai multă activitate fizică, adoptarea unei diete adecvate).


Hiperlipidemia

Analize sistematice au identificat legătura dintre hipercolesterolemie și demență, cu mențiunea că statinele utilizate pentru menținerea nivelurilor serice ale colesterolului în limite normale, pot avea un rol protectiv față de declinul cognitiv. Statinele sunt considerate ca agenți terapeutici de primă linie pentru Hipercolesterolemie, în prevenția primară și secundară a bolilor cerebrovasculare, diminuând riscul pentru acestea prin reducerea aterosclerozei și ameliorarea perfuziei cerebrale.

Se consideră că hipercolesterolemia este un important factor de stres oxidativ, o condiție a unui dezechilibru între producția de radicali liberi de oxigen și îndepărtarea acestora de către enzimele antioxidante și micronutrienți; dacă producția de radicali liberi depășește pe cea care poate fi controlată de către antioxidanți, se produc daune ireversibile la nivelul proteinelor, lipidelor și ADN-ului. Dovezi privind oxidarea și nitrarea proteinelor, cu formarea de grupări carbonil și 3-nitrotirozină, se întâlnesc frecvent în plasmă, atât la pacienții cu hipercolesterolemie, cât și la cei cu demență. În mod similar, radicalii liberi ai lipidelor oxidate (de ex. izoprostani, hidroperoxizi lipidici), sunt mai răspândiți în plasma bolnavilor cu AD, comparativ cu martorii sănătoși. A fost demonstrată implicarea oxidării sistemice a lipidelor/proteinelor ca o caracteristică întâlnită în AD și hipercolesterolemie. Efectele benefice ale statinelor împotriva bolilor cerebro și cardiovasculare, au fost atribuite atât reducerii colesterolului, dar, mai ales, eliminării LDL oxidate.

Stilul de viață

Fumatul Există puternice evidențe că fumatul curent crește riscul de demență, dublându-se practic riscul de a dezvolta demență la vârsta a treia. Se consideră că simpla întrerupere a fumatului, restabilește riscul de a dezvolta demență la un nivel comparabil cu cel al nefumătorilor. Tabagismul înseamnă automat boală, ateroscleroza accelerată fiind un proces cert dovedit epidemiologic, clinic, dar și experimental. Renunțarea la fumat reduce riscul de a muri din cauza unui infarct miocardic acut sau accident vascular cerebral.



Fumatul induce generarea de radicali liberi, crește stresul oxidativ, exercită acțiune proinflamatorie, putând favoriza apariția unor afecțiuni cerebrovasculare. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), tutunul pentru fumat este un factor de risc semnificativ pentru dezvoltarea demenței, prin afectarea memoriei, concentrării și a capacității de învățare. Astfel, în 2014, OMS a emis un document care evidențiază legătura dintre fumatul tutunului și demența. Se estimează că "14% din cazurile de boală Alzheimer din întreaga lume sunt potențial atribuite fumatului". Se consideră că există o relație între cât de mult fumează o persoană și riscul de demență, atrofierea cortexului odată cu înaintarea în vârstă, fiind accelerată de fumat.

Riscurile pentru sănătate ale tutunului sunt multe și bine stabilite - fumatul este puternic legat de cancer, boli de inimă, BPOC, emfizem, dar și de sănătatea creierului. Studii ample care au investigat legătura dintre fumat și demență au demonstrat că marii fumători, cei care fumează cca. 40 de țigări pe zi prezintă un risc crescut de a suferi de maladia Alzheimer sau de demență "vasculară", două forme comune ale demenței, afecțiune din ce în ce mai răspândită și care reprezintă o povară grea atât pentru familii, cât și pentru sistemul de sănătate. În cazul celor care fumează două pachete de țigări zilnic la vârsta mijlocie, riscul apariției bolii Alzheimer la vârsta a treia este mai mult decât dublu față de cazul nefumătorilor, iar riscul apariției demenței vasculare crește cu 172%. Fumatul deteriorează sistemul vascular, afectând tensiunea arterială și coagularea sângelui prin efectul proagregant plachetar al nicotinei, crește riscul de accident vascular cerebral și, prin urmare, riscul de demență vasculară (VaD). Cu toate acestea, multe studii au ajuns la concluzia că fumatul poate influența riscul de VaD independent de starea de accident vascular cerebral și, prin urmare, poate avea un efect dincolo de bolile cerebrovasculare. În plus, studiile care au arătat un impact direct al fumatului asupra demenței Alzheimer (AD), sugerează că fumatul ar putea influența, de fapt neurodegenerarea, prin inducerea stresului oxidativ și a inflamației, ambele fiind mecanisme cheie în patogeneza AD. Cu toate acestea, este de asemenea, plauzibil din punct de vedere biologic, faptul că fumatul ar putea proteja împotriva declinului cognitiv și AD, având în vedere că nicotina poate spori eliberarea acetilcolinei și crește densitatea receptorilor nicotinici, îmbunătățind astfel atenția și prelucrarea

informațiilor. Se știe că AD se caracterizează prin deficite ale sistemului colinergic care pot fi întârziate prin consumul de tutun. Există studii care au arătat că nicotina poate crește concentrarea și atenția, dar în țigări nu se găsește doar nicotină. Țigaretile conțin în jur de 4.000 de chimicale, dintre care 50 sunt recunoscute ca fiind toxice (de exemplu: monoxidul de carbon, butanul, metanolul). Pe termen lung, fumatul afectează memoria de lucru și capacitatea de învățare. S-a constatat că în cazul celor care renunță la fumat la vârsta mijlocie, riscul de apariție a demenței, 20 de ani mai târziu, nu diferă de cel al persoanelor care n-au fumat niciodată. În cazul declinului cognitiv asociat vârstei (în cazul în care adulții mai în vârstă se confruntă cu un declin treptat al gândirii și al memoriei, dar sunt încă capabili să funcționeze bine), fumatul a fost corelat cu o scădere mai rapidă a capacităților de memorie și de funcționare executivă.

Riscul de fum de mâna a doua - Fumul secundar, denumit și fumatul pasiv, fumul de tutun din mediu sau fumatul involuntar, a fost asociat cu aceiași factori de risc general asupra sănătății- sănătatea inimii, funcția pulmonară și cancerul, dar și cu un risc crescut de demență. Expunerea la fum în casă, la locul de muncă și în alte locuri a fost asociată cu risc crescut de demență, iar expunerea în toate cele trei locuri a fost legată de cel mai mare risc.

Alcoolul Se consideră că un consum mic sau moderat de alcool de către vârstnici, reduce riscul de declin cognitiv și demență, dar nu și consumul excesiv de alcool.

Consumul moderat de alcool (10 – 30 g/zi) reduce mortalitatea cardiovasculară.

Vinul roșu este protector cardiovascular datorită conținutului său în polifenoli cu efecte vasodilatatorii, antitrombotice și antioxidante. Alcoolul are efect deprimant pe sistemul nervos central, determinând reducerea activității neuronale. De asemenea, are un efect anxiolitic, antidepresiv, relaxant și sedativ, fiind folosit de multe persoane care se confruntă cu anxietate, depresie sau insomnii. La nivelul creierului acționează pe centrul plăcerii mediat de dopamină. Cantitatea de la care crește riscul apariției problemelor legate de consumul de alcool este:

- la bărbați 14 băuturi/săptămână sau 4 băuturi/zi
- la femei 7 băuturi/ săptămână sau 3 băuturi/zi
 - o băutură standard (sau un “drink”) este definită ca 12 g de alcool pur și este echivalentă cu 330 ml bere sau 150 ml vin sau 30 ml băuturi spirtoase (vodka, whisky).

Dieta. Rolul unei diete bogate în vitamine și nutrienți este dificil de evaluat, datorită interferenței cu mulți alți factori ce țin de stilul de viață, totuși un pattern dietetic poate fi reprezentat de dieta mediteraneană bazată pe pește, fructe, legume, ulei de măsline, nuci, cereale integrale, care reduce riscul de declin cognitiv și demență. Există,

însă, și grăsimi benefice pentru sănătatea creierului (dieta bogată în ulei de măsline cu efect protector față de declinul cognitiv asociat înaintării în vârstă). Vitamina C și A, având un efect antioxidant, pot, de asemenea, proteja creierul. A fost dovedită capacitatea antioxidantă relativ mare a unor fructe și legume: afine, căpșuni, roșii, broccoli.

Activitatea fizică și mentală

Exercițiile fizice regulate, plimbatul, pot avea efecte protective față de declinul cognitiv. Participarea regulată la activități fizice sau exerciții aerobice este asociată cu scăderea mortalității cardiovasculare la indivizi sănătoși, la subiecți cu factori de risc coronarieni și pacienți cu boală cardiovasculară cunoscută. Efectuarea a 2,5 – 5 ore pe săptămână de activitate fizică moderată sau 1 – 2,5 ore pe săptămână de activitate intensă constituie clasă de recomandare în ghidurile cardiologice. Combinarea dintre aportul excesiv caloric și lipsa activității fizice reprezintă un factor de risc pentru sindromul metabolic. Activitatea fizică menține greutatea corporală sau chiar o reduce, modifică profilul lipidic prin creșterea HDL-colesterolului și scăderea trigliceridelor, crește sensibilitatea la insulină și scade tensiunea arterială. Efectele benefice ale activității fizice (gimnastică, alergare, mersul pe bicicletă, mersul pe jos, înotul) sunt următoarele: crește tonusul psihic și calitatea vieții, ameliorează factorii de risc cardiovasculari, este adjuvant al dietei pentru scăderea ponderală, ameliorează hipertensiunea arterială ușoară și moderată, ameliorează profilul lipidic (scade trigliceridele și LDL-colesterol, dar crește HDL-colesterol). Activitatea fizică reduce riscul de demență cu 45% . Efectele protective se realizează prin diverse mecanisme: reducerea TA, prevenirea obezității, diminuarea activității proinflamatorii, ameliorarea profilului lipidic și a funcției endoteliale, ameliorarea fluxului sanguin cerebral și, secundar, a oxigenării unor arii cerebrale importante pentru funcțiile cognitive. De asemenea, activitatea fizică poate preveni demența Alzheimer prin creșterea factorilor neurotrofici (BDNF-Brain Derived Neurotrophic Factor), IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), stimulează neurogeneza, sinaptogeneza și neuroplasticitatea; reduce radicalii liberi din hipocamp, crește superoxidismutaza și eNOS (endothelial nitric oxide synthase). Studiile au arătat, de asemenea, că activitatea fizică determină creșterea volumului hipocampal și a concentrației serice de BDNF la vârstnicii sănătoși. Riscul de a face boala Alzheimer este mai redus în randul persoanelor active din punct de vedere intelectual. Persoanele care obișnuiesc să citească și desfășoare activități stimulatoare pentru intelect sau

legate de procesul de învățare își mențin mai bine funcția mnezică și pentru un timp mai îndelungat.

3.3 FACTORI DE RISC MAJORI MODIFICABILI ȘI NEMODIFICABILI ÎN BOALA ALZHEIMER

Boala Alzheimer reprezintă cea mai comună formă de demență predominant neurodegenerativă, care antrenează pierderea progresivă și ireversibilă a funcțiilor mentale, care se asociază cu declin cognitiv și care rămâne una dintre problemele importante de sănătate publică actuale. Boala Alzheimer reprezintă în prezent principala cauză de demență la persoanele în vârstă; în general, este diagnosticată după 65 de ani, aproximativ 10% din populație fiind afectată, primele semne ale bolii fiind adesea confundate cu aspecte normale ale procesului de îmbătrânire a creierului sau cu alte afecțiuni neurologice precum demența vasculară. Demența Alzheimer reprezintă cel mai comun tip de demență (60-70% din toate cazurile de demență) și afectează cca 27 milioane de persoane. Manifestările clinice tipice ale acestei afecțiuni constau în pierderea progresivă a memoriei episodice și a funcțiilor cognitive, deficiențe ale limbajului și ale abilităților vizuospatiale. Se asociază frecvent și tulburări comportamentale: apatie, depresie, agresivitate. Apariția bolii are un imens impact asupra vieții sociale și de familie, însă presupune și cheltuieli financiare uriașe din partea societății. Din punct de vedere anatomopatologic, sunt caracteristice două tipuri de pattern lezional: leziuni extracelulare-plăcile senile, ce conțin un nucleu β -amyloid ($A\beta_{42}$) și leziuni intraneuronale-ghemurile neurofibrilare compuse din proteina Tau fosforilată (P-tau). Etiologia bolii Alzheimer este multifactorială, cu implicarea unor variate mecanisme de declanșare și progresie a bolii, fiind o demență cu patogenie complexă. Cel mai important factor de risc al bolii Alzheimer este reprezentat de avansarea în vârstă sau, astfel spus, dacă nu apar metode noi de prevenire a bolii Alzheimer, numărul persoanelor cu această maladie va crește proporțional cu dimensiunea populației vârstnice.

3.3.1 Factorii genetici

Factorii genetici au o valoare deosebită în boala Alzheimer având în vedere studiile de genetică moleculară care au evidențiat existența unor mutații la membrii familiilor cu boală Alzheimer la care s-a demonstrat prezența unui pattern autozomal dominant. Testarea genetică este în prezent utilizată în vederea realizării diagnosticului

diferențial al diferitelor forme de demență; se cunosc patru gene legate de apariția și dezvoltarea bolii Alzheimer:

- gena precursora a amiloidului;
- presenilina 1;
- presenilina 2;
- apolipoproteina E, varianta - 4.

Proteina precursora a amiloidului, presenilinele PS 1 și PS 2 produc boala Alzheimer, în timp ce prezența apolipoproteinei E se poate considera un posibil risc. Existența unei mutații patogene cunoscute în proteina precursora a amiloidului sau a presenilinelor se consideră că ar putea avea rol predictiv pentru boala Alzheimer cu o acuratețe de 95-100%. Mutațiile prezente în proteina precursora a amiloidului și presenilinelor PS 1 și PS 2 se consideră că determină forma familială cu debut precoce a bolii Alzheimer, implicând cazurile de boală apărute la persoane cu vârstă mai mică de 65 de ani, fiind transmisă de la părinții afectați. Acest tip de pattern autosomal dominant reprezintă o formă rară de boală Alzheimer, cu debut precoce și transmisie familială, fiind genetic heterogenă. Ea implică existența a cel puțin trei gene:

1. Gena proteinei precursora a amiloidului
2. Gena presenilinelor PS 1 și PS 2 care acționează asupra a trei cromozomi separați:
 - 21 pentru proteina precursora a amiloidului;
 - 14 pentru presenilina 1;
 - cromozomul 1 pentru presenilina 2.
3. Apolipoproteina E este asociată cu aproape toate formele de boală Alzheimer, dar prezența ei nu poate confirma și nici exclude existența sau riscul de a dezvolta boala Alzheimer. Prezența apolipoproteinei E a fost evidențiată și în altă forme de demență cum ar fi: demența vasculară, demența cu corpusculi Lewy și demența frontotemporală.

Proteina precursora a β -amiloidului (APP) este o proteină transmembranară de tip I, ce joacă rol central în patogeneza bolii. Clivarea secvențială a APP de către β și secretaza generează β -amiloidul ($A\beta$), care se depozitează în creierul pacienților afectați sub formă de plăci senile, reprezentând unul din tresemnele patologice principale.

Secretaza este un complex proteolitic care scindează domeniul transmembranar al APP până când acesta este destul de scăzut pentru a determina eliberarea de $A\beta$ din membrană. Peptidele generate de clivajul -secretazei diferă prin capătul carboxiterminal.

Elementul majoritar este $A\beta$ 40, în timp ce $A\beta$ 38 și $A\beta$ 42 reprezintă categoriile minore. **$A\beta$ 42**, peptid neurotoxic și predispus la agregare, este considerat a fi agentul cauzal al inițierii cascadei de manifestări patologice, care determină moartea neuronală, distrugerea sinapselor, formarea de ghemuri neurofibrilare și plăci senile, iar în cele din

urmă neurodegenerescența și demența. Creșterea producției de A β 42 stă la baza mutațiilor asociate cu boala Alzheimer familială care se manifestă cu debut precoce. Majoritatea mutațiilor au fost găsite la nivelul presenilinei 1, care codifică subunitatea catalitică a-secretazei, în timp ce doar câteva mutații au fost găsite în presenilina 2.

S-a constatat că persoanele cu sindrom Down pot dezvolta semne distinctive neuropatologice de boală Alzheimer după 40 de ani, iar 50% prezintă semne clinice de declin cognitiv. Asocierea dintre boala Alzheimer și sindromul Down se datorează supraexpresiei genei APP de pe cromozomul 21 ce codifică proteina precursoră a amiloidului. Acumularea amiloidului începe în cazul acestor pacienți în prima decadă de viață.

Presenilina 1 este o genă ale cărei funcții nu sunt pe deplin cunoscute și se consideră a fi cauza cea mai frecventă a formelor familiale de boală Alzheimer, cu debutul precoce. Există peste 40 de mutații diferite de PS1, fiecare dintre acestea fiind suficiente pentru a produce boala Alzheimer. Vârsta de debut se conturează în intervalul 28- 65 de ani, iar penetranța este mai mare de 99%.

Presenilina 2 prezintă similaritate cu PS1. Numai 4 mutații ale genei PS2 au fost identificate până în prezent și recunoscute de specialiștii în domeniu.

A patra genă implicată în transmiterea bolii Alzheimer este apolipoproteina E. Formele de boală Alzheimer adică formele de boală cu debut precoce, cu debut tardiv sporadic, precum și formele cu debut tardiv sunt determinate de o complexă interacțiune a genelor, pe de o parte, și a factorilor din mediul ambiant pe de altă parte. Există o corelație asociativă între apolipoproteina E și boala Alzheimer, dar nu se exclude posibilitatea corelării apolipoproteinei E și cu celelalte procese neurodegenerative dependente de vârstă. Apolipoproteina E este una dintre genele implicate în acest proces complex, fiind situată pe cromozomul 19, existând trei izoforme ale proteinei E 2, E 3 și E 4 și care sunt codificate de trei alele diferite – 2, 3 și 4. Purtătorii alelei 4 a genei apolipoproteinei E au riscul cel mai mare de a dezvolta boala Alzheimer. Homozigoții pentru alela 4 a genei apolipoproteinei E dezvoltă boală Alzheimer la o vârstă mai mică decât heterozigoții. Genotiparea apolipoproteinei E nu este nici specifică, nici sensibilă și poate avea rol adjuvant în diagnosticul bolii Alzheimer la persoanele care prezintă manifestări clinice, iar pentru persoanele asimptomatice rolul este minor. Prezența alelei 4 nu este necesară și nici suficientă pentru a dezvolta boala Alzheimer. S-a sugerat că 50-60% dintre cazurile de boală Alzheimer sunt produse de mai mulți factori; au fost evidențiate modificări la nivelul cromozomilor 1, 9, 10, 12 și 13 în cazuri de boală apărută tardiv. Cercetările efectuate până în prezent au sprijinit ideea că boala Alzheimer cu debut tardiv este o formă complexă care implică mai multe gene. Există până în prezent trei forme de boală apărute în acele familii în care manifestările de boală au apărut precoce, cauzate de mutații în una din trei gene:

Boala Alzheimer subtipul 1 (FAD 1) reprezintă 10-15% dintre cazuri și este determinată de mutația genei precursoră a amiloidului, care codifică β -amiloidul A4.

Boala Alzheimer subtipul 3 (FAD3) reprezintă 30-70% dintre cazurile cu debut precoce și este cauzată de mutația *PSEN1* care codifică presenilina 1.

Boala Alzheimer subtipul 4 (FAD4) reprezintă mai puțin de 5% din totalul formelor apărute precoce și este cauzată de mutații ale genei presenilinei 2. Forma familială cu debut precoce este transmisă autosomal dominant, ceea ce semnifică un risc de îmbolnăvire de 50% pentru rudele de gradul I. Această afecțiune este diagnosticată în familiile care au mai multe persoane suferind de boala Alzheimer, la care vârsta de debut este constant mai mică de 60-65 de ani și de cele mai multe ori survine înainte de vârsta de 55 de ani.

Din punct de vedere al vârstei de debut a primelor simptome, Demența Alzheimer, poate fi clasificată în:

- forma cu debut precoce (4-6% din totalul cazurilor), la vârste <65 ani
- forma cu debut tardiv, la vârste >65 ani

Se consideră că 70% din riscul de a dezvolta Demență Alzheimer, este atribuit factorilor genetici. Forma cu debut precoce se datorează unor mutații la nivelul genelor *APP*, *PSEN1* and *PSEN2* (proteina precursora a amiloidului, presenilina 1 și presenilina 2), iar forma cu debut tardiv este în principal asociată cu un polimorfism al genei *APOE* (apolipoprotein E gene), mai ales cu prezența alelelor ε4.

3.3.2. Factori de risc dobândiți în Demența Alzheimer

Dintre aceștia, cei mai importanți sunt: bolile cerebrovasculare, diabetul, hipertensiunea arterială, obezitatea și dislipidemia.

Bolile cerebrovasculare și Demența Alzheimer au factori de risc comuni, uneori superpozabili. Modificările cerebrovasculare (infarctele cerebrale corticale, vasculopatiile, în special, boala vaselor mici (arterioloscleroză), infarctele transformate hemoragice, demielinizările ischemice ale substanței albe periventriculare, angiopatia amiloidă, atrofia) cresc major riscul dezvoltării declinului cognitiv și al demenței. Studiile au demonstrat prezența afectării cerebrovasculare la până la 47 % din persoanele diagnosticate cu demență, fapt ce conduce la presupunerea unui potențial rol al mecanismelor homeostatice în patogenia demenței Alzheimer. Luând în considerare teoria „double-stroke” a bolii Alzheimer, factorii de risc vascular „first stroke” conduc la disfuncția barierei hemato-encefalice și secundar, la reducerea fluxului sanguin cerebral; astfel, se induc deteriorări neuronale pe căi atât non-amiloidogenice cât și pe căi amiloidogenice. În primul rând, disfuncția BHE determină oligemie, hipoxie și acumularea de molecule neurotoxice, eveniment ce se asociază cu apariția de micro-injurii, de multiple microinfarcte. Pe calea amiloidogenică, suferința vasculară crește expresia *APP* și, respectiv, sinteza de Aβ peptide. Acumularea amiloidului în creier („second stroke”) amplifică disfuncțiile neuronale și procesele de neurodegenerare; atât



acumularea de A β peptide, cât și hipoperfuzia cerebrală, conduc la hiperfosforilarea proteinei tau și apariția NGF (Neurofibrillary tangles).

Hipertensiunea arterială. Studiile au demonstrat că HTA crește riscul de apariție a Demenței Alzheimer, mai ales când este prezentă la vârste mijlocii, prin modificări ale structurii pereților vasculari, determinând astfel hipoperfuzie, hipoxie, ischemie cerebrală, acumularea de APP și A β ; în paralel, stimulează expresia Presenilinei care este implicată în sinteza A β . De asemenea, hipertensiunea arterială poate perturba bariera hematoencefalică, eveniment asociat cu geneza demenței Alzheimer.

Diabetul zaharat tip 2 Studiile epidemiologice au demonstrat asocierea netă dintre diabetul zaharat tip 2 și creșterea riscului de a dezvolta AD, mecanismele incriminate fiind rezistența la insulină, deficitul de insulină, disfuncția receptorilor de insulină, toxicitatea hiperglicemiei, produșii finali ai glicării avansate, inflamația vasculară, suferința cerebrovasculară; se consideră că produșii finali ai glicării avansate (AGEs) induc apoptoza neuronală prin activarea căilor morții celulare, în paralel cu stimularea prelucrării APP prin creșterea expresiei complexelor β și γ -secretaze.

Obezitatea Rolul obezității ca factor de risc pentru AD este încă incert, rezultatele studiilor efectuate fiind neconcludente și contradictorii. Astfel, se consideră că obezitatea la vârsta mijlocie se poate asocia cu un risc crescut de AD, în timp ce obezitatea la vârste avansate este corelată invers având risc mic de dezvoltare a demenței; pentru aceste vârste este considerată de risc, subponderalitatea, aceasta precedând de regulă demența cu cca 10 ani.

Dislipidemia nivelul crescut de colesterol reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea aterosclerozei, demenței, precum și a altor boli neurodegenerative. Studiile au demonstrat că hipercolesterolemia compromite integritatea barierei hematoencefalice; de asemenea, hipercolesterolemia se asociază cu creșterea depunerilor de peptide A β , cu creșterea formării de NFT, neuroinflamația, microhemoragiile cerebrale, disfuncția neuronilor colinergici și, secundar, cu declinul cognitiv. Prin comparație, cei care utilizează statine prezintă un risc mai mic de AD sau o diminuare a progresiei declinului cognitiv.

Stresul Stresul activează axul hipotalamo-pituitar-adrenal (HPA), inducând astfel creșterea producției de cortizol care determină intensificarea depunerii de peptide A β în anumite regiuni ale creierului, mai ales la nivelul hipotalamusului și a cortexului prefrontal, iar stresul îndelungat cauzează acumularea proteinei tau fosforilate și neurodegenerarea. Studiile au arătat niveluri crescute ale cortizolului la pacienții cu demență Alzheimer, comparativ cu subiecții sănătoși, identificându-se corelații semnificative între nivelurile înalte de cortizol și progresia rapidă a bolii, alterarea scorului MMSE și diminuarea volumului hipocampal. Se presupune că atrofia hipocampală are un efect de dezinhibiție asupra axului Hipotalamo-Hipofizo-Adrenal, cu creșterea secundară a nivelului de cortizol.


Depresia. La adultul tânăr reprezintă un important factor de risc pentru dezvoltarea demenței la vârstă înaintată. S-au constatat asocieri semnificative între depresia majoră

la vârstă mijlocie, atrofia hipocampusului, creșterea nivelului de cortizol și depunerile de amiloid β la nivel cerebral (observate prin PET). Se consideră că depresia apărută la maturitate poate fi un semnal pentru declinul cognitiv sau pentru debutul precoce al demenței. Mai mult de 25% dintre persoanele cu vârste peste 65 de ani, prezintă tulburări cognitive și depresive. De asemenea, se apreciază există similitudină clinică și neurocognitive în cazul depresiei și al demenței cu debut precoce.

Depresia la vârsta a treia, una dintre cele mai frecvente entități nosologice, este deseori subdiagnosticată și subtratată. Diagnosticul precoce și prevenția sunt deosebit de importante, ținând cont de triplarea numărului de persoane vârstnice la 1,9 miliarde în 2050. Creșterea speranței de viață la 82 de ani în țările dezvoltate, va determina creșterea numărului vârstnicilor de peste 85 de ani și secundar, a numărului de pacienți diagnosticați cu tulburări de dispoziție. Astfel, depresia la vârsta a treia va fi una dintre cele mai costisitoare afecțiuni, ca urmare a riscului crescut de suicid, a comorbidităților somatice, a scăderii funcționalității zilnice și a calității vieții atât a pacientului, cât și a familiei. Potrivit Asociației Alzheimer, cca 40% dintre persoanele cu boala Alzheimer au și depresie. Conform unui studiu amplu publicat în Archives of General Psychiatry în 2012, s-a constatat că demența este mai frecventă în rândul persoanelor care au suferit de depresie la vârsta adultă sau la vârsta a treia. S-a constatat că vârsta de debut a depresiei poate determina tipul de demență: persoanele care dezvoltă depresie mai târziu în viață au un risc dublu în ceea ce privește debutul de Alzheimer, în schimb persoanele care manifestă o depresie recurentă la vârsta adultă au risc crescut de a avea demență de tip vascular. Depresia la vârsta a treia este considerată în prezent o entitate clinică distinctă, tabloul clinic al depresiei prezentând multe aspecte diferite față de tabloul clinic al depresiei la tineri. Prevalența depresiei este în medie de 20%. Alte tulburări emoționale care apar frecvent în evoluția bolnavilor cu depresie sunt: anxietatea, agresivitatea, iritabilitatea, într-un procent de 85% din cazuri. Incidența depresiei crește la bolnavii care au un accident vascular în antecedente, 60% din aceștia înregistrează un episod depresiv în primii 2 ani, iar procentul crește ulterior. De asemenea, depresia este un factor de risc pentru bolnavii cu infarct miocardic acut (Frasure - Smith, 1996, Glassman și Chapiro, 1998).

Tulburările de somn. Tulburările de somn au o relație bidirecțională cu demența Alzheimer: apar în timpul stadiilor precoce ale demenței și tind să se agraveze odată cu evoluția acesteia, iar pe de altă parte tulburările de somn cresc riscul de dezvoltare a demenței și o agravează. Se consideră că persoanele cu insomnie au risc crescut pentru boala Alzheimer, dar nu și pentru demența vasculară sau de alte cauze; de asemenea, persoanele cu tulburări respiratorii de somn (sleep apneea), au risc crescut de a dezvolta orice tip de demență, inclusiv Alzheimer și vasculară. Se consideră că tulburările de somn pot precede debutul simptomelor cognitive și există o puternică legătură între întreruperile somnului și dezvoltarea AD. Perturbările somnului și ale ritmului circadian sunt caracteristici frecvente (25-60%) și dizabilitante la pacienții cu AD; cele mai frecvente acuze sunt: insomnia, fragmentarea somnului și somnolența diurnă excesivă.

Somnul este esențial pentru funcționarea normală a memoriei și consolidarea ei. Amintirile declarative (memoria pentru evenimentele conștiente) sunt îmbunătățite de somnul NonREM (sau de undă lentă), în timp ce amintirile nedeclarative (abilitățile/obiceiurile învățate, amintirile procedurale), sunt consolidate de somnul REM. Calitatea slabă a somnului și lipsa somnului determină deficite în plasticitatea sinaptică și procesele de memorie, afectând negativ memoria și cunoașterea. Polisomnografia în AD relevă reducerea undelor lente de somn, reducerea fazei REM, prelungirea latenței REM, creșterea fragmentării somnului. EEG în stare de veghe evidențiază dezorganizarea ritmului rapid și predominanța undelor lente. O caracteristică timpurie a patogenzei AD este degenerarea locus coeruleus, principala sursă de norepinefrină către cortex și o regiune critică pentru menținerea normală a stării de veghe. De asemenea, au fost identificate deficite ale moleculei care promovează trezirea-Orexina (Hipocretină), care este implicată în narcolepsie; nivelurile LCR de Orexină sunt semnificativ corelate cu nivelurile LCR de A β 42, proteine tau și tau fosforilate, la pacienții cu AD. Perturbările somnului la pacienții cu AD afectează negativ nu numai cogniția, dar accentuează și tulburările neurocomportamentale ale acestora, existând o strânsă interrelație somn-cogniție-tulburări neuropsihiatrice.



4. DECLINUL COGNITIV MINOR – MILD COGNITIVE IMPAIRMENT

MCI este un sindrom clinic plasat într-o poziție intermediară pe scala unui quantum cognitiv, între îmbătrânirea normală și demență ca puncte de referință care, în ultimii ani, a suscitat într-un mod deosebit, atenția cercetătorilor; este mai mult o entitate patologică subclinică caracterizată prin tulburări cognitive ușoare, minore care nu împieteză semnificativ funcționalitatea socială sau profesională a individului. Tulburările cognitive minore "soft" sunt frecvent întâlnite la vârstnici, fiind considerate ca o caracteristică intrinsecă a procesului de îmbătrânire, ele câștigând o semnificație clinică ca urmare a dificultăților apărute în desfășurarea activităților de rutină, întâmpinate de către pacienți. Declinul cognitiv, fiziologic în cazul vârstnicilor, apare în formă exacerbată și în numeroase condiții clinice, în principal în demențe și, în general, în toate cerebroleziunile de diverse cauze (vasculare, infecțioase, traumatice, tumorale, etc). Se caracterizează prin diminuarea memoriei de scurtă durată, întârziere în accesarea datelor memorate, pierderea atenției susținute, a funcțiilor executive și a îndemnării motorii, latență în rezolvarea problemelor, diminuarea performanței (Peterson 1992, Rapp & Heindel, 1994).

Funcția cognitivă cuprinde șase domenii majore:

- a. **atenția** (atenția concentrată, atenția distributivă, stabilitatea atenției, viteza de procesare)
- b. **învățarea și memoria** (capacitatea de învățare, memoria de lucru, reproducerea imediată/întârziată, simplă/cu indicii)
- c. **limbajul** (procesarea/comprehensiunea verbală, fluența verbală)
- d. **funcția vizuo-spațială** (percepția și procesarea vizuospațială)
- e. **funcția executivă** (planificarea, luarea deciziilor, memoria de lucru, flexibilitatea cognitivă, inhibiție cognitivă)
- f. **psihomotor** (praxis – realizare sarcini practice)

După Wisocki 1991, se mai adaugă abstractizarea, flexibilitatea conceptuală, calculul mintal, viteza de procesare a informației, acuratețea și calitatea informației, orientarea temporală, iar după Sava 2020, se adaugă și cognițiile sociale – comportamentul în funcție de tiparul social acceptabil, modificări de personalitate, inhibiție, empatie.

Pentru diagnosticul de MCI, trebuie afectat doar unul dintre aceste domenii, în timp ce pentru diagnosticul de demență, este necesară afectarea mai multor domenii. Declinul cognitiv minor și Demența ușoară sunt probleme comune ale vârstnicilor, principalele distincții dintre ele fiind numărul de domenii cognitive afectate, precum și interferența substanțială cu viața de zi cu zi.

4.1 CLASIFICARE MCI

Se descriu trei subtipuri ale MCI:

- MCI amnesic (cu evoluție foarte probabilă spre Demența Alzheimer)

- MCI cu mai multe domenii cognitive ușor afectate
- MCI cu un singur domeniu cognitiv afectat, altul decât memoria
- Există și o altă sistematizare a MCI care diferențiază patru subgrupe :
- MCI amnestic unic și multiple-domain
- MCI nonamnestic unic și multiple-domain

Toate studiile au relevat legătura dintre MCI amnestic și Demența Alzheimer; de asemenea, se consideră că MCI nonamnestic single-domain reprezintă faza preclinică a Degenerescenței lobare Fronto-Temporale, iar MCI nonamnestic multiple-domain constituie o condiție clinică de predemență vasculară (reprezintă faza prodromală a Demenței vasculare-VaD).

4.2 EPIDEMIOLOGIE. INDICATORI DEMOGRAFICI

Se consideră că 14% dintre persoanele peste 70 de ani prezintă tulburări cognitive de tip demență și un procent similar, de 14% dintre persoanele din aceeași categorie de vârstă, acuză tulburări cognitive ușoare; după alți autori, prevalența MCI este de cca 16%, crește cu vârsta, este mai frecventă la bărbați decât la femei, mai des întâlnită la cei necăsătoriți, precum și la cei cu APOE $\epsilon 3 \epsilon 4$ sau cu genotipul $\epsilon 4 \epsilon 4$; de asemenea, tipul amnestic de MCI este cel mai frecvent întâlnit; se presupune că femeile trec direct de la cogniția normală la demență, dar la o vârstă mai înaintată, însă, în cazul lor, evoluția este mai rapidă și mult mai abruptă. Se consideră că prevalența MCI nonamnestic variază între 17% și 38% din totalul cazurilor de MCI.

4.3 ETIOLOGIE

Etiologia MCI poate fi stabilită prin examinare clinică generală și neurologică și prin investigații paraclinice (analize de laborator și imagistică CT/ RMN craniu). Cele mai frecvente cauze ale MCI sunt:

- Demența Alzheimer este cauza principală a tipului amnestic de MCI la persoanele peste vârsta de 65 de ani;
- Boala cerebrovasculară este o cauză frecventă cu înaintarea în vârstă, fiind implicate mai ales infarctele cerebrale mici de tip lacunar care mult timp sunt nemanifeste clinic " silențioase"; în cazul bolii cerebrovasculare apare atât MCI amnestic, cât și MCI nonamnestic;
- Boala Parkinson cu tulburări cognitive, numită și Parkinson Plus ;
- Boala cu corpi Lewy prezintă parkinsonism, tulburări cognitive nonamnestice, tulburare de personalitate, tulburări ale ritmului somn-veghe;
- Degenerările Fronto-Temporale pot produce un sindrom MCI;
- Depresia;
- Leziuni cerebrale traumatice;
- Diverse toxice și medicamente;

- Alte boli (comorbidități): afecțiuni metabolice, endocrine, autoimune, curențiale, infecțioase, tumorale.

Dat fiind faptul că bolile neurodegenerative și bolile cerebrovasculare sunt afecțiuni cronice și progresiv evolutive, se consideră că atunci când MCI este determinat de acestea, agravarea este certitudine. Diagnosticul MCI și al Demenței ușoare se stabilește prin evaluarea celor șase domenii cognitive, bazându-se pe anameză, istoric, examenul neurologic, psihic și pe examenul neurocognitiv (testele neuropsihologice, de ex. Chestionarul activităților funcționale, evaluarea statusului mental prin scala MoCA-Montreal Cognitive Assessment, MMSE). La persoanele cu MCI, scorul MMSE este cuprins între 25-30.

4.4 CRITERII DE DIAGNOSTICE PENTRU MCI:

- pierderi ușoare de memorie (flash-uri amnezice), confirmate obiectiv de familie, colegi și de testele de memorie;
- semnele de deficiență cognitivă corespund etapei a 3-a pe scala GDS (Global Deterioration Scale Reisberg) și 0,5 la Scala de evaluare a demenței clinice (CDR);
- funcționalitatea cognitivă generală păstrată;
- nu se poate stabili diagnosticul de demență (absența diagnosticului de demență);
- activitatea zilnică a pacientului rămâne neafectată, desfășurându-se normal, existând însă, o perturbare ușoară pentru activitățile complexe, cotidiene sau profesionale [24,26].

Scala GDS este structurată în șapte grade de severitate a tulburărilor cognitive și funcționale:

1 = normal

2 = îmbătrânire normală

3 = MCI

4-7 = stadii ușoare, moderate, moderat-severe și severe ale demenței

Gradul 3 al GDS corespunde MCI și reprezintă ușoară deteriorare a funcției cognitive cu afectarea funcționalității doar pentru tipurile complexe de activități sociale și profesionale.

4.5 DECLINUL COGNITIV MINOR VASCULAR (VaMCI)

VaMCI se caracterizează prin absența perturbărilor mnezice, declinul performanțelor frontoexecutive prin disconexiunea circuitelor subcorticale Fronto-Parietale, întreruperea legăturilor dintre cortexul prefrontal și nucleul medial dorsal al talamusului determinând compromiterea proiecțiilor descendente ale ariei prefrontale spre talamus.

Deficitul cognitiv la bolnavii cu AVC constă în întârzierea proceselor mentale, pierderea generalizării conceptelor, tulburări de limbaj și de atenție, labilitate emoțională, apatie, încetinirea gândirii. Se asociază diferite semne neurologice ce

constituie tabloul clinic neurologic specific localizării leziunii cerebrale: deficite senzitivo-motorii, tulburări de echilibru, tulburări ale funcțiilor mentale superioare-agnozia, apraxia (apraxia mersului care este caracteristică leziunilor frontale, se întâlnește frecvent în demență), sindromul pseudobulbar (labilitate emoțională, episoade spasmodice de râs/plâns, automatism oral, întârzierea proceselor mentale). VaMCI se corelează obligatoriu cu prezența unui accident vascular cerebral (AVC), relația dintre cele două fiind intrinsecă și specifică, similară cu relația dintre tipul amnestic de MCI și Demența Alzheimer.

Stabilirea naturii vasculare a tulburărilor cognitive, se bazează pe prezența factorilor de risc cerebrovascular și pe asocierea concomitentă a bolii cerebrovasculare (infarct cerebral teritorial, infarcte lacunare, hemoragie cerebrală, angiopatie amiloidă, leziuni ale substanței albe periventriculare). Declinul cognitiv poate apare și în hemoragia cerebrală, dar se întâlnește mai frecvent în cazul microhemoragiilor determinate de afectarea arterelor mici la pacienții hipertensivi (angiopatia amiloidă). S-a constatat că declinul cognitiv vascular este cauzat cel mai adesea de infarctele cerebrale mici, repetate, multiple și, de regulă, „silenzioase”, fiind doar o descoperire neuroimagică.

Se consideră că VaMCI reprezintă faza preclinică a demenței vasculare (VaD), specific naturii vasculare a MCI fiind tipul nonamnestic disexecutiv al MCI, iar subtipul nonamnestic multiple-domain reprezintă o condiție clinică de predemență vasculară. MCI nonamnestic multiple-domain a fost asociat cu HTA, prezența semnelor motorii extrapiramidale și cu modificări ale substanței albe periventriculare și profunde (hiperintensitate T2 la ex. RMN). Afectarea funcției executive (memoria de lucru, controlul inhibitor/autocontrolul, flexibilitatea cognitivă, planificarea, rezolvarea problemelor) se întâlnește cu predilecție în MCI multiple-domain. Demența multiinfarct (cortical, corticosubcortical) este frecventă postAVC; de asemenea, acești bolnavi prezintă un risc crescut de a dezvolta ulterior și o demență de tip Alzheimer. Studiile au corelat legătura dintre boala cerebrovasculară (istoric de AVC, leziuni extinse ale substanței albe periventriculare și profunde) și MCI nonamnestic multiple-domain caracterizat prin declinul domeniilor cognitive nonmnestic, în special funcțiile executive și tulburările de comportament. Testele neuropsihologice care sunt utile pentru diferențierea VaMCI de AD-MCI, s-au dovedit a fi testul Stroop și testul fluenței scrisului.

4.6 CORELAȚII NEUROIMAGISTICE – DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC AL MCI

Actualele tehnici moderne imagistice (Computer Tomograf-CT și Rezonanță Magnetică Nucleară-RMN) pot decela substratul MCI clarificând etiologia prin precizarea naturii, dimensiunii și localizării leziunii cerebrale asociate, evidențiind

totodată și modificările cerebrale „ silențioase” care amplifică riscul dezvoltării MCI- leziuni difuze ale substanței albe (leucoaraiosa), microhemoragii cerebrale, atrofie cerebrală; referitor la atrofia cerebrală, studiile precizează că aceasta reprezintă factorul major corelat cu riscul de a dezvolta tulburări cognitive, atât atrofia cerebrală generalizată, difuză, cât mai ales atrofia localizată Temporală și, în special, atrofia hipocampală. De asemenea, s-a constatat că nu cu infarctele cerebrale teritoriale cauzate de tromboembolismul arterelor cerebrale mari, se corelează declinul cognitiv, ci cu microleziunile cerebrale determinate de patologia microvasculară (multiple infarcte cerebrale lacunare și microhemoragii cerebrale), precum și cu atrofia cerebrală (aceasta putând fi și consecința leziunilor vasculare cerebrale). Din punct de vedere neuroimagic, îmbătrânirea se corelează cu afectarea substanței albe subcorticale, prevalența hiperintensității substanței albe profunde fiind de 92% din cazurile cu MCI.

4.7 PROGNOSTICUL MCI

Și declinul cognitiv minor și Demența ușoară prezintă un risc major pentru agravare, ambele putând evolua către accentuarea declinului cognitiv. Rata progresiei MCI spre demență este de 7,1% pe an în comparație cu rata progresiei la persoanele cognitiv normale care este de numai 0,2% pe an, riscul progresiei spre demență crescând cu vârsta. Conversia VaMCI nonamnestic către VaD se apreciază a fi de 26% în următorii 3 ani, 46% în următorii 5 ani, rata conversiei fiind de 8% pe an (Zanetti et al.2006).

4.7.1 Factorii predictivi de progresie a MCI

Factorii predictivi de progresie a MCI conversie în demență sunt considerați a fi severitatea leziunilor (hiperintensitate la RMN) substanței albe periventriculare și declinul funcțiilor executive, al limbajului și al atenției susținute. Nonamnestic MCI single domain va progresa către Degenerescenta Fronto-Temporală, fiind faza preclinică a acesteia, nonamnestic MCI multiple-domain va converge către VaD; se consideră că nonamnestic MCI single-domain este mai puțin susceptibil decât tipul amnestic single-domain, de a progresa către demență. Se consideră că aproximativ 70% dintre persoanele cu MCI vor dezvolta în timp o formă de demență. Există studii care demonstrează că MCI poate reveni la normalul cognitiv cu sau fără tratament specific, MCI variabil sau instabil.

4.7.2 Factorii predictivi pentru virarea MCI către debutul demenței Alzheimer sunt:

- prezența genotipului de apolipoproteină epsilon 4;
- atrofia hipocampului (CT/ RMN) și studiul de volum al capului hipocampal (procesul atrofic începe la cap, se extinde la corp, cuprinzând în final coada hipocampului, moment în care apare alterarea funcției cognitive);
- imagistica funcțională (care relevă în cazurile de MCI, o reducere a fluxului sanguin în regiunea Temporo-Hipocampo-Parietală, reprezentând un factor de prognostic infaust, întrucât este favorizată progresia degenerării și instalarea demenței).

4.8 TRATAMENTUL MCI

Deși MCI reprezintă o entitate patologică controversată de unii (având în vedere beneficiile acestui diagnostic, dar și implicațiile lui -stigmatul social, oportunitățile terapeutice, remisiunea spontană a unor MCI către normalitatea cognitivă), la nivel general se consideră ca deosebit de utilă recunoașterea precoce a MCI ca fază de tranziție între îmbătrânirea normală și demență, permițând astfel intervenția terapeutică din stadiul incipient al deteriorării cognitive, acordând o șansă pacientului în ceea ce privește ameliorarea funcționalității cognitive, întârzierea instalării demenței prin prelungirea fazei prodromale sau chiar prevenirea acesteia.

Tratamentul nonfarmacologic se referă la gestionarea factorilor de risc cerebrovascular, stimulare fizică și psihică, intervenții cognitive și comportamentale.

Tratamentul farmacologic se adresează atât factorilor de risc cerebrovascular, cât și simptomelor cognitive și, eventual, psihiatrice. Pentru ameliorarea funcțiilor cognitive, se utilizează o gamă variată de produse nootropice ce pot fi clasificate în patru grupe principale:

- substanțe care acționează asupra unor neurotransmițători (Ach, glutamat);
- substanțe cu acțiune neurotrofică;
- substanțe cu acțiune neurometabolică;
- substanțe cu efect vasoactiv cerebral.

Astfel, la pacienții cu MCI amnestic se recomandă inhibitori de AchE (Donepezil, Galantamină, Rivastigmină). Unii cercetători au încercat un tratament preventiv cu Donepezil la purtători de apolipoproteină epsilon 4 și MCI, dar fără beneficii notabile. Tot rezultate modeste (întârzierea progresiei către demență), s-au obținut și în cazul celorlalți inhibitori de AchE. Se consideră că nu există medicamente care să prevină sau să trateze demența; pot fi folosite medicamente pentru tulburările cognitive și comportamentale, însă ele nu vizează patogenезa declinului cognitiv. Blocanții receptorilor NMDA (Memantina, Glutamatul) ar putea fi utili, dar nu există studii suficiente ca în cazul inhibitorilor de AchE. Deoarece au mecanisme de acțiune diferite, antagoniștii NMDA pot fi asociați I-AchE, însă tot cu rezultate slabe. În MCI vascular,

Îmbătrânirea și demența - o viață mai bună.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și statele partenere.



studiile controlate cu placebo au demonstrat eficacitatea slabă a inhibitorilor de AchE și a blocaților de receptori NMDA.



5. DEMENTA

5.1 DEFINIȚIE

Demența este o tulburare neurocognitivă cu diferite grade de severitate (DSM-5); reprezintă o categorie largă de boli cerebrale cu evoluție cronică, dereglă lent progresivă, caracterizată prin scăderea treptată a abilităților cognitive, în special memoria și învățarea, atenția, limbajul, orientarea spațială, calculul, capacitatea de gândire și de judecată, până la stadiul în care poate fi afectată funcționarea zilnică a pacientului și, în consecință, dependența totală a acestuia de anturaj, familie și societate. Frecvent, se asociază: dezechilibre emoționale, modificări ale personalității, tulburări psihiatrice, diminuarea motivației, tulburări comportamentale.

5.2 CLASIFICARE

După localizare, demența poate fi :

CORTICALĂ

- prin afectarea cortexului cerebral
- predomină tulburările de memorie, de limbaj și ale praxiei

SUBCORTICALĂ - domină tulburările de personalitate, tulburările de comportament, de gândire (bradifrenie) și de atenție, memoria și limbajul fiind de regulă cruțate

Din punct de vedere etiologic, demențele constituie un grup heterogen de afecțiuni neurologice și sistemice:

- Boala Alzheimer-cel mai frecvent tip de demență (50-70% din cazurile de demență)
- Demența vasculară (25%) -
 1. Demența multiinfarct Hachinski
 2. Boala Binswanger
 3. Infarct strategic
 4. CADASIL
- Demența din alfa-sinucleinopati
- Demența cu corpi Lewy (15%) și demența asociată bolii Parkinson
- Demența mixtă (10%) - boala Alzheimer asociată cu demența din bolile cerebrovasculare sau cu demență cu corpi Lewy, etc. (de regulă, o combinație a bolii Alzheimer cu un tip de demență)
- Demența Fronto-Temporală
- Demența din boala Huntington
- Boala Hallervorden-Spatz
- Paralizia supranucleară progresivă
- Demența posttraumatică
- Demența din Hidrocefalia cu presiune normală (sindromul Hakim & Adams)

- Demența din infecția cu HIV (Complexul SIDA-demență)
- Demența din Scleroza multiplă
- Boala Creutzfeldt-Jakob
- Neurosifilisul (Paralizia generalizată progresivă)
- Demețe de cauze diverse: metabolice, endocrine, autoimune, infecțioase, carentiale, paraneoplazice
- Demența indusă de consumul de substanțe toxice și medicamentoase: alcool, droguri, plumb, mercur, pesticide, antidepressive triciclice, litiu.

5.3 EPIDEMIOLOGIA DEMENTEI

Incidență. Prevalență. Mortalitate

Demența cu diferitele ei tipuri este o afecțiune cronică, tot mai frecvent diagnosticată, ce interesează mai ales persoanele vârstnice, cca 10% din populație dezvoltând tulburări mnemonice, frecvența crescând cu vârsta. Se consideră că apare la:

- cca 3% din populația cuprinsă între 65-74 ani,
- cca 19% dintre persoanele cu vârste între 75-84 ani și la
- cca 50% la cei cu vârste peste 85 ani.

La nivel mondial, în anul 2015 s-au înregistrat cca 47,5 milioane de pacienți cu demență, în 2012 existau 35,6 milioane de bolnavi, anticipându-se că numărul acestora se va tripla în anul 2050. După vârsta 65 ani, prevalența demenței variază, în general, între 5-10%; se consideră că prevalența demenței se dublează la fiecare 5 ani, astfel că la 75 ani, 4% din populație va fi afectată, iar la 85 ani-16% din populație; prevalența bolii Alzheimer se dublează la fiecare 4,3 ani, iar prevalența VaD se dublează la fiecare 5,3 ani. În fiecare an apar cca 7,7 milioane de noi cazuri de demență, întrucât, crescând speranța medie de viață a populației, implicit crește numărul persoanelor vârstnice și în consecință, procentul pacienților diagnosticați cu demență.

Mortalitate - în anul 2013 s-au înregistrat 1,7 milioane decese datorate demenței, în 2015 au fost declarate 1,9 milioane decese datorită demenței, față de 0,8 milioane decese în anul 1990.

Este unanim acceptat faptul că demența este subdiagnosticată în peste 50% din cazuri și subtratată în peste 75% din cazuri.

5.4 DIAGNOSTICUL DEMENTEI

Întrucât există diverse cauze ale declinului cognitiv și ale demenței, diferențiindu-se multiple tipuri specifice de MCI și de demență și, datorită faptului că simptomele sunt foarte asemănătoare, este, de regulă, destul de dificil de diagnosticat tipul demenței doar pe baza simptomelor. În momentul actual, pentru diagnosticul de demență, sunt utilizate criteriile din DSM-IV și anume:



- dezvoltarea în ultimele 6 luni a unor deficite cognitive, afectarea obligatorie a memoriei plus cel puțin una dintre următoarele: afazie, apraxie, agnozie, funcția executivă (planificare, organizare, secvențializare, abstractizare);
- deficitul cognitiv trebuie să fie în declin față de un nivel anterior și să afecteze semnificativ funcționalitatea socială și ocupațională;
- este exclus delirium-ul și orice alt tip de tulburare confuzională;
- se aplică criteriile specifice de diagnostic pentru precizare etiologică;
- afectarea memoriei este obligatorie, dar nu neapărat și dominantă;
- Pentru diagnosticul de tulburare cognitivă ușoară, ghidurile recomandă utilizarea criteriilor Petersen:
- acuze subiective ale pacientului/familiei privind alterarea memoriei;
- obiectivarea acestor tulburări mnezice la testele neuropsihologice;
- conservarea funcționalității zilnice, sociale și profesionale;
- funcția cognitivă normală;
- absența demenței.

Pentru diagnosticul pozitiv al demenței, în afară de criteriile diagnostice DSM-IV, în vederea precizării tipului etiologic, se recomandă evaluarea complexă clinico-paraclinică a pacientului: istoric și anamneză, examenul clinic general, neurologic și psihiatric (inventarul neuropsihiatric), evaluarea neuropsihologică (sunt obligatorii MMSE, Testul desenării ceasului și chestionarul activității zilnice funcționale-ADL); din punct de vedere paraclinic, se recomandă analize de laborator (analize uzuale, ionograma serică/ electroliți, TSH, nivel seric de B12, acid folic, homocisteină, dar și analize specifice (inclusiv examenul LCR), în funcție de suspiciunea etiologică, precum și neuroimagistică (CT sau RMN craniocerebral), toate acestea fiind absolut necesare pentru stabilirea etiologiei tulburărilor cognitive și pentru precizarea tipului de demență. De asemenea, uneori este recomandabil și examenul electro-encefalografic (EEG), fiind util pentru diagnosticul bolii Creutzfeldt-Jakob și al encefalitelor.

5.5 DIAGNOSTICUL DIFERENȚIAL AL SINDROMULUI DEMENTIAL (PSEUDODEMENȚĂ):

Demența trebuie deosebită de alte afecțiuni, care pot avea un tablou clinic similar:

- condiții medicale generale hipotiroidism, hipercalcemie, hipoglicemie, deficit de vitamine (B12, niacina), insuficiența hepatică sau renală, boli autoimune sau afecțiuni neurologice (AVC, tumori cerebrale)
- condiții determinate de diferite substanțe: alcool, droguri, medicamente;
- afecțiuni psihice: deliriumul, tulburarea cognitivă ușoară, declinul cognitiv asociat cu înaintarea în vârstă, depresia vârstnicului (pseudodemența), retardarea mentală, deficitul cognitiv din schizofrenie.

6. DEMENTA VASCULARĂ

Demența vasculară (VaD) constituie un grup heterogen de tulburări cognitive determinate primar de patologia cerebrovasculară și reprezintă peste 20% (20-25%) din totalul cazurilor de demență, secondând boala Alzheimer (Gorelick et al. 2011). Leziunile cerebrale care pot determina disfuncția cognitivă sunt:

- AVC (infarcte corticale mari)
- Infarcte strategice subcorticale (girusul angular, inferomezial Temporal, mezial Frontal, genunchiul capsular intern stâng, ganglionii bazali, talamus)
- Infarcte lacunare multiple, politopice
- Degenerarea substanței albe subcorticale (leucoaraioza)

6.1 EPIDEMIOLOGIE VaD

Se consideră că prevalența VaD se dublează la fiecare 5,3 ani; studiile imagistice (RMN) din ultimii ani au evidențiat prevalența crescută a bolii vaselor mici la populația vârstnică (23% pentru infarctele mici, lacunare și 95% pentru leziunile/hiperintensitatea substanței albe periventriculare și profunde) corelată cu riscul crescut pentru AVC și demență (prin compromiterea sistemului colinergic). De asemenea, prevalența VaD în cazul infarctelor cerebrale asimptomatice („silenzioase”), variază între 5,8% și 17,7%, cu o medie de 11% , iar în cazul unui singur infarct cerebral, prevalența diferă în funcție de localizare (52% pentru ganglionii bazali, 35% pentru localizările subcorticale și 11% pentru localizarea corticală). Leziunile substanței albe încep să apară după vârsta de 30 de ani, sunt comune la vârstnici și reprezintă un factor de risc major pentru VaD. În ceea ce privește prevalența VaD după stroke, se consideră că aceasta depinde de perioada parcursă post AVC, de dimensiunile și de localizarea infarctului, precum și de comorbiditățile asociate; astfel, se apreciază că VaD postAVC are o prevalență de 30% imediat după AVC, iar incidența crește cu 7% cazuri noi de VaD după un an de la AVC și 48% după 25 de ani de la stroke. De regulă, un AVC crește de 2 ori riscul de demență, bolnavul cu VaD având un important declin funcțional, precum și o rată mare de mortalitate. În funcție de coexistența atrofiei Temporale mediale, incidența VaD la trei ani după AVC, este de 81%, comparativ cu cei fără atrofie medială Temporală la care este de 58%. Prevalența VaD în țările dezvoltate variază între 0,6 și 2,1%, fiind de 1,6% la persoanele peste 65 de ani. Unele studii au demonstrat o incidență a VaD mai mare la bărbați decât la femei, precum și incidență mai mare la rasa neagră față de cea albă; alte studii nu au depistat nici o diferență legată de sex sau de rasă.

6.2 ETIOLOGIA VaD. CORELAȚII NEUROPATHOLOGICE ȘI BIOLOGICE

Din cadrul bolilor cerebrovasculare care determină declin cognitiv, cel mai frecvent întâlnit este infarctul cerebral; infarctele cerebrale cronice, mici, silențioase (asimptomatice) sunt deseori întâlnite la vârstnici și mult mai frecvente decât AVC-ul clinic, iar infarctele microscopice sunt mai frecvente decât cele macroscopice; dacă s-ar lua în considerare includerea în patologia vasculară a infarctelor microscopice și a leziunilor substanței albe ca și expresie a suferinței vaselor mici, atunci frecvența bolii cerebrovasculare la vârstnici ar crește la peste 75%. Studiile clinico-patologice au constatat că infarctele cerebrale mari, precum și numărul crescut de infarcte macroscopice, se corelează cu un risc important de dezvoltare a VaD, dar în momentul actual nu sunt acceptate criteriile neuropatologice referitoare la dimensiunea și numărul infarctelor cerebrale pentru diagnosticul clinic de demență, existând totuși, un grad de corelație cu localizarea acestora; astfel, s-a dovedit că zonele cel mai frecvent implicate în dezvoltarea disfuncției cognitive sunt girusul angular, ganglionii bazali și talamusul. De asemenea, microinfarctele multiple sunt mai susceptibile de a dezvolta demența, întrucât acestea sunt corelate cu hipoxia cerebrală cronică difuză, stresul oxidativ, fenomene inflamatorii, alterarea permeabilității barierei HematoEncefalice (BHE). S-a constatat că la vârstnici este frecventă asocierea dintre infarctele cerebrale și Demența Alzheimer, aproximativ 50% dintre bolnavii cu AD având de fapt patologie mixtă, asocierea patogeniei vasculare cu cea neurodegenerativă crescând riscul, dar și amploarea declinului cognitiv (prin efect multiplicativ, de augmentare). Alte cauze vasculare pentru disfuncția cognitivă sunt:

- microhemoragiile cerebrale
- leziuni degenerative ale substanței albe periventriculare
- boala vasculară primară a vaselor mici (arterioscleroza/lipohialinoza, ateroscleroza și angiopatia amiloidă cerebrală)

Studiile neurobiologice au demonstrat că unitatea neurovasculară (neuron, glie, celule vasculare și perivasculare) este profund alterată în VaD și AD prin modificările microvasculare (membrană bazală îngroșată, degenerare hialină, vase sinuoase, reducerea numărului acestora, acumulare de amiloid beta în media arteriolelor corticale), stresul oxidativ și inflamația fiind principalele cauze ale disfuncției neurovasculare; aceasta determină la rândul ei hipoperfuzie cerebrală, alterarea BHE, reducerea factorilor trofici și ca urmare, diminuarea potențialului de reparare. De reținut este faptul că stresul oxidativ și inflamația pot reprezenta potențiale veritabile ținte terapeutice.

6.3 CORELAȚII NEUROPATHO-IMAGISTICE

Studiile neuroimagingistice au demonstrat că fenomenul de degenerare a substanței albe (secvențe RMN: fluid-attenuated inversion recovery și Diffusion tensor imaging),

precum și microhemoragiile cerebrale, sunt corelate atât cu VaD, cât și cu boala Alzheimer, iar studiile neuropatologice au constatat că acestea sunt corelate cu lipohialinoza, deși degenerarea substanței albe este asociată în principal cu AD, iar microhemoragiile cerebrale sunt asociate predominant cu angiopatia amiloidă cerebrală. Studiile de volum hipocampal au demonstrat că atrofia hipocampică se corelează atât cu AD, cât și cu VaD, deci este asociată ambelor procese etiopatogenice, neurodegenerativ și vascular; așadar, degenerarea substanței albe și microhemoragiile considerate până nu demult ca fiind specifice pentru VaD, pot apare și în patologia neurodegenerativă, iar atrofia hipocampală apreciată ca biomarker specific AD, ar putea reflecta și patologia vasculară.

6.4 DIAGNOSTIC POZITIV

VaD se referă la tulburările cognitive cu patogeneză vasculară cerebrală ischemică sau hemoragică; VaMCI reprezintă echivalentul vascular al MCI, tranziția pe un continuum cognitiv de la normal la demență, determinată de un AVC clinic manifest sau de o suferință vasculară cerebrală subclinică. Criteriile clinice pentru diagnosticul VaD sunt Criteriile NINDS-AIREN care se fundamentează pe doi factori:

- Demonstrarea existenței suferinței cognitive (anamneză, ex. clinic și teste neuropsihologice) și
- Istoric de AVC clinic sau evidențierea neuroimagică a bolii vasculare cerebrale

Diagnosticul clinic pozitiv al VaD se stabilește pe declinul funcției cognitive față de nivelul anterior cu afectarea a cel puțin două arii (domenii) cognitive, suficient de severă încât să interfereze cu activitatea de zi cu zi a pacientului și independent de sechelele senzitivo-motorii postAVC. Declinul cognitiv este evaluat prin testele cognitive care trebuie să investigheze minim patru arii cognitive: funcția executivă/atenția, memoria, limbajul, precum și funcția vizuospațială. Natura vasculară a declinului cognitiv este de regulă stabilită de examenul obiectiv neurologic care depistează prezența semnelor neurologice de focar (pareză facială centrală, hemipareze/hemiplegii, modificări de reflexe, reflexe patologice- Hoffmann, Babinski, sindrom senzitiv, hemianopsie, afazie, afectarea nervilor cranieni etc). Neuroimagistica (CT/RMN) completează diagnosticul pozitiv de VaD prin depistarea infarctelor cerebrale (unic, multiple, infarct unic localizat strategic, lacune multiple în ganglionii bazali sau la nivelul substanței albe periventriculare, degenerarea substanței albe profunde). De asemenea, trebuie stabilită temporal relația de cauzalitate dintre boala cerebrovasculară și declinul cognitiv.

6.4.1 Diagnosticul pozitiv de VaD probabilă:

- există declin cognitiv și boală cerebrovasculară evidențiată neuroimagic



- există o legătură temporală între deficitul cognitiv și evenimentul vascular cerebral
- există o legătură evidentă între severitatea și pattern-ul declinului cognitiv cu boala cerebrovasculară difuză subcorticală (ex. CADASIL)
- dacă nu există istoric de deficit cognitiv progresiv și gradual după AVC este sugerată prezența unei afecțiuni neurodegenerative nonvasculare.

Sunt câteva semne clinice neuropsihice considerate caracteristice pentru diagnosticul de VaD probabilă, și anume:

- tulburări de mers (ataxic, apraxic sau de tip parkinsonian)
- tulburări ale stabilității posturale
- tulburări micționale
- sindrom pseudobulbar
- alterarea personalității și a dispoziției afective

6.4.2 Diagnosticul pozitiv de VaD posibilă

Există declin cognitiv și evidență neuroimagică de boală cerebrovasculară, dar:

- nu este clară legătura temporală, nici relația de severitate sau de pattern cognitiv între boala vasculară și disfuncția cognitivă;
- nu există suficiente argumente pentru diagnosticul de VaD (clinic sugestiv pentru boala vasculară, dar imagistic normal);
- severitatea afaziei nu face posibilă evaluarea cu testele de cogniție;
- coexistă alte boli neurodegenerative sau alte comorbidități care pot afecta cogniția;
- antecedente personale patologice de boală neurodegenerativă (boală Parkinson, Demența cu corpi Lewy, Paralizia supranucleară progresivă, boala Alzheimer confirmată de biomarkeri- PET, LCR, liganzi amiloizi - sau de examenul genetic-mutație PSI);
- istoric de cancer activ, de boli psihiatrice sau metabolice.

6.4.3 VaMCI instabil (variabil):

Persoană diagnosticată cu VaMCI probabil sau posibil la care cogniția revine la normal.

Boala cerebrovasculară cu sau fără AVC clinic, se poate asocia cu depresia, având un impact major asupra VaD, influențând negativ funcționalitatea zilnică a pacientului și performanțele sale cognitive, tratamentul depresiei diminuând în paralel și gravitatea declinului cognitiv; această „reversibilitate” reprezintă una din particularitățile VaD, o altă particularitate fiind tendința recuperatorie spontană poststroke, atât a deficitului neurologic, cât și a celui cognitiv, procesul de cogniție făcând parte din procesul de recuperare postAVC.

Din cadrul abilităților cognitive, cel mai afectat domeniu în VaD este cel al funcției executive, însă nefiind specific pentru VaD așa cum sunt tulburările mnezice pentru demența Alzheimer. În concluzie, diagnosticul pozitiv al VaD se bazează pe examenul clinic general, neurologic, psihiatric, evaluarea funcției cognitive prin testele neuropsihologice și pe neuroimagistică.



7. TRATAMENTUL CLASIC ÎN DEMENTĂ. NOI PERSPECTIVE TERAPEUTICE

Tratamentul demenței este foarte limitat; în momentul actual, în pofida cercetărilor și a descoperirilor științifice, nu există medicamente eficiente în prevenția sau în terapia demenței, iar cele câteva utilizate curent reprezintă doar un tratament simptomatic și nu unul care să se adreseze procesului etiopatogenic de bază. În tratamentul demenței, țintele terapeutice sunt managementul factorilor de risc și tratamentul simptomatic.

7.1 MANAGEMENTUL FACTORILOR DE RISC

7.1.1 Prevenția primară se adresează factorilor de risc modificabili:

- stilul de viață (educație, dietă vegetariană cu factori antioxidanți-vit.E, vit.A, acizi grași polinesaturați omega 3,6,9, vit. D, vit din complexul B-B6, B12, acid folic- implicate în metabolismul homocisteinei)
- activitate fizică și psihică (a fost dovedit că exercițiile fizice determină creșterea neurotrofinelor cerebrale-BDNF, ameliorează funcția cerebrovasculară și perfuzia cerebrală, crește plasticitatea cerebrală prin stimularea sinaptogenezei și a neuronogeneze).
- alți factori de risc: obezitatea, alcoolul, fumatul (deși acesta se asociază cu stresul oxidativ și cu inflamația, totuși nicotina stimulează direct receptorii colinergici ameliorând astfel transmisia sinaptică colinergică; trebuie avut în vedere, însă, efectul proagregant plachetar al nicotinei, cu creșterea vâscozității sanguine).
- condiții clinice și biologice: HTA, Diabetul zaharat, hiperlipidemia, inflamația cronică (prin creșterea nivelului seric al proteinelor inflamatorii specifice alfa1-antichimotripsină și proteina C reactivă)
- comorbidități vasculare: boala arterială coronariană, fibrilația atrială, insuficiența cardiacă, boala cronică de rinichi (asociată cu encefalopatia metabolică uremică și hipertensivă, precum și cu riscul de stroke), AVC (crește riscul de VaD cu 10%, iar în caz de recurență cu aproximativ 30%).

7.1.2 Prevenția secundară

Se referă la tratamentul de prevenția secundară a accidentelor vasculare cerebrale (statine, hipotensoare, antiagregante plachetare, anticoagulante, vasoactive cerebrale).

7.2 TRATAMENTUL DEMENTEI

7.2. 1 Tratamentul nonfarmacologic

Se recomandă ca adjuvant în managementul terapeutic al demenței și se referă în primul rând la suportul social ce trebuie acordat acestor bolnavi (servicii medicale integrate-îngrijire primară la domiciliu, servicii medicale de zi, asistență specializată în cămine spital), precum și la terapii psihologice de stimulare și reabilitare cognitivă, dar și la îngrijiri paliative. Se recomandă:

- Programe structurate de stimulare cognitivă;
- Programe pentru dezvoltarea unor abilități neuromotorii noi;
- Terapie ocupațională și socială;
- Terapie de susținere;
- Îngrijire și supraveghere permanente (stadii avansate);
- Terapie de grup pentru familiile pacienților cu demență;
- Tehnici simple de îmbunătățire a memoriei.

Pe lângă tratamentul medicamentos, bolile care afectează memoria pot fi încetinite sau chiar stopate printr-un stil de viață sănătos și prin câteva tehnici simple, dar extrem de eficiente. Printre acestea se numără:

- Întocmirea unei liste zilnice de activități și folosirea unui jurnal zilnic;
- Activitate fizică regulată, benefică indiferent de vârstă;
- Antrenarea creierului prin rezolvarea cuvintelor încrucișate, Sudoku, citit și exerciții de logică;
- O alimentație sănătoasă și echilibrată.

7.2.2. Tratamentul farmacologic al Demenței

Terapia simptomelor cognitive (diminuarea proceselor neurodegenerative, ameliorarea și stabilizarea declinului cognitiv): inhibitori de colinesterază (Donepezil, Rivastigmina, Galantamina), antagoniști NMDA (Memantina).

Deficitul colinergic cerebral este precoce, important și caracteristic pacienților cu demență, determinând tulburări amnezice și declin cognitiv progresiv; de aceea, căile aceticolinei reprezintă una din țintele terapeutice vizate, urmărindu-se creșterea cantității acestui neurotransmițător la nivel cerebral. Acetilcolina „molecula memoriei” este esențială pentru desfășurarea proceselor implicate în memoria de stocare și de evocare, precum și în raționamentul analitic și asociativ.

În ciuda cercetărilor și a progreselor înregistrate în domeniul demenței, pentru tratamentul acesteia nu s-au descoperit încă medicamente specifice care să acționeze la nivel etiopatogenic. Practic, există două categorii terapeutice aprobate, aplicabile clinic: Inhibitorii de acetilcolinesterază (Donepezil, Riva- stigmină, Galantamina și Tacrina) și blocanții de receptori NMDA (Memantina); cele două categorii terapeutice putând fi utilizate și în combinație.

Inhibitorii de Acetilcolinesterază (I AchE)

Studiile acestora le-au testat eficacitatea asupra cogniției, precum și asupra funcționalității zilnice și globale. Astfel, s-a demonstrat că Donepezilul (5-10 mg/zi) aduce beneficii cognitive, dar fără a influența funcționalitatea globală (Class IIa, Level of Evidence A), iar un studiu a relevat faptul că rata mortalității a fost mai mare decât în lotul placebo; uneori determină bradicardie și sincopă. În general, se consideră că Donepezilul poate fi util în AD, în demența asociată bolii Parkinson, în boala cu corpi Lewy și în VaD. Galantamina (16-24 mg/zi) s-a dovedit a avea efecte benefice

cognitive, inclusiv pentru funcția executivă, dar fără impact asupra funcționalității zilnice (Class IIa, Level of Evidence A); poate fi benefică în demența mixtă (AD-VaD). Rivastigmina (6-12 mg/zi) este mai puțin studiată, ar fi benefică pentru funcția executivă. Eficacitatea ei nu este bine stabilită pentru VaD (Class II b Level of Evidence A).

Antagoniști ai receptorilor NMDA - Memantina (10-20 mg/zi) se recomandă ca medicație de a doua opțiune pentru VaD, asociată tratamentului de profilaxie secundară a AVC; are beneficii cognitive, precum și asupra tulburărilor de comportament, dar nu influențează funcționalitatea globală și zilnică; beneficiile ei nu sunt stabilite cert pentru VaD (Class II b, Level of Evidence A).

În general, se consideră că cele două categorii farmacologice recomandate în prezent pentru tratamentul demenței au un beneficiu minor, sub nivelul expectanțelor. Datorită mecanismelor de acțiune diferite, cele două tipuri de medicamente pot fi folosite și în combinație, dar tot cu beneficiu redus.

Tratamentul farmacologic simptomatic noncognitiv se referă în principal la antipsihotice, antidepresive și timoleptice adresate tulburărilor psihiatrice ale pacienților cu demență (tulburări comportamentale, modificări ale dispoziției afective)-anxiolitice, sedative, neuroleptice, antidepresive, antiepileptice, hipnotice.

Noi perspective terapeutice. Noi promisiuni pentru bolnavii cu demență. Alte categorii terapeutice cu acțiune simptomatică colinergică și posibil neuroprotectivă

Au fost studiate și alte substanțe medicamentoase care ar putea fi utile în ameliorarea funcțiilor cognitive ale bolnavilor cu demență, multe dintre acestea fără eficiența scontată, însă altele s-au dovedit a fi demne de reținut în atenția oamenilor de știință, rămânând doar ca rezultatele cercetărilor din viitorul apropiat să decidă eficiența lor sau nu. Dintre acestea, amintim:

- **DIMEBOLIN** = inhibitor de AchE, inhibitor al canalelor de calciu tip L și blocant al receptorilor NMDA
- **FENSERINA**= inhibă acetilcolinesteraza, reduce apolipoproteina B și Beta-amiloidul
- **MEMOQUINA**= inhibă acetilcolinesteraza, are efect antioxidant, reduce agregarea beta-amiloidului și hiperfosforilarea
- **BIS-TACRINA**
- **LIPOCRINA**
- **CITIDINEDIFOSFOCOLINA**
- **NIMODIPINA**
- **PIRACETAMUL**
- **VINPOCETINA**
- **HUPERZINA A**= alcaloid extras din HUPERZIA SERRATA, cu acțiune complexă și efecte multiple la nivel cerebral, constituind o soluție promițătoare în tratamentul declinului cognitiv minor și al demenței.

Din gama variată de substanțe studiate pentru tratamentul demenței, au fost reținute doar două de către oamenii de știință, în vederea continuării cercetării lor, și anume: Nimodipina și Huperzina Ambele dovedindu-se a fi promițătoare în special în boala vaselor mici și meritând a fi studiate aprofundat în viitor.

- Terapia simptomelor non-cognitive: antidepresive, antipsihotice;
- Îmbunătățirea componentei funcționale a circulației cerebrale: Piracetam, Pramiracetam;
- Tratatamentul comorbidităților somatice: antihipertensive, statine, antiagregante plachetare;
- Prevenția factorilor de risc evolutiv (hipoxia cerebrală, disfuncțiile metabolice).

7.3 TRATAMENTUL ETIOLOGIC ÎN PSEUDODEMENȚĂ

Pentru situațiile în care tabloul demențial a apărut ca urmare a unei cauze ce poate fi tratată, astfel:

- Vitamine pentru a elimina deficitul de B12;
- Tratatament neurochirurgical în caz de tumori cerebrale, hidrocefalie;
- Tratarea depresiei;
- Oprirea oricărui tratament medicamentos care declanșează simptome specifice demenței;
- Medicamente hormonale, pentru tratarea hipotiroidismului;
- Tratare encefalite/meningoencefalite

7.4 ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI CU DEMENȚĂ

Nutriție corectă (alimentare și hidratare)- este foarte probabil ca un bolnav cu demență să uite să mănânce sau să bea apă la timp și, de aceea, va avea nevoie de cineva care să se asigure că este hrănit corespunzător. De asemenea, un suferind de demență în stadiu avansat va întâmpina dificultăți în mânuirea tacâmurilor și va trebui ajutat de către altcineva. În cazul în care un membru al familiei nu se poate ocupa de hrănirea bolnavului, se poate apela la ajutor specializat.

Crearea unui mediu sigur și protejat

Pentru că un bolnav de demență nu mai conștientizează pericolul și nu mai poate fi responsabil pentru deciziile sale, este important ca acestuia să-i fie asigurat un mediu în care să nu se poată accidenta. Pentru a realiza acest lucru, trebuie avute în vedere anumite aspecte:

- Nu se lasă la îndemâna bolnavului obiecte periculoase, ascuțite, tăioase;
- Nu se lasă medicamentele și substanțele toxice la îndemâna bolnavului;
- Se elimină mochetele și pragurile de care bolnavul s-ar putea împiedica;



- Încăperile folosite de bolnav sunt luminate și noaptea, pentru a nu exista riscul accidentării.

Chiar dacă demența este, în majoritatea cazurilor, o boală incurabilă și ireversibilă, este important să ne asigurăm că persoanele care suferă de o astfel de afecțiune sunt îngrijite corespunzător și sunt ajutate să ducă o viață demnă, într-un mediu sigur.

8. DIAGNOSTICUL PRECOCE AL DECLINULUI COGNITIV

Pacienții diagnosticați cu deteriorare ușoară a funcției cognitive prezintă o alterare minimă a acesteia și un risc crescut de evoluție spre demență. Această deteriorare este frecvent neglijată atât de către pacient sau de către familia acestuia, cât și de către medicul de familie. Până în prezent, nu există terapii eficiente în modificarea evoluției și a prognosticului afecțiunii, managementul acesteia rezumându-se la depistarea activă, din etapa de debut, a manifestărilor clinice și la controlul adecvat al comorbidităților și factorilor de risc incriminați în creșterea riscului de apariție și progresie. În momentul actual, nu se practică un screening pentru depistarea în masă a deteriorării funcției cognitive la populația asimptomatică, cu vârsta de peste 65 de ani, dar se recomandă frecvent testarea neuropsihologică a pacienților care prezintă comorbidități, ce pot reprezenta factori de risc pentru demență.

Deteriorarea ușoară a funcției cognitive (mild cognitive impairment) este definită ca alterare minimă a funcției cognitive (cel mai frecvent, a capacității de memorizare) observate de către pacient, familie sau medic, al cărei grad de severitate poate fi măsurat prin teste validate de evaluare a statusului mintal și care permite conservarea independenței funcționale.

Disfuncția cognitivă (tulburarea cognitivă) se referă la modificări structurale și funcționale cerebrale ce au drept consecință afectarea funcțiilor cognitive (memoria, învățarea, orientarea, percepția, judecata etc). Se descriu mai multe tipuri de disfuncții cognitive (cu multiple subtipuri), având cauze și abordări terapeutice diferite: delirul, demența, amnezia, alte disfuncții cognitive, de exemplu disfuncția cognitivă ușoară sau disfuncțiile cognitive nespecifice.

Diagnosticul prezumptiv este fundamentat pe criterii clinice, dar se înregistrează progrese rapide pentru validarea testelor neuroimagistice sau de laborator care vor permite diagnosticul pozitiv și evaluarea riscului de conversie în demența Alzheimer cât mai timpuriu (atrofia cerebrală, testele genetice, decelarea beta-amilodului etc).

Foarte importantă este excluderea altor condiții medicale care ar putea explica disfuncția neurocognitivă: cauze iatrogene (anticolinergice, antihistaminice, antidepresive triciclice, hipnotice, benzodiazepine, opioide, neuroleptice, antiepileptice, miorelaxante, digoxină, corticosteroizi), tulburări metabolice și electrolitice, delirul de însoțire al unor afecțiuni intercurente ale vârstnicului sau afecțiuni psihiatrice (depresia).

De asemenea, este recomandată evaluarea factorilor de risc metabolici și vasculari ai adultului de vârstă medie (diabetul zaharat, obezitatea, hipertensiunea arterială, hipercolesterolemia), care sunt corelați cu un declin al funcției cognitive și un risc crescut de a dezvolta demență. Se consideră că detectarea precoce a deteriorării funcției cognitive și controlul instalării și evoluției comorbidităților care constituie

factori de risc înalt în apariția declinului cognitiv minor, reprezintă singurele opțiuni de management.

Trebuie menționat faptul că între conceptul de tulburare neurocognitivă și demență nu există un semn de egalitate, primul fiind unul mai larg, tulburarea neurocognitivă poate cuprinde și cazurile în care deteriorarea se manifestă într-o singură arie cognitivă (doar memoria, doar limbajul, doar atenția etc), în timp ce demențele implică deteriorarea funcționării în cel puțin două arii de cogniție; în cazul demenței Alzheimer, una din ariile cognitive deteriorate vizează în mod obligatoriu domeniul memoriei și al învățării. În evaluarea demențelor se recomandă o abordare interdisciplinară, deoarece se pot obține indicii relevante: genetica, neurologia, psihiatria, psihologia.

8.1 IMPORTANȚA DETECTĂRII PRECOCE A DETERIORĂRII UȘOARE A FUNCȚIEI COGNITIVE

Studiile efectuate în domeniul asistenței primare au dezvăluit că peste 90% dintre pacienții care prezintă declin cognitiv minor, nu sunt evaluați clinic și rămân nedepistați de către medicul de familie, deși acesta reprezintă prima verigă în legătura cu pacienții cu comorbidități cu risc înalt. Această realitate poate fi explicată prin neglijarea sau nerecunoașterea simptomatologiei de debut, prin aprecierea că pierderea memoriei este un proces fiziologic în cazul persoanelor vârstnice, din cauza lipsei unei medicații eficiente sau întrucât medicația simptomatică nu poate fi inițiată de către medicul de familie. Este oportună informarea precoce a pacienților cu risc de a dezvolta demență, iar depistarea deficienței cognitive minore poate oferi avantaje în ceea ce privește tratamentul și controlul adecvat al comorbidităților care cresc riscul de apariție sau de progresie a declinului funcțional.

8.2 DIAGNOSTICUL PREZUMTIV AL DETERIORĂRII MINORE A FUNCȚIEI COGNITIVE

Algoritmul de diagnostic prezumtiv cuprinde:

- excluderea cauzelor iatrogene, vasculare, traumatiche, metabolice, psihiatrice (delir, depresie), care pot conduce la un declin cognitiv
- examinarea pe patru paliere clinice:
 - ▶ anamnestic, pentru identificarea acuzelor sau observarea alterării ori declinului funcției cognitive de către pacient sau familie
 - ▶ obiectivarea acestui declin prin testarea structurată a funcției cognitive (memorie, atenție etc)
 - ▶ excluderea afectării activităților zilnice obișnuite
 - ▶ excluderea semnelor de demență
- analiza parametrilor hematologici și biochimici (electroliti, glicemie, markerii funcției renale), testarea funcției tiroidiene și determinarea nivelurilor serice ale vitaminei B12 sau acidului folic.

- neuroimagistica: CT, RMN, PET, SPECT

Se recomandă ca funcția cognitivă să fie testată în cazul tuturor pacienților la care se observă (prin autoevaluare sau evaluare intermediată) o deteriorare a memoriei sau a proceselor de gândire, precum și în cazul adulților de peste 65 de ani care asociază factori de risc înalt pentru MCI: istoric de diabet zaharat, accident vascular cerebral, depresie, dificultăți de autogestionare a medicației sau de desfășurare a activităților profesionale sau personale. Este oportună păstrarea unei atitudini evaluative în fața semnelor și simptomelor de afectare cognitivă, în special față de tulburările de memorie și limbaj la pacienții cu risc înalt, prin utilizarea în cabinetele de asistență primară a unor instrumente cum este Indicatorul de Screening al Demenței. Medicul de familie poate efectua asemenea testări sau poate transfera pacientul către compartimentele de psihiatrie, geriatrie, neuropsihologie sau către centrele specializate în diagnosticul și urmărirea pacienților cu declin al funcției cognitive sau demență.

În unele țări (de ex. Marea Britanie) se recomandă depistarea activă a tulburărilor cognitive și prevenția secundară a demenței în cazul pacienților cu vârstă medie sau avansată și care prezintă factori de risc vascular sau factori de risc care pot fi controlați (fumat, consum excesiv de alcool, obezitate, diabet zaharat, hipertensiune sau hipercolesterolemie). Acestor pacienți li se asigură consultații periodice de urmărire la 6-12 luni sau oricând se observă progresia declinului cognitiv sau apariția celui funcțional.

8.3 STADIUL PRECLINIC AL DEMENTEI ALZHEIMER

36 de milioane de oameni suferă la nivel global de boala Alzheimer, iar până în 2050 se estimează că vor fi 115 milioane de cazuri. Modificările cerebrale apar chiar și cu 20 de ani înainte de instalarea primelor simptome.

Principalele două caracteristici ale acestui stadiu sunt legate de absența simptomelor clinice (încă nu apare deteriorarea cognitivă), dar cu prezența de modificări la nivelul biomarkerilor specifici (acumulările bete-amiloidice). Astfel, evaluările efectuate în acest stadiu nu vizează diagnosticul bolii, dar poate aprecia nivelul de risc de a dezvolta ulterior demența și se referă îndeosebi la testarea genetică și markerii β -amiloidici din lichidul cefalorahidian. Evaluarea cognitivă în acest stadiu este recomandabilă doar pentru a diferenția, în plan clinic, statusul cognitiv inițial față de cel următor, când se instalează tulburările cognitive ușoare. De asemenea, se pot colecta date despre istoricul pacientului (cazuri de demență în familie), date genetice, date despre stilul de viață al pacientului, un stil de viață activ și o dispoziție afectivă pozitivă, fiind considerați factori protectivi, în timp ce un stil de viață sedentar, lipsit de activități fizice și intelectuale, precum și o dispoziție depresivă, reprezintă factori de risc pentru apariția demenței. Evaluarea realizată în acest stadiu de evoluție a bolii, are mai mult un scop de prognostic.

Detectarea precoce a bolii este esențială, având în vedere caracterul ireversibil al modificărilor neuropatologice, iar în prezent, principala provocare este descoperirea unor biomarkeri care să fie evidențiați prin metode minim invazive.

Oamenii de știință de la National Institute on Aging și Alzheimer's Association propun o nouă definiție a demenței, bazată pe biomarkeri. Sunt aduse în prim plan modificările biologice care apar în creierul pacienților și nu manifestările clinice ca până acum. Astfel, pacienții asimptomatici vor putea fi înrolați în studii, se pot testa mai eficient noi medicamente și se va investiga evoluția naturală a bolii, putându-se interveni în momentul optim care, cu siguranță, nu este stadiul de demență.


Până acum, pentru stabilirea diagnosticului se foloseau criterii clinice, simptome ce țin de modificările cognitive și de comportament, iar biomarkerii aveau rolul doar de a confirma diagnosticul. Se consideră că demența nu este o boală ci un sindrom care cuprinde semne și simptome ce pot fi determinate de multiple boli, Alzheimer fiind una dintre ele. S-a constatat că între 10 și 30% dintre cei care sunt diagnosticați cu boala Alzheimer nu au modificări neuropatologice asociate la autopsie sau nu prezintă modificări caracteristice la examenul PET sau la examinarea lichidului cefalorahidian. De asemenea, modificările neuropatologice asociate cu boala Alzheimer pot apărea fără a se manifesta prin semne sau simptome. Între 30 și 40% dintre indivizii cu deficit cognitiv au prezentat la autopsie modificări neuropatologice sau biomarkeri modificați. Simptomele cognitive nu reprezintă modul ideal de a defini boala Alzheimer. Abordarea tradițională folosită până acum introduce biomarkerii în procesul de diagnostic după ce apar manifestările clinice, ceea ce se întâmplă târziu în evoluția bolii.

Modificarea biomarkerilor în evoluția Bolii Alzheimer. Studiile au demonstrat că încă din stadiile preclinice (înainte să se manifeste boala) apar modificări cerebrale ireversibile. De asemenea, sunt puțin explorate variantele terapeutice care se adresează stadiilor incipente ale bolii. În prezent se folosește lichidului cefalorahidian (LCR) ca o sursă importantă de biomarkeri precum **amilodul beta ($A\beta$)**, **proteina tau și tau fosforilată**.

AT(N)(C) este schema propusă care grupează biomarkerii în 3 categorii.

A - se referă la **plăcile de amiloid $A\beta$** observate prin imagistică PET sau prin determinare din LCR – $A\beta_{42}$ sau prin raportul $A\beta_{42}/A\beta_{40}$.

T - **corespunde proteinei tau** – determinată fie din LCR, ca proteina tau fosforilată (p-tau) sau prin PET evidențiindu-se neurofibrilele specifice din parenchim, care atunci când se acumulează blochează comunicarea dintre neuroni.




N- se referă la **leziunea neuronală** sau la procesul neurodegenerativ determinat prin RMN, PET sau măsurarea proteinei tau totală din LCR. Leziunea neuronală poate apărea din cauza unei traume, a procesului de îmbătrânire și nu neaparat din cauza bolii în sine.

C – descrie modificări cognitive

Dacă înainte se discuta despre boala Alzheimer în stadiu preclinic, tulburare cognitivă ușoară (MCI) și demență, astăzi se propune o altă noțiune - „**cognitive continuum**”.

Modificările întregitate în boala Alzheimer nu sunt considerate entități separate, ci stadii timpurii sau avansate ale acestei afecțiuni. **Categoria A** determină dacă persoana este în acest continuum, în timp ce biomarkerii din **categoria T** identifică pacienții care au boala Alzheimer. Indicii A și T arată modificări neurologice specifice care definesc boala în timp ce (N) și (C) sunt nespecifice. Parametrii care definesc BA trebuie să fie specifici în timp ce parametrii prin care se evaluează severitatea, nu. Dacă este prezent biomarkerul Aβ, iar proteina tau ar fi normală pacientul ar fi încadrat la categoria de „modificare patologică asociată bolii Alzheimer”. Termenul de „boală Alzheimer” se utilizează doar în cazul prezenței ambilor markeri – Aβ și tau.



O echipă de cercetători de la Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SBP) a identificat un **nou biomarker, peptidul DAG**, care ar putea funcționa atât ca o metodă accesibilă pentru diagnosticarea bolii în stadii precoce, cât și ca o cale de administrare eficientă a unor medicamente în zone ale creierului în care apare un proces neuroinflamator. Ținta peptidului DAG este CTGF, un factor de creștere al țesutului conjunctiv care apare în creierul bolnavilor de Alzheimer înaintea plăcilor de amiloid. Peptidul DAG se leagă de celulele endoteliale care alcătuiesc stratul intern al vaselor cerebrale, ceea ce are implicații foarte importante atât pentru diagnostic, cât și în ceea ce privește administrarea facilă a tratamentului. DAG ajunge în zonele afectate, nu doar în cazul bolii Alzheimer, ci și în cazul altor boli care au o componentă inflamatorie: glioblastom, traumatisme cerebrale, boala Parkinson, accident vascular cerebral; este un peptid ciclic alcătuit din nouă aminoacizi ce se concentrează în hipocamp, se acumulează la nivelul celulelor endoteliale care tapetează vasele cerebrale și la nivelul astrocitelor care intră în alcătuirea unității neurovasculare, substratul de care se leagă DAG fiind factorul de creștere al țesutului conjunctiv (CTGF), o proteină exprimată în cantități mari în creierul afectat de Alzheimer. CTGF este o proteină a matrixului extracelular cu roluri multiple: în adeziunea celulară, angieneză, migrare, proliferare celulară și în procesul de reparație tisulară. Proteina este exprimată în cantități crescute ca răspuns la inflamație, ceea ce confirmă studiile anterioare care au arătat rolul important pe care inflamația îl joacă în patogeneza bolii Alzheimer. DAG prezintă o sensibilitate și specificitate mare, permițând detectarea stadiilor incipiente de boală într-un mod eficient și intervenția terapeutică precoce.

Diagnosticarea bolii Alzheimer numai pe baza simptomelor clinice și a testelor cognitive, este corectă în proporție de 70-80% din cazuri. De aceea, un diagnostic cert al prezenței unei boli degenerative este foarte important, pentru a face distincția dintre tulburările de memorie legate de vârstă și demență în stadiul incipient.

În acest context, au fost dezvoltate o serie de teste imunologice, cu ajutorul unor biomarkeri prelevați din lichidul cefalorahidian (LCR), ce permit un diagnostic clar, rapid și complet al bolii Alzheimer:

- testul Elecsys β -Amyloid (1-42) LCR
- testul Elecsys Phospho-Tau (181P) LCR
- testul Elecsys Total-Tau LCR

Diagnosticarea precoce a demenței permite persoanelor afectate și familiilor acestora să conștientizeze situația într-un stadiu incipient, astfel încât să poată lua măsuri pentru a asigura îmbunătățirea calității vieții. În plus, un instrument de diagnostic care identifică mai bine pacienții cu boala Alzheimer, poate ajuta medicii să evalueze mai bine opțiunile terapeutice.

8.4 STADIUL DISFUNȚIEI COGNITIVE UȘOARE

8.4.1 Simptomele demenței

Pe parcursul acestui stadiu apar primele semne clinice, manifestate prin deteriorarea ușoară spre moderată a uneia sau mai multor arii cognitive, dar fără a afecta funcționalitatea persoanei în activitatea de zi cu zi. Simptomele demenței sunt legate de pierderea de memorie frecventă și progresivă, pierderea capacității de concentrare, de a acorda atenție anumitor lucruri cotidiene și diminuarea percepției vizuale.

Semne timpurii de demență & Semnale de alarmă pentru instalarea demenței

Demența este foarte greu de depistat, iar semnele apărute în faza incipientă a bolii sunt subtile și vagi, iar de multe ori pot fi ignorate. Una sau mai multe dintre manifestările de mai jos pot să sugereze apariția unor modificări specifice tulburărilor cognitive:

- Starea de confuzie;
- Pierderea abilității de a efectua sarcini de zi cu zi, dificultăți în îndeplinirea unor activități cotidiene;
- Schimbări de comportament și de personalitate;
- Apatie și retragere în zone izolate;
- Pierdere frecventă și progresivă de memorie;
- Probleme de limbaj și comunicare, dificultăți în găsirea cuvintelor;
- Dezorientare în timp și spațiu;
- Afectarea judecății și a raționamentului;
- Rătăcirea lucrurilor;
- Pierderea motivației și a inițiativei, restrângerea sferei de interese;
- Schimbări de dispoziție;
- Complanță redusă la medicație și recomandări.

Deficitul Cognitiv Incipient/Minor

Persoanele diagnosticate cu MCI (mild cognitive impairment) se confruntă deja cu simptome de tipul pierderii de memorie, însă acestea sunt foarte greu de diferențiat

de îmbătrânirea normală. Persoana în cauză va experimenta probleme zilnice, care diferă în severitate. De regulă, persoanele cu MCI ajung la demență, în general, Alzheimer. Aproximativ 40% din persoanele care se confruntă cu MCI ajung să sufere de demență în decurs de trei ani, iar circa 80% din aceste persoane se confruntă cu afecțiunea în decurs de 6 ani. Cu toate că o persoană care suferă de MCI nu poate apela la un tratament prin care să se vindece, există șansa de a încetini sau chiar de a stopa evoluția bolii. În mod normal, o persoană din 8 care prezintă tulburări de memorie va progresa spre demență, însă nu se poate spune care dintre aceste persoane va fi afectată.

8.4.2 Evaluarea medicală a unui pacient cu sindrom demential

Anamneza și istoricul bolii:

Nivelul premorbid de funcționare cognitivă, factori de risc, antecedente personale patologice, modalitatea debutului

Discuția cu pacientul, cu familia

Cele mai comune întrebări puse de doctor vor fi:

- Care sunt simptomele?
- În ce perioadă au debutat acestea?
- Cum se manifestă simptomele pe care le aveți?
- Aveți simptome care apar și dispar sau sunt persistente?
- Ați renunțat la anumite activități pe care le făceați din cauza simptomelor?
- Cât de severe sunt aceste simptome?
- Urmați un tratament medicamentos? Dacă da, ce fel de tratament?
- Aveți și alte afecțiuni?
- Există cazuri de boli precum Parkinson, Huntington în familia dvs.?
- Ați trecut printr-un moment de importanță majoră în ultimul timp?
- Ați avut o perioadă mai stresantă în ultima vreme?

Examinare clinică generală:

- Se pot pune în evidență semne care să orienteze către diagnosticul unei condiții medicale generale care se însoțește de demență: hipotiroidism, anemie severă, neoplasm, SIDA, sifilis etc.

Examinarea psihiatrică (a stării de sănătate mintală și examinarea cognitivă clinică):

- Trebuie excluse alte afecțiuni (delirium, depresie, stări post-psihotice, dependența de substanțe, pseudo-deteriorarea cognitivă medicamentasă: anticolinergice, benzodiazepine, betablocante, diuretice etc.) ce pot influența cogniția
- Se examinează toate funcțiile psihice, cu accent pe orientare, atenție, memorie, limbaj, praxie, funcții de execuție

Examinarea neurologică:

- Se pot evidenția semne neurologice specifice care să orienteze către diagnosticul unei boli neurologice primare care se însoțește de demență (boala Parkinson, boala Wilson, boala Creutzfeldt-Jakob etc)
- Se poate deosebi demența de tip Alzheimer de o demență vasculară sau se evaluează componenta cerebrovasculară din cadrul procesului neurodegenerativ

8.4.3 Examinarea neuropsihologică:

Evaluarea psihologică în stadiul disfuncției cognitive ușoare poate avea scopuri multiple, toate fiind în direcția unei mai bune conceptualizări a cazului, necesare elaborării planului de intervenție. Evaluarea poate viza:

- un scop de screening pentru a identifica cazurile cu risc de tulburare cognitivă ușoară. Instrumentele standardizate de evaluare a nivelului de deteriorare cognitivă sunt considerate cele mai adecvate instrumente de screening, întrucât îndeplinesc trei condiții esențiale: implică costuri reduse, au durată scurtă de aplicare și sunt ușor de analizat și interpretat; de asemenea, ele pot detecta modificări minore indicative pentru existența unei deteriorări cognitive ușoare. Este recomandabil ca instrumentele de screening să vizeze mai multe arii cognitive. Din perspectiva capacității de a discrimina între o funcționare cognitivă normală și disfuncția cognitivă ușoară, cele mai utile teste sunt Qmci (Quick Mild Cognitive Impairment Screen) și MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Din punct de vedere al eficienței instrumentelor de a discrimina între pacienții cu disfuncție cognitivă ușoară și cei cu demență, cele mai recomandabile teste sunt GPCOG (General Practitioner Assessment of Cognition), Mini-Cog sau MIS.
- un scop de diagnostic, respectiv de diagnostic diferențial. În această situație se utilizează teste cognitive cu o durată mai lungă, care surprind un număr mai mare de domenii cognitive: ADAS-Cog Alzheimer's Disease Assessment Scale și Mo-CA, Montreal Cognitive Assessment.
- un scop de monitorizare a eficienței tratamentului (evoluției disfuncției). Pentru evaluarea eficienței unei intervenții terapeutice, se recomandă verificarea periodică (la fiecare șase luni) a evoluției performanței cognitive, preferabil utilizând proba ADAS-Cog.
- un scop de prognostic (estimare a evoluției bolii în funcție de factorii protectivi sau de risc). S-a constatat că nu toate persoanele care prezintă biomarkeri specifici demenței, vor dezvolta o tulburare cognitivă ușoară, precum și faptul că nu toți indivizii diagnosticați cu tulburare cognitivă ușoară, vor dezvolta ulterior o demență. De aceea, este utilă și o analiză a factorilor de risc și a celor de protecție. Astfel, se consideră că există o probabilitate mai mare ca un individ să ajungă în stadiul de demență, dacă prezintă deteriorări în mai multe arii

cognitive decât într-una singură. O altă categorie de factori de risc vizează existența unor comorbidități (anxietatea, depresia, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, obezitatea) asociate disfuncției cognitive ușoare. De asemenea, este notabilă și predispoziția genetică relevantă pentru demență (prezența unor mutații genetice – APP, PS1, PS2). Deloc de neglijat este stilul de viață și de sănătate care poate influența prognosticul evoluției disfuncției cognitive ușoare (sedentarismul, fumatul, alcoolul, alimentația, izolarea, lipsa relaționării sociale și a activităților intelectuale etc).

Pentru testarea cognitivă (examinarea atenției și a concentrării, orientarea temporo-spațială, memoria de scurtă și lungă durată, limbajul sau funcțiile de execuție) sunt utilizate instrumente standardizate. Cu toate că nu există o baterie standard de teste neuropsihologice pentru evaluarea funcției cognitive, cele mai folosite în ambulatoriu rămân MMSE (Mini Mental State Examination), 6-CIT (6-item Cognitive Impairment Test), GPCOG (General Practitioner Assessment of Cognition), 7-minute Screen sau Montreal Cognitive Assessment (MoCA), testul desenării ceasului. Este necesar ca interpretarea scorurilor acestor teste să ia în considerare factori ce pot influența rezultatul, de exemplu nivelul de educație al pacientului, scorul inițial al unei evaluări precedente, afectarea senzorială, diverse tulburări psihiatrice psihice sau neurologice. MoCA și mai ales GPCOG sunt chestionare deosebit de eficiente și utile pentru depistarea deteriorării cognitive minore, ușor de administrat, în aproximativ 5-10 minute, de către personalul medical sau non-medical, sunt validate pentru mediul de ambulatoriu, nu sunt influențate de erori legate de nivelul de educație, nu sunt influențate de diversitatea lingvistică sau de alte diferențe culturale și nu necesită plata drepturilor de autor.

Etapizarea diagnostică

I. Stabilirea diagnosticului de disfuncție neurocognitivă

- observarea unui declin cognitiv față de performanța anterioară în una sau mai multe arii cognitive
- deficitul cognitiv nu apare în urma unui delir
- deficitul cognitiv nu poate fi explicat printr-o altă tulburare mentală (tulburare depresivă, schizofrenie, consumul de substanțe etc)

II. Stabilirea tipului etiopatogenic al disfuncției neurocognitive (cauzată de boala Alzheimer, de boala Parkinson, Boala Wilson, coreea Huntington, boala Creutzfeldt-Jak, o boală cerebrovasculară etc)

III. Stabilirea gradului de severitate a disfuncției neurocognitive (ușoară – dificultăți în activități, cum ar fi cumpărăturile, moderată – dificultăți în activități de bază precum îmbrăcatul, alimentația, severă – cu dependență totală de anturaj)

IV. Stabilirea asocierii unor tulburări comportamentale (tulburări de dispoziție, agitația psihomotorie, apatia etc)

Pentru tulburarea neurocognitivă de tip Alzheimer este elocventă prezența următoarelor argumente:

- genetice – existența unor dovezi genetice/a unui istoric familial relevant
- fiziopatologice – evidențierea acumulărilor β -amiloidice, a degenerărilor neuronale
- cognitive – afectarea mai multor arii cognitive
- comportamentale – deficiența cognitivă este frecvent însoțită de tulburări psihopatologice, mai ales de dispoziție
- funcționale – afectarea funcționalității individului în activitatea sa de zi cu zi
- evolutive – declinul cognitiv este lent, dar progresiv
- de excludere – au fost excluse alte condiții medicale care ar putea explica apariția declinului cognitiv

După stabilirea diagnosticului și inițierea intervenției terapeutice, sunt necesare evaluări periodice ale:

- nivelului de funcționalitate
- nivelului de deteriorare cognitivă
- modificărilor comportamentale și de dispoziție afectivă
- condițiilor medicale comorbide
- eficienței medicației administrate

8.4.4 Analize de laborator:

Pentru a nu exista confuzii între demență și o altă afecțiune care prezintă o simptomatologie asemănătoare, este necesar să se efectueze anumite analize de laborator, pentru a stabili cu exactitate care este cauza simptomelor. Parametrii hematologici și biochimici recomandați sunt:

► Analize uzuale: hemoleucograma, glicemie, transaminaze, markerii funcției renale (uree, creatinină), VSH, sumar de urină, testarea funcției tiroidiene (TSH, FT4), electroliți (ionogramă serică), colesterol, trigliceride, determinarea nivelurilor serice ale vitaminei B12, acidului folic, homocisteinei

► În unele cazuri pot fi necesare analize specifice:

- teste serologice pentru boli infecțioase: SIDA, sifilis, borelioza, encefalita herpetică;
- teste imunologice pentru diagnosticul vasculitelor sistemice;
- probe toxicologice (droguri, intoxicație cu metale grele);
- teste genetice (boala Alzheimer precoce familială, demența fronto-temporală, CADASIL);

► Evidențierea markerilor biologici pentru depunerea de β -amiloid (A β 42, proteina tau în LCR).

8.4.5 Investigații neuroimagistice:

În domeniul cercetării fundamentale, evidențierea markerilor biologici pentru depunerea de β -amiloid (imagistica PET pentru amiloid) sau a markerilor pentru leziuni

neuronale (tau fosforilat, atrofie în aria de asociație temporală sau hipocampică) folosind tehnici imagistice FDG - PET (Fluorodeoxyglucose-Positron Emission Tomography), volumetric MRI sau SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography), precum și detectarea disfuncției sinaptice (FDG – PET, fMRI), contribuie la diagnosticul diferențial între aceste trei forme (funcția cognitivă normală, MCI și demență în etapa de debut), aflate într-un continuum clinic. În absența markerilor biologici evaluabili în mediul clinic, evaluarea neuropsihologică rămâne standardul de aur pentru depistarea deteriorării funcției cognitive.

De asemenea, CT cerebral/RMN cerebral nativ/cu substanță de contrast) pot identifica și alte cauze ale tabloului clinic neuropsihiatric, precum accidentul vascular cerebral, tumori cerebrale, leziuni traumatice, diverse procese inflamatorii sau infecțioase.

Examenul electroencefalografic (EEG) – poate fi necesar uneori pentru diagnosticul etiologic al demenței (în suspiciunea de boală Creutzfeldt-Jakob sau de encefalită herpetică)

8.5 AVANTAJELE DIAGNOSTICĂRII PRECOCE A DEMENTEI

Diagnosticul precoce al demenței ajută atât pacientul cât și membrii familiei prin obținerea de informații despre boală, inițierea unui tratament adecvat chiar din stadiul incipient, permite intervenția asupra factorilor de risc modificabili, stabilirea de așteptări realiste și planificarea viitorului.

Stabilirea unui diagnostic precis este extrem de importantă deoarece unele afecțiuni cum ar fi depresia, boli tiroidiene, infecții sau efecte secundare medicamentoase pot produce uneori simptome similare cu cele ale demenței. Un diagnostic precis poate fi de asemenea benefic deoarece unele cauze de demență sunt tratabile și total sau parțial reversibile, în funcție de natura problemei. O evaluare medicală complexă asigură acuratețea diagnostică și stabilirea unui tratament adecvat.

Un diagnostic precoce presupune menținerea independenței pacientului pentru o perioadă mai lungă de timp, implicarea activă a pacientului în deciziile cu privire la tratament, la îngrijirea stării de sănătate și la planificarea viitorului. Permite pacientului să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la aspectele juridice, financiare și de îngrijire și de a-și face cunoscute dorințele familiei și prietenilor. Având un diagnostic corect și precoce pacienții și familiile lor pot beneficia de consiliere și sprijin. Familiile care înțeleg boala și provocările care vin cu progresia acesteia sunt mai în măsură să sprijine persoana cu demență și să primească ajutorul potrivit. Diagnosticul precoce este extrem de important și pentru cercetare. Persoanele cu demență pot participa la studii clinice și alte cercetări în scopul îmbunătățirii diagnosticului, tratamentului, serviciilor de îngrijire și a prognosticului acestei afecțiuni.

9. ALCOOLUL ȘI CREIERUL. CONSUMUL EXCESIV DE ALCOOL – FACTOR DE RISC ÎN DEMENTĂ



Alcoolul este cel mai accesibil și utilizat drog datorită stărilor euforice pe care le provoacă, deși are nenumărate efecte nocive asupra sănătății. Deși este legal, alcoolul, mai ales consumat într-un mod frecvent și excesiv, poate să producă schimbări chimice la nivelul creierului, ca orice narcotic. Consumul regulat al unei cantități semnificative de alcool reprezintă un factor important de risc pentru dezvoltarea demenței de toate tipurile, dar în special a celei precoc. Alcoolul este o substanță legală, cu o largă disponibilitate, acceptată de majoritatea societăților, cu potențial de abuzare și de toxicitate acută și cronică. El are un efect deprimant pe sistemul nervos central, producând scăderea activității neuronale. De asemenea, are un efect anxiolitic, antidepresiv, relaxant și sedativ, fiind folosit de multe persoane care se confruntă cu anxietatea, depresia și insomnia. La nivelul creierului acționează pe centrul plăcerii mediat de dopamină. Cantitatea de la care crește riscul apariției problemelor legate de consumul de alcool este de:

- la bărbați 14 băuturi/săptămână sau 4 băuturi/zi
- la femei 7 băuturi/ săptămână sau 3 băuturi/zi

O băutură standard (sau un “drink”) este definită ca 12 g de alcool pur și este echivalentă cu 330 ml bere sau 150 ml vin sau 30 ml băuturi spirtoase (vodka, whisky).

Studiile au arătat că din cele peste 57.000 de cazuri de demență precoc observate în Franța între anii 2008 și 2013, mai mult de jumătate (57%) au fost atribuite în mod direct leziunilor cerebrale asociate alcoolului (18% fiind asociate unui consum excesiv), potrivit studiului publicat în jurnalul *Lancet Public Health*. În plus, consumul excesiv de alcool a fost asociat cu un risc de trei ori mai mare de demență de toate tipurile. Legătura dintre demență și alcool necesită studii suplimentare, însă rezultă probabil din faptul că alcoolul provoacă leziuni cerebrale permanente.

De asemenea, s-a mai constatat că un consum de alcool în cantități semnificative este asociat frecvent cu:

- **hipertensiunea arterială;**

- **diabetul zaharat;**
- **afecțiuni cardiace,**

Factori care „perse” sunt considerați de risc major pentru accidentele vasculare cerebrale și pentru demență vasculară.

9.1 CUM ESTE PROCESAT ALCOOLUL DE CĂTRE CORP

Corpul măsoară alcoolul în funcție de cantitatea de alcool consumată. Pentru că ficatul nu poate să metabolizeze o cantitate prea mare de alcool, surplusul va fi trimis în sânge și organismul va experimenta starea de ebrietate. Atunci când sesizează prezența alcoolului în sânge, creierul eliberează dopamină, un neurotransmițător asociat cu senzația de plăcere. Creierul învață să asocieze alcoolul cu plăcerea și, în timp, după ce se instalează toleranța la alcool, are nevoie de cantități tot mai mari pentru a identifica plăcerea. Dacă aceasta practică nu este ținută sub control se instalează dependența care duce la abuz. Odată ajuns în creier, alcoolul acționează în mod direct asupra celulelor nervoase și intervine în procesele sinaptice, încetinind orice activitate din corp, având efect și asupra emoțiilor, judecății, echilibrului, memoriei, vorbirii sau nivelului de furie.

9.2 IMPACTUL ALCOOLULUI ASUPRA CREIERULUI

La nivel cerebral, alcoolul acționează asupra neuronilor din zona ventrală tegmentală (VTA), cunoscută și sub denumirea de „centrul plăcerii”, stimulând eliberarea de dopamină neurotransmițătorul stării de bine prin blocarea unui canal de potasiu numit KCNK13, care este amplasat în membrana neuronilor ce eliberează dopamina în VTA; când canalul este blocat, neuronii își cresc activitatea și eliberează mai multă dopamină. Canalul KCNK13 este absolut necesar pentru ca alcoolul să stimuleze eliberarea de dopamină din acei neuroni, fără acest canal alcoolul nu poate stimula eliberarea de dopamină, consumul de alcool fiind mai puțin satisfăcător. Cercetătorii consideră că acest canal KCNK13 poate reprezenta o țintă nouă extrem de incitantă pentru medicamentele care i-ar putea ajuta pe cei ce sunt dependenți de alcool. În afară de stimularea activității neuronilor dopaminergici, alcoolul potențează și transmisia sinaptică mediată de GABA și Glicină; inhibă receptorii glutamatergici și receptorii NMDA, modulează funcția receptorilor nicotinici de acetilcolină.

9.2.1 Structuri cerebrale afectate de alcool:

- cortexul cerebral, determinând alterarea funcției cognitive și tulburări de comportament.
- lobul frontal, care joacă un rol important în procesele de planificare, formare de idei, luarea deciziilor sau activarea autocontrolului.



- ▶ cerebelul, responsabil cu coordonarea, provocând tulburări de echilibru și de coordonare.
- ▶ hipocampusul, afectând memoria de scurtă durată sau abilitatea de a învăța.
- ▶ hipotalamusul, determinând perturbări ale tensiunii arteriale și pulsului, ale senzației de foame și sete și temperaturii corporale.
- ▶ bulbul rahidian, determinând afectarea centrilor vitali cardiorespiratori.

Consumul excesiv de alcool determină un răspuns neuroinflamator în hipocampus și cortexul Frontal, pierdere neuronală și deficite funcționale, reducerea neurogenezei hipocampice, pierderea fenotipului neuronal colinergic și modificări ale cortexului frontal.

9.2.2. Efectele alcoolului asupra creierului

- alcoolul are efect deprimant pe sistemul nervos central, ingestia sa determinând somnolență, efect dependent de cantitatea consumată; în timp, alcoolul modifică arhitectura somnului, scăzând perioadele de somn profund și crescând numărul de treziri pe timpul nopții;
- sub influența alcoolului, emoțiile pot deveni exagerate: consumatorul este excesiv de vesel, expansiv sau din contră, plânge ușor;
- pe termen scurt, alcoolul are efect anxiolitic, dar perioada de relaxare și de confort psihic este scurtă;
- influențează centrul plăcerii (mediați de dopamină) și sistemul de recompensă din creier, ceea ce explică în parte instalarea dependenței de alcool;
- acționează asupra producerii de substanțe opioide, ceea ce explică efectul analgezic;
- afectează hipocampusul, cu impact direct asupra memoriei (consumatorul nu își mai amintește ce a făcut în timpul consumului și imediat după aceea);
- creșterea alcoolemiei peste 0,05% determină tulburări ale activității nervoase în lobul frontal și astfel, dificultăți în controlul impulsurilor și luarea deciziilor, diminuarea proceselor de gândire și judecată, reducerea cenzurii;
- efectul alcoolului pe amigdala cerebrală determină consumatorii să nu realizeze că anumite acțiuni ale lor pot avea efecte periculoase și astfel pot avea loc scandaluri, violență, accidente;
- acțiunea alcoolului la nivelul cerebelului duce la pierderi de echilibru, de coordonare a mișcărilor și instabilitate a mersului;
- când alcoolemia depășește 0,04% se poate inhiba funcționarea centrilor reflecși din trunchiul cerebral care controlează respirația, circulația, tusea, strănutul, deglutiția, aceștia devenind incapabili să mai regleze funcțiile vitale ale organismului, în cazuri extreme putând surveni decesul;

- poate provoca apariția sindromului Wernicke - Korsakoff prin afectarea metabolismului vitaminei B1, deficiență care poate duce la tulburări mnemonice și psihice.

9.3 COMPLICAȚIILE NEUROLOGICE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL

Demența alcoolică. Este cauzată, pe lângă efectul toxic direct al alcoolului, de multiple deficiențe nutriționale și vitaminice induse de alcoolismul cronic, precum și de repetate traumatisme cranio-cerebrale. Apare la alcoolicii cronici (foști heavy-drinkers), după mulți ani de degradare și marginalizare socială.

Accident vascular cerebral. Sunt frecvente accidentele vasculare cerebrale la alcoolici care pot fi de natură hemoragică, embolică și trombotică și se datorează prezenței hipertensiunii, dislipidemiei, bolii aterosclerotice și/sau coagulopatiilor. Prezența unei coagulopatii poate să fie, de asemenea, responsabilă pentru incidența crescută a hematoamelor subdurale la cei ce suferă un traumatism cranio-cerebral.

Crizele epileptice simptomatice (rum fits). Crizele comițiale legate de alcool sunt de obicei generalizate, fără aură, la scurt timp (6 - 8 ore) după întreruperea consumului de alcool și pot anunța instalarea sevrajului. Utilizarea cronică de alcool și întreruperile repetate ale acestuia duc la scăderea pragului de apariție a crizelor comițiale. Riscul crizelor comițiale este proporțional cu cantitatea de alcool administrată.

Tulburări cerebeloase Intoxicația alcoolică duce la tulburări de coordonare, modifică abilitățile motorii și determină tulburări de echilibru.

Neuropatia periferică alcoolică. Este determinată atât de acțiunea directă asupra fibrei nervoase, cât și de acțiunea indirectă prin nutriție deficitară. În cazuri severe pot fi afectați nervii care reglează funcțiile interne ale corpului. Simptomatologia poate include: parestezii, dureri la nivelul membrelor, slăbiciune musculară, crampe musculare, intoleranță la caldură, impotență, incontinență urinară, dificultăți de micțiune, constipație, diaree, greață, vărsături etc.

Ambliopia alcoolică. Această afecțiune poate apărea la persoanele cu uz cronic de alcool. Simptomatologia include tulburări de vedere, inclusiv scotoame și scăderea acuității vizuale începând cu porțiunea centrală a campului vizual. Tulburarea este cauzată de efectul toxic al alcoolului la nivelul nervului optic, ducând la neuropatia optică. Deoarece alcoolul generează depleția întregului corp de nutrienți, ambliopia alcoolică este legată de deficitul de tiamină, ceea ce duce la lezarea nervului optic. Ambliopia alcoolică este reversibilă dacă se tratează cu dietă adecvată și multivitamine, în special, tiamină (vitamina B1). Netratată, duce la leziuni ireversibile ale nervului optic și la pierderea vederii.

Efecte asupra somnului. Alcoolul este un excitant ce duce la insomnie de adormire și de menținere, precum și la oboseală, în primul rând, la nivel psihic, în timpul zilei; scade perioada REM (Rapid Eye Movement) a somnului, determinând în final deprivarea de somn. Apariția apneei obstructive în timpul somnului poate fi cauzată sau agravată de

alcool din cauza efectului inhibitor al alcoolului asupra respirației și a relaxării tractului respirator superior.

9.4 ALTE COMPLICAȚII SOMATICE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL

Efectele alcoolului asupra ficatului. Toxicitatea alcoolului asupra ficatului se datorează utilizării preferențiale a alcoolului de către celulele hepatice ca și "combustibil preferat". Chiar și o cantitate mică de alcool perturbă gluconeogeneza și duce la șuntarea metabolizării unor cantități de carbohidrați în grăsimi. Deteriorarea hepatică începe cu transformarea steatozică a ficatului urmată de hepatita alcoolică, fibroza perivenulară și, în ultima fază, de către ciroza hepatică.

Efectele alcoolului asupra stomacului. Alcoolul favorizează colonizarea stomacului cu bacilul *Helicobacter Pylori*, ducând la gastrită și ulcer.

Efectele alcoolului asupra pancreasului. Alcoolul poate cauza scăderea enzimelor pancreatice, determinând apariția pancreatitei cronice și acute. Prin episoade recurente de pancreatită ce se manifestă prin insuficiență exocrină și endocrină, se poate ajunge la diabet zaharat, absorbția deficitară și deficiența de vitamine liposolubile (A, D, D2, E, K, F).

Complicațiile cardio-vasculare. 25 % dintre pacienții cu uz cronic de alcool prezintă o formă de boala cardio-vasculară. Patogeneza este, în primul rând, pusă pe seama toxicității alcoolului asupra fibrei musculare striate ce duce la inflamația musculaturii cardiace, cardiomiopatie, aritmii și anomalii ale ventriculului stâng, sindrom toxic cardiac, hipertensiune arterială, hiperlipidemie (care este rezultatul lipogenezei accentuate prin oxidarea alcoolului).

Complicațiile metabolice. anomalii ale reglării metabolismului carbohidraților prin disfuncție hepatică și pancreatică.

- scăderea sintezei de proteine cerebrale, determinând atrofie cerebrală

Complicațiile hematologice: anemii (prin deficit de Fier, B12, hemoragii digestive), leucopenii, trombocitopenii, coagulopatii

Neoplasmul Persoanele cu uz cronic de alcool au un risc crescut de cancer al tractului aero-digestiv (buze, cavitate orală, limbă, faringe, laringe, esofag, stomac și colon), cancer de sân, ficat, ducte biliare și plămân, alcoolul având rolul unui co-carcinogen, adică potențează efectul carcinogenic al altor factori precum tutunul.

Complicațiile nutriționale Alcoolul este o sursă importantă de calorii lipsite de valoare nutrițională, fiind una din cauzele majore de deficit nutrițional. Factorii ce contribuie la deficitul nutrițional sunt toxicitatea directă asupra țesuturilor, perturbarea absorbției nutrienților și a metabolismului lor. Lipsa tiaminei (vitamina B1) duce la sindromul Wernike - Korsakoff, boala beriberi și polineuropatie. Deficiența vitaminei B6 produce disfuncții neurologice, hematologice și dermatologice. Diminuarea cantității de acid folic și vitamina B12 se manifestă prin anemie megaloblastică și deficitele neurologice

asociate acesteia. Scăderea zincului este asociată cu piele uscată și aspră, letargie mentală, afectarea simțului gustativ și apetit scăzut. Nivelele de vitamine A, B2, C, D, E, K, Mg, Ca, folat, fosfat și Fe sunt scăzute la consumatorii cronici de alcool.

9.5 TULBURĂRI PSIHIATRICE ALE CONSUMULUI DE ALCOOL

- intoxicație acută;
- abuzul și dependența de alcool;
- sevraj etanolic +/- delirium tremens;
- depresia și anxietatea induse de alcool;
- halucinoza alcoolică;
- encefalopatie Wernicke;
- psihoza Korsakoff;
- tulburări cognitive ușoare până la severe (demența alcoolică);
- tulburări de personalitate.

Tulburările de personalitate (antisocială, evitantă, borderline) sunt frecvent asociate cu consumul abuziv de etanol. Consumul îndelungat poate duce la o tulburare de personalitate organică.

Anxietatea și depresia sunt prezente la 90% din consumatorii cronici, atât în timpul consumului cât și în perioada de servraj precoce/tardiv.

Suicidul este mult mai frecvent la persoanele dependente de alcool, prin implicarea serotoninei care mediază comportamentul agresiv-impulsiv al alcoolicilor. Unul din trei cazuri de suicid are la bază consumul de alcool.

Halucinoza se referă la păreri/impresii, a căror autenticitate încearcă să o testeze individul; este preocupat de o posibilă infidelitate a partenerului, având frecvent și ideatie delirantă de gelozie, are idei de persecuție, de prejudiciu.

Demența alcoolică

Reprezintă degenerarea creierului din cauza alcoolului, degradarea progresivă a funcțiilor cerebrale, într-o primă fază fiind perturbată memoria de scurtă durată, ulterior, evoluția fiind spre agravare, afectând serios calitatea vieții pacientului.

Simptome demența alcoolică:

- Incapacitatea de a lua decizii;
- Irascibilitate;
- Incapacitatea de a recunoaște oameni, locuri și lucruri;
- Stare de agitație psihomotorie;
- Confuzie mentală;
- Tulburări de memorie;
- Tulburări amnestice persistente induse de alcool;
- False amintiri

Demențele alcoolice se diferențiază de alte demențe prin afectarea precoce a simțului etic și moral, prin dezinhibiție sexuală, acte imorale, delikte și acte medico-legale.

Sindromul Wernicke-Korsakoff. Cea mai des întâlnită formă de demență alcoolică este sindromul Wernicke-Korsakoff, o combinație alcătuită din encefalopatia Wernicke și psihoza Korsakoff. Aceasta este cauzată de deficitul de tiamină (vitamina B1), care apare în urma consumului cronic de alcool. Encefalopatia Wernicke este afecțiunea de scurtă durată care apare în prima etapă a acestui sindrom și care reprezintă un pericol serios pentru viața pacientului. Encefalopatia Wernicke este urmată de a doua fază a bolii – psihoza Korsakoff, cauzată de fapt de daunele produse de encefalopati.

Psihoza Korsakov (Encefalopatia carențială alcoolică) Este o tulburare cronică ce apare la persoanele dependente de alcool, din cauza deficitului de tiamină (vit B1), vitamină implicată în metabolizarea alcoolului. Pacientul este dezorientat temporo-spatial și asupra propriei persoane, nu este capabil să fixeze evenimente recente, relatează evenimente care nu s-au întâmplat datorită tulburărilor de memorie și a dificultăților de procesare a evenimentelor recente (confabulații), are polineuropatie.

Evoluție:

- spre vindecare, în condițiile abstenenței alcoolice și a tratamentului cu vit B1 (100mg de 2-3 ori pe zi, timp de 3-12 luni)
- către encefalopatia Wernicke
- către demența alcoolică
- mai rar spre exitus.

Encefalopatia Wernicke. Este o tulburare neurologică acută datorată deficitului de Tiamina (vit B1); ea poate progresa constituindu-se în sindrom Korsakov (tulburare cronică) sau poate duce la deces. Triada clasică constă în tulburări de echilibru și mers, tulburări ale mișcării globilor oculari (nistagmus, oftalmopareze) și alterare a statusului mental. Simptome psihice: tulburări severe de atenție, concentrare și memorie, confabulații, perioade de apatie, somnolență până la torpoare, care poate alterna cu agitație psihomotorie și insomnii, delir, halucinații, confuzie.

Demența alcoolică este declanșată de consumul cronic și abuziv de alcool combinat cu nutriția deficitară Tiamina, care face parte din complexul de vitamine B, lipsește adesea din organismul alcoolicilor, afectând funcțiile cerebrale. Aceasta se regăsește în alimente ca: cereale integrale, banane, linte și cartofi.

Tratamentul în demența alcoolică: pentru tratarea eficientă a demenței alcoolice, este important ca aceasta să fie diagnosticată cât mai precoce, crescând șansele ca daunele produse să fie încă reversibile, nu permanente. În primul rând, pacientul trebuie să renunțe la consumul de alcool, dar și să adopte o dietă sănătoasă și echilibrată nutrițional. Pentru tratarea alcoolismului, se poate folosi un tratament medicamentos care să susțină eforturile pacientului și să îl ajute să scape de dependența de alcool; de asemenea, se recomandă vitamina B1(Tiamina) care poate stopa evoluția demenței, precum și Memantina, medicament care, de regulă, se utilizează în tratamentul

demenței Alzheimer, dar care și-a dovedit eficiența și în cazul demenței alcoolice, ajutând la recuperarea parțială a funcțiilor cerebrale și mai ales a memoriei. În cazurile în care demența alcoolică este depistată în faza incipientă și tratată, iar pacientul renunță la alcool, există șanse mari ca funcțiile creierului să fie recuperate complet. Pe de altă parte, în cazurile mai serioase, funcțiile creierului sunt pierdute definitiv, iar pacientul și familia acestuia trebuie să accepte și să se adapteze la noua situație.

10. PREVENȚIA ÎN DEMENTĂ

Prevenirea degradării funcțiilor cognitive este o preocupare constantă a cercetătorilor. Implicarea în activități cognitive, fizice, sociale, reduce viteza declinului creierului nostru pe măsură ce îmbătrânim. La nivel mondial, există aproximativ 50 de milioane de persoane cu demență, iar acest număr se estimează că va crește la 152 de milioane până în 2050, crescând în special în țările cu venituri mici și cu venituri medii, unde trăiesc aproximativ două treimi din persoanele cu demență. Demența afectează indivizii, familiile lor și economia, cu costuri globale estimate la aproximativ 1 trilion de dolari anual. Numărul persoanelor în vârstă, inclusiv al celor diagnosticați cu demență, este în creștere, odată cu scăderea mortalității, inclusiv a mortalității infantile. Cu toate acestea, incidența specifică vârstei a demenței a scăzut în multe țări, probabil din cauza îmbunătățirilor în educație, nutriție, îngrijire a sănătății și a unor modificări ale stilului de viață. În general, un număr tot mai mare de dovezi susține factorii de risc potențial modificabili pentru demență, elaborați de Comisia Lancet din 2017, privind prevenirea, intervenția și îngrijirea demenței: educație deficitară, hipertensiune, tulburări de auz, fumat, obezitate, depresie, inactivitate fizică, diabet și contact social scăzut.

Actual, datorită unor argumente științifice, au mai fost adăugați alți trei factori de risc pentru demență: consumul excesiv de alcool, leziuni traumatiche ale creierului și poluarea aerului. A fost elaborat un model actualizat de prevenire a demenței cu 12 factori de risc. Împreună, cei 12 factori de risc modificabili reprezintă aproximativ 40% din demențele la nivel mondial, care, prin urmare, teoretic ar putea fi prevenite sau întârziate. Potențialul de prevenire este ridicat și ar putea fi mai mare în țările cu venituri mici și medii, unde apar mai multe demențe. Se consideră că nu este niciodată prea devreme și niciodată prea târziu în cursul vieții, pentru prevenirea demenței. Riscurile timpurii (sub vârsta de 45 de ani), cum ar fi o educație mai redusă, afectează rezerva cognitivă; factorii de risc ai vârstei mijlocii (45-65 de ani) și ai vieții ulterioare (mai mari de 65 de ani) influențează rezerva cognitivă și declanșarea dezvoltărilor neuropatologice.

Cultura, sărăcia și inegalitatea sunt factorii cheie ai necesității schimbării. Persoanele care sunt cele mai private au nevoie de aceste schimbări cel mai mult și vor obține cel mai mare beneficiu. Sunt necesare inițiative naționale care să acorde prioritate educației tuturor copiilor, programe de sănătate publică care să promoveze reducerea consumului de alcool, renunțarea la fumat, alimentația corectă, controlul periodic al tensiunii arteriale sistolice (în timpul vieții medii ar trebui să vizeze 130mm Hg sau mai puțin pentru a întârzia sau preveni demența) și al valorilor glicemice (mai ales le cei cu predispoziție ereditară), precum și menținerea activității fizice, sociale și cognitive la maturitate și bătrânețe. Exercițiile fizice susținute în timpul vieții mijlocii și, eventual, în

viața ulterioară, protejează de demență, probabil prin scăderea obezității, diabetului și a riscului cardiovascular. De asemenea, factorii de cizie politică ar trebui să accelereze măsurile pentru îmbunătățirea calității aerului, în special în zonele cu poluare ridicată a aerului. Utilizarea aparatelor auditive pare să reducă riscul excesiv din cauza pierderii auzului.

Se pot distinge trei strategii de prevenție:


Prevenția populațională, prevenția la persoanele cu risc crescut și prevenția secundară. Toate cele trei strategii sunt necesare și complementare. Strategia populațională este, în particular, esențială pentru reducerea incidenței globale a bolii, deoarece obiectivul acesteia este reducerea factorilor de risc la nivel populațional, prin modificări ale stilului de viață și ale mediului care afectează întreaga populație. Acest tip de strategie este cel mai bine realizată prin stabilirea ad hoc a unor politici și intervenții la nivel de comunități. Strategiile al căror obiectiv este reducerea riscului total la nivel individual includ strategiile de prevenție primară la persoanele cu risc crescut și cele de prevenție secundară. Primele sunt adresate persoanelor sănătoase care aparțin zonei superioare din distribuția riscului, iar cele de prevenție secundară sunt adresate pacienților cu leziuni de organ sau boli instalate (AVC, TCC, HTA).

Prevenirea se referă la politici și persoane. Contribuțiile la riscul și atenuarea demenței încep devreme și continuă pe tot parcursul vieții, deci nu este niciodată prea devreme sau prea târziu. Aceste acțiuni necesită atât programe de sănătate publică, cât și intervenții personalizate care ar trebui să se adreseze mai ales grupurilor cu risc ridicat. Recomandări:

- Acțiuni specifice pentru factorii de risc pe parcursul vieții
- Scopul menținerii TA sistolică de 130 mm Hg sau mai puțin la vârsta mijlocie (de la vârsta de aproximativ 40 de ani (tratamentul antihipertensiv este singurul medicament preventiv eficient cunoscut pentru demență)
- Încurajați utilizarea aparatelor auditive pentru pierderea auzului și reduceți pierderea auzului prin protejarea urechilor de expunerea excesivă la zgomot
- Reduceți expunerea la poluarea aerului
- Preveniți rănirea capului, diversele traumatisme craniocerebrale
- Limitați consumul de alcool, deoarece consumul abuziv de alcool crește riscul de demență
- Evitați fumatul și sprijiniți renunțarea la fumat, deoarece acest lucru reduce riscul de demență chiar și mai târziu
- Oferiți tuturor copiilor educație primară și secundară
- Reduceți obezitatea și controlați diabetul. Susțineți activitatea fizică atât la maturitate, cât și la bătrânețe
- Abordarea altor factori de risc presupuși pentru demență, cum ar fi somnul, prin intervenții asupra stilului de viață, va îmbunătăți starea generală de sănătate
- Abordarea inegalității și protejarea persoanelor cu demență

- Mulți factori de risc se grupează în jurul inegalităților, care apar în special în grupurile etnice minoritare și în populațiile vulnerabile. Abordarea acestor factori va implica nu numai promovarea sănătății, ci și acțiuni sociale pentru a îmbunătăți circumstanțele în care oamenii își duc viața
- Incidența demenței este mai mare în țările cu venituri mici și medii, din cauza îmbătrânirii populației și a frecvenței mai mari a factorilor de risc potențial modificabili.

10.1 Prevenția primară și secundară a declinului cognitiv și a demenței prin intervenție asupra factorilor de risc modificabili



Posibile mecanisme cerebrale pentru îmbunătățirea sau menținerea rezervei cognitive și reducerea riscului factorilor de risc potențial modificabili în demență

Factorii de risc din viața timpurie (educație), vârsta mijlocie (hipertensiune arterială, obezitate, pierderea auzului, traumatism craniocerebral și abuz de alcool) și viața ulterioară (fumatul, depresia, inactivitatea fizică, izolarea socială, diabetul și poluarea aerului) pot contribui la creșterea riscului de demență. Există dovezi concludente pentru toți acești factori de risc, deși unii factori ai vieții târzii, cum ar fi depresia, au posibil un impact bidirecțional și fac parte, de asemenea, din prodromul de demență.

Educația și stimularea cognitivă. Se consideră că nivelul superior de educație a copiilor reduce riscul de demență, datorită creșterii capacității cognitive generale, odată cu educația, înainte de a ajunge la un platou la sfârșitul adolescenței, când creierul atinge cea mai mare plasticitate; se înregistrează relativ mai puține câștiguri suplimentare cu educația după vârsta de 20 de ani. Acest lucru sugerează că stimularea cognitivă este mai importantă la începutul vieții.

Afectarea auzului. Pierderea auzului reprezintă un factor de risc major pentru declinul cognitiv și demență, probabil, datorită stimulării cognitive reduse. Pragul OMS pentru pierderea auzului este de 25 dB. S-a constatat o agravare a auzului la fiecare reducere cu 10 dB a auzului, care a continuat până sub pragul clinic (sub 25 dB). Studiile au relevat faptul că deficiența de auz (măsurată prin audiometrie) este asociată cu o reducere mai mare a volumului lobului temporal, inclusiv în hipocamp și cortexul entorhinal. Se consideră că utilizarea aparatului auditiv reprezintă cel mai mare factor de protecție împotriva declinului cognitiv.

Traumatismul craniocerebral (TCC). S-a constatat că TCC sever este asociat cu patologie tau hiperfosforilată la nivelul hipocampului, crescând riscul de demență la 1 an, iar riscul a rămas crescut, deși atenuat peste 30 de ani. TCC minore și moderate prezintă un risc de demență mai mic, comparativ cu TCC severe sau multiple. Un studiu de cohortă efectuat pe adulți în vârstă cu comotie cerebrală, a constatat că riscul de demență s-a dublat; interesant este și faptul că cei care au luat statine au avut un risc redus de 13% pentru demență comparativ cu cei care nu aveau statine, sugerând faptul că statinele ar putea atenua edemul cerebral cauzat de leziuni, stresul oxidativ, agregarea proteinelor amiloide și neuroinflamarea.

Hipertensiunea arterială. Hipertensiunea arterială persistentă la vârstă medie este asociată cu un risc crescut de demență târzie. Studiile au arătat că persoanele aflate la vârstă mijlocie târzie (vârsta medie de 62 de ani) cu parametri cardiovasculari ideali (nefumători, IMC 5-25 kg/m², activitate fizică regulată, dietă sănătoasă, tensiune arterială optimă <120/<80 mm Hg, colesterolul și glicemia normală), comparativ cu persoanele cu cel puțin unul dintre aceste riscuri, au avut un risc mai mic de 10 ani pentru demența vasculară și boala Alzheimer. S-a constatat că la persoanele cu tensiune arterială sistolică persistentă de 130 mm Hg sau mai mare, de la vârstă medie 45 până la 61 de ani, riscul de demență este crescut chiar dacă nu prezintă boli cardiovasculare, față de cei fără hipertensiune. Hipertensiunea arterială mediană, definită de la vârstă de 40 de ani, a fost asociată cu volume cerebrale reduse (atrofie) și cu hiperintensitate a substanței albe, dar nu și cu depunere de amiloid. Utilizarea medicamentelor hipotensoare a relevat o reducere a riscului de aproximativ 10%. Studiile au arătat, de asemenea, că nu există nici o diferență între clasele de hipotensoare în ceea ce privește reducerea riscului pentru demență sau declin cognitiv. S-a mai raportat că statinele administrate persoanelor în vârstă cu risc de boli vasculare, nu previn declinul cognitiv sau demența, nu reduc riscul de deces, dizabilitate fizică sau boli cardiovasculare. Boala vasculară a creierului, în patogenia căreia hipertensiunea arterială de lungă durată ocupă

un loc important, duce la modificări structurale ale microcirculației din țesutul cerebral, care determină ischemie cronică, mici atacuri vasculare care distrug substanța cerebrală, leziuni structurale ale substanței albe (sindromul Binswanger) și cicatrici, toate acestea scoțând din funcțiune căi nervoase esențiale pentru procesele de gândire, memorie și învățare. Efectele benefice ale controlului tensiunii arteriale au fost confirmate în incidența, complicațiile și mortalitatea bolilor cardiovasculare, renale și oculare, dar studiul SPRINT este primul care pune în evidență o legătură directă între hipertensiunea arterială și demență și, totodată, este primul studiu care raportează o reducere eficace a riscului de progresie în toate formele de demență prin terapia antihipertensivă. Detecția precoce a acestor leziuni la nivelul creierului ar putea determina intervențiile terapeutice necesare pentru scăderea tensiunii arteriale la acești pacienți, fie prin intermediul medicației, fie prin schimbările făcute în stilul de viață (renunțarea la fumat, activitate fizică, dietă hiposodată, bogată în legume și fructe). Terapia antihipertensivă, care fixează ca țintă o tensiune arterială sistolică sub 120 mmHg, reduce riscul de boală cognitivă ușoară (MCI) cu 19%. De asemenea, prin controlul strict al hipertensiunii s-a redus frecvența leziunilor din substanța albă cerebrală. Ceea ce este și mai promițător este că toate formele de demență, inclusiv cea de tip Alzheimer, au fost reduse cu 17% la bolnavii care au putut fi aduși la valori tensionale sistolice sub 120 mmHg, în comparație cu pacienții a căror tensiune sistolică a persistat la valori mai mari. În grupul de bolnavi cu risc pentru demență Alzheimer sau cu forme clinice de predemență, cei care au putut fi tratați eficace cu medicația antihipertensivă și au avut reducerea dorită a presiunii sistolice (sub 120 mm Hg), menținută constant pe o durată mai mare de trei ani, au dovedit o reducere a incidenței sau progresiei bolii de 17%, mai mare decât cea care a fost vreodată obținută prin orice medicație antiamiloid. Obiectivul principal al tratamentului pacientului hipertensiv este obținerea reducerii maxime a riscului total de morbiditate și mortalitate cardiovasculară pe termen lung. Aceasta impune tratamentul tuturor factorilor de risc reversibili identificați, care includ fumatul, dislipidemia sau diabetul zaharat, precum și managementul corespunzător al afecțiunilor clinice asociate și tratamentul hipertensiunii arteriale perse. Dacă este posibil, TA trebuie redusă la valori de sub 140/90 mmHg la toți pacienții hipertensivi care au indicație de tratament medicamentos și chiar mai mici, dacă reacțiile adverse permit acest lucru. La pacienții diabetici, tratamentul antihipertensiv trebuie să fie mai intensiv, fiind propusă o țintă terapeutică de <130/80 mmHg. Dacă este posibil, aceeași valoare țintă este recomandată la subiecții cu boli cardiovasculare instalate.

Inactivitatea fizică vs exerciții fizice și fitness. Studiile privind activitatea fizică sunt complexe. Modelele de activitate fizică se schimbă odată cu vârsta, generația și morbiditatea și sunt diferite în funcție de sex, clasă socială și cultură. Studiile sugerează o relație cu potențialul de reducere a riscului pentru demență, OMS recomandând adulților cel puțin 150 de minute de exerciții fizice pe săptămână. Pot fi exerciții planificate, ciclism sau activități uzuale. Metaanalizele studiilor observaționale

longitudinale cu durata de 1-21 de ani au arătat că exercițiile fizice sunt asociate cu un risc redus de demență și există dovezi convingătoare pentru activitatea fizică care protejează împotriva bolii Alzheimer diagnosticate clinic. Cel puțin săptămânal, activitatea fizică moderată/intensă a fost asociată cu un risc redus de demență. Oamenii ar putea stopa exercițiile fizice din cauza demenței prodromale, astfel încât inactivitatea poate fi fie o consecință, fie o cauză sau ambele în demență și ar putea reprezenta un risc mai mare la cei cu morbiditate cardiovasculară.

Diabetul zaharat. În 2017 diabetul a fost raportat ca factor de risc pentru demență, fiind asociat cu un risc crescut pentru orice tip de demență, riscul crescând cu durata și severitatea diabetului. Distingerea dintre diabetul tratat și cel netratat ca factor de risc pentru demență este dificilă în studiile observaționale. Efectul diferitelor medicamente diabetice asupra rezultatelor cognitive sau ale demenței rămâne neclar; nu a fost identificat un efect protector al metforminei pentru demență și nu s-a evidențiat niciun impact asupra declinului cognitiv sau demență. Diabetul general de tip 2 este un factor de risc clar pentru dezvoltarea demenței viitoare, iar controlul intensiv al diabetului nu scade neapărat riscul de demență.

Dislipidemia. Relația dintre nivelul crescut al colesterolului plasmatic și boala vasculară aterosclerotică îndeplinește toate criteriile de cauzalitate. O reducere cu 10% a colesterolului plasmatic total determină o scădere cu 25% a incidenței bolii coronariene, iar o reducere a LDL-colesterolului de 1 mmol/l (~40mg/dl) determină reducerea cu 20% a evenimentelor coronariene. S-a constatat, de asemenea, o puternică relație între nivelul scăzut al HDL-colesterolului și riscul vascular. Valorile crescute ale trigliceridelor plasmatică semnalează necesitatea căutării celorlalți factori care se pot asocia cu așa-numitul sindrom metabolic. În general, colesterolul total plasmatic trebuie să fie sub 5 mmol/l (190 mg/dl), iar LDL-colesterolul sub 3 mmol/l (115 mg/dl). Tratamentul cu statine se recomandă în toate BCV și la majoritatea pacienților diabetici, indiferent de valorile inițiale, dar și pacienților cu boli cerebrovasculare sau cu boală arterială periferică. S-a stabilit că statinele reduc nu numai hiperlipidemia, dar și evenimentele și mortalitatea de cauză cardiovasculară, iar în doze maxime stopează progresia și chiar induc regresia aterosclerozei. Din acest motiv, trebuie utilizate ca agenți de primă intenție.

Consumul excesiv de alcool. Băutul excesiv este corelat cu modificări ale creierului, tulburări cognitive și demență, fiind puternic asociat cu tiparele culturale și alți factori socioculturali și de sănătate. Studiile au constatat faptul că tulburările consumului de alcool (utilizare dăunătoare sau dependență, așa cum este definit în ICD), au fost asociate cu un risc crescut de demență, mai ales pentru demența cu debut precoce (vârsta mai mică de 65 de ani). Consumul mic până la moderat de alcool, se asociază cu un risc redus de demență comparativ cu consumul abuziv de alcool. Consumul de mai puțin de 21 de unități de alcool pe săptămână (1 unitate de alcool = 10 ml sau 8 g alcool pur) ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de demență, iar pentru consumatorii de mai mult de 21 de unități pe săptămână, s-a înregistrat o creștere a riscului de 17% .

Controlul greutateii și obezitatea. Excesul de greutate este o preocupare actuală și constantă, existând dovezi care susțin relația dintre creșterea IMC și demență. Studiile efectuate la adulți supraponderali și obezi fără demență, cu vârsta medie de 50 de ani au constatat că pierderea în greutate de cel puțin 2 kg la persoanele cu IMC mai mare de 25 a fost asociată cu o îmbunătățire semnificativă a atenției și a memoriei. Obezitatea devine o epidemie mondială, atât la copii, cât și la adulți. În prezent se estimează că, la nivel mondial, peste 1 miliard de persoane sunt supraponderale și peste 300 milioane sunt obeze. Mai mult de o treime dintre copii sunt supraponderali sau obezi. Țesutul adipos excesiv este asociat cu o creștere a producției de acizi grași liberi, cu hiperinsulinism, rezistență la insulină, hipertensiune arterială și dislipidemie. S-a demonstrat că, în special, țesutul adipos central (visceral abdominal) excesiv este puternic asociat cu riscul metabolic și cardiovascular. Indicele de masă corporală IMC a fost utilizat în mod extensiv pentru a defini grupe de greutate corporală [$\text{kg}/\text{înălțime}(\text{m})^2$], utilizând clasificări sugerate de Institutul Național de Sănătate (National Institutes of Health) și de OMS. La adulți, supraponderabilitatea este definită printr-un IMC crescut, variind de la 25 la 29,9 kg/m^2 , iar obezitatea printr-un IMC ≥ 30 kg/m^2 . Scăderea ponderală voluntară la pacienții obezi poate reduce sau preveni mulți factori de risc asociați obezității. Reducerea consumului caloric total și exercițiile fizice regulate sunt esențiale pentru controlul greutateii. Probabil că îmbunătățirea metabolismului țesutului adipos central prin exerciții fizice survine chiar înainte de scăderea ponderală. Terapia comportamentală și cognitiv-comportamentală sunt utile pentru scăderea ponderală, atunci când este adăugată dietei și programelor de exerciții fizice. Schimbările comportamentale și-au demonstrat utilitatea și pentru menținerea scăderii ponderale.

Tratamentul medicamentos al excesului ponderal. Orlistat inhibă lipazele intestinale, împiedicând hidroliza și absorbția lipidelor. Scăderea ponderală este, în general modestă și pot apărea tulburări gastrointestinale. Acest produs trebuie utilizat în asociere cu o dietă completă și echilibrată. Sibutramina crește senzația de sațietate după ingestia alimentară prin efectul metaboliților săi, care inhibă captarea noradrenalinei și a serotoninei. Atât contraindicațiile, cât și reacțiile adverse sunt apreciable. Rimonabant este un inhibitor al receptorilor endocanabinoizi, care induce o scădere ponderală modestă dar susținută, în asociere cu o dietă caloric controlată. Poate îmbunătăți toleranța la glucoză, influențează în mod benefic metabolismul lipidic.

Fumatul. Fumătorii prezintă un risc mai mare de demență decât nefumătorii și prezintă un risc mai mare de deces prematur înainte de vârsta la care ar fi putut dezvolta demență, existând o oarecare incertitudine în asocierea dintre fumat și riscul de demență. Încetarea fumatului, chiar și la vârste mai mari, reduce acest risc. La nivel mondial, se estimează că 35% dintre adulții care nu fumează și 40% dintre copii sunt expuși la fumatul pasiv. S-a constatat faptul că la femeile cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani, expunerea la fumatul pasiv a fost asociată cu deteriorarea memoriei, riscul crescând proporțional cu durata expunerii.



Aspecte practice: prevenția și managementul fumatului. Evaluarea statusului fumător-nefumător trebuie făcută cu fiecare ocazie. La toți fumătorii trebuie încurajată oprirea fumatului. Nu există o limită de vârstă pentru beneficiile opririi fumatului. Toți fumătorii trebuie încurajați în mod profesionist să renunțe definitiv la toate tipurile de tutun. Pot fi utili **cei 5 A**:

A – ASK (cercetați): identificați fumătorii în mod sistematic, cu orice ocazie

A – ASSESS (evaluați): Stabiliți gradul de dependență a persoanei respective și disponibilitatea de acestora de a renunța la fumat

A – ADVISE (consiliați): Îndemnați în mod neechivoc toți fumătorii să renunțe la fumat

A – ASSIST (ajutați): Cădeți de acord asupra unei strategii de renunțare la fumat, care să includă consiliere, tratament de substituție nicotinică și/sau intervenții farmacologice

A – ARRANGE (stabiliți) un orar al vizitelor ulterioare

Renunțarea la fumat este un proces complex și dificil, deoarece acest obicei induce o puternică dependență, atât farmacologică, cât și psihologică. Renunțarea la fumat poate fi facilitată prin acordarea unei asistențe specializate. Recomandarea fermă și explicită a medicului de oprire completă a fumatului este factorul cel mai important pentru începerea procesului de renunțare la fumat. Evaluarea dorinței persoanei de a încerca să renunțe la fumat, reiterarea pe scurt a riscurilor cardiovasculare și a altor riscuri asupra stării de sănătate și punerea de acord asupra unui plan specific cu stabilirea vizitelor ulterioare, constituie în practica clinică primele etape decisive și esențiale ale consilierii inițiale. Atât intervențiile individuale, cât și cele de grup pot fi utile pentru oprirea fumatului. Sunt foarte utile implicarea familiei în procesul de renunțare la fumat și determinarea altor membri fumători ai familiei să renunțe la fumat împreună cu pacientul. Gumele de mestecat și plasturii transdermici cu nicotină au fost utilizați pe scară largă pentru a ajuta persoanele care opresc fumatul să depășească momentele dificile din primele săptămâni sau luni. Medicația antidepresivă și-a demonstrat eficacitatea în renunțarea pe termen lung la fumat, Bupropiona și nortriptilina pot fi utile în acest proces. Un alt agent farmacologic nou care poate fi util este vareniclina, un agonist al receptorilor de nicotină acetilcolină. La fumătorii pe termen lung, tratamentul cu vareniclină a fost asociat cu o rată de oprire a fumatului de 23% la 1 an, comparativ cu rate de 15% și 10,3% în grupurile tratate cu bupropionă și, respectiv, placebo.

Depresia. Depresia este asociată cu incidența demenței, având o mare varietate de mecanisme psihologice și fiziologice. De asemenea, depresia face parte din prodromul și stadiile incipiente ale demenței, fiind posibilă o relație de cauzalitate inversă, prin care simptomele depresive rezultă din neuropatologia demenței care apare cu ani înainte de debutul demenței clinice. Se consideră că, uneori, simptomele suferinței psihologice pot prezice demența, iar la sfârșitul vieții, aceste simptome cresc riscul de demență. Unele studii au luat în considerare efectul tratamentului cu inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, cum ar fi citalopramul, cunoscut pentru reducerea formării plăcilor amiloide, constatându-se întârzierea progresiei către boala

Alzheimer diagnosticată clinic. Astfel, persoanele tratate cu antidepresive evoluează mai bine, comparativ cu cele netratate.

Contactul social. Contactul social este considerat un factor de protecție, deoarece îmbunătățește rezerva cognitivă și încurajează comportamentele benefice, deși izolarea ar putea apărea și ca parte a prodromului de demență. Mai multe studii sugerează că un contact social mai redus crește riscul de demență. Astfel persoanele singure pe tot parcursul vieții, necăsătorite sau văduve au un risc mai crescut pentru declin cognitiv, comparativ cu persoanele căsătorite. Contactul social ridicat (activitate socială și rețea socială) a fost asociat cu o mai bună funcție cognitivă la bătrânețe. Evaluarea socializării se face cu ajutorul scalei de contact social care are cinci itemi de bază: starea civilă, comunicarea cu membrii familiei, contactul cu prietenii, participarea în grupuri comunitare și angajarea în muncă plătită. S-a constatat că scorul este asociat liniar cu riscul redus de demență, cel mai mare scor pe scara de cinci puncte scade cu 46% riscul de a dezvolta demență.

Aerul poluat. Se consideră că poluarea aerului și particulele fine poluante au un impact negativ asupra sănătății în general, dar și asupra creierului, accelerând procesele neurodegenerative prin boli cerebrovasculare și cardiovasculare, depunerea A β și procesarea proteinelor precursorale ale amiloidului. Concentrația ridicată de dioxid de azot (NO₂), monoxidul de carbon și particulele poluante fine sunt asociate cu incidență crescută a demenței.

Somnul. Mecanismele prin care somnul poate determina demența nu sunt foarte clare, dar tulburările de somn au fost corelate cu depunerea β -amiloidă (A β), reducerea activării căilor de eliminare glimfatică, un grad mic de inflamație, ceșterea proteinei Tau și boli cardiovasculare. Tulburările de somn se referă la o durată scurtă sau lungă de somn, o calitate slabă a somnului, o anomalie a ritmului circadian, insomnie și apnee obstructivă de somn. Toate aceste tulburări au fost asociate cu un risc mai mare de demență de toate tipurile, inclusiv pentru boala Alzheimer diagnosticată clinic, comparativ cu nicio tulburare a somnului. A fost raportată o asociere între durata somnului și riscul de afectare cognitivă ușoară sau demență, cu riscuri mai mari de demență cu mai puțin de 5 ore comparativ cu mai mult de 5 ore și mai puțin de 7 ore și mai mult de 10 ore de somn, și riscurile pentru demență. Mecanismele postulate ale somnului redus care duc la acumularea patologiei de tip Alzheimer sunt incompatibile cu dovezile că atât un somn mai mare, cât și un somn mai mic sunt asociate cu un risc crescut de demență. Tulburările de somn cu debut târziu, cu câțiva ani înainte de demența clinică, ar putea face parte din istoricul natural al sindromului de demență și poate fi un factor de risc sau să reflecte alte tulburări (tulburări de dispoziție sau boli cardiovasculare). S-a constatat că utilizarea hipnoticelor se asociază cu un risc mai mare de demență, indiferent de durata somnului.

Dieta. Studiile observaționale s-au concentrat asupra rolului unor micronutrienți în sănătatea creierului și demență (folat, vitamine B, Vitamina C, D, E, seleniu) ca factori potențiali de protecție. S-a constatat că dieta mediteraneană (aport ridicat de legume,

leguminoase, fructe, nuci, cereale și ulei de măsline, aport scăzut de lipide saturate și carne) ar putea influența riscul de demență prin protejarea împotriva riscului excesiv de factori de risc cardiovascular. Studiile sugerează că dieta mediteraneană sau scandinavă ar putea avea valoare în prevenirea declinului cognitiv la persoanele cu cogniție intactă, în special ca o componentă a unui stil de viață sănătos. O dietă sănătoasă presupune:

- Varietate largă de alimente;
- Ajustarea aportului caloric pentru a preveni excesul ponderal. Încurajarea consumului de fructe, legume, cereale și pâine integrală, pește (în special pește gras), carne slabă, produse lactate degresate;
- Înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi mono și polinesaturate (vegetale și marine);
- Reducerea aportului de sare la subiecții hipertensivi.

Asigurarea stării de bine este scopul unei bune și corecte îngrijiri a demenței. Persoanele cu demență au probleme și simptome complexe în multe domenii. Intervențiile ar trebui să fie individualizate și să ia în considerare persoana în ansamblu, dar și pe îngrijitorul pacientului cu demență. S-au dovedit eficiente intervențiile psihosociale adaptate nevoilor pacientului, pentru gestionarea simptomelor neuropsihiatrice.

10.2 Strategii recomandate pentru reducerea riscului de demență

Riscurile sunt deosebit de mari în populațiile mai defavorizate din punct de vedere social și economic, inclusiv în grupurile etnice negre și minoritare.

La nivelul întregii populații


- Prioritizarea educației tuturor copiilor;
- Implementarea politicilor sociale de sănătate publică care reduc riscul de hipertensiune arterială la nivelul întregii populații;
- Elaborarea de politici care încurajează activitatea socială, cognitivă și fizică pe parcursul vieții;
- Verificarea riscurilor pentru pierderea auzului pe tot parcursul vieții, pentru a reduce riscul expunerii la acest factor de risc;
- Reducerea riscului de traume cerebrale grave, inclusiv ocupaționale și de transport;
- Politici naționale și internaționale de reducere a expunerii populației la poluarea aerului;
- Continuarea consolidării eforturilor naționale și internaționale pentru reducerea expunerii la fumat.

La nivel individual

- Tratarea hipertensiunii arteriale cu vizarea unei TA sistolice <130 mm Hg la vârsta mijlocie;

- Folosirea aparatelor auditive pentru pierderea auzului; oamenii trebuie încurajați să poarte aparate auditive, deoarece mulți le consideră inacceptabile, prea greu de utilizat sau ineficiente;
- Evitarea unui consum mare de alcool (21, sau mai mult de alcool pe săptămână)
- Prevenirea traumei capului în cazul în care o persoană prezintă un risc ridicat;
- Oprirea fumatului este benefică indiferent de vârstă;
- Reducerea obezității și controlul diabetului prin dietă și activitate fizică
- Menținerea activității fizice până la sfârșitul vieții.

Prin aplicarea acestor strategii și respectarea regulilor recomandate, se reduce riscul de demență cu aproximativ 40%. De aceea, se consideră că evitarea sau întârzierea declinului cognitiv și a demenței prin intervenția asupra factorilor de risc potențial modificabili, ar trebui să reprezinte o prioritate națională pentru sănătate publică.



Cercetările arată că sunt multe modalități prin care ne putem antrena funcțiile creierului. La orice vârstă putem începe să exersăm pentru că nu există o limită de vârstă până la care putem învăța ceva nou. Totul este să transformăm aceste exerciții în obiceiuri ale vieții de zi cu zi!

Sfaturi și metode simple pentru îmbunătățirea memoriei:

● Strânge pumnul drept

Specialiștii susțin că dacă strângi mâna dreaptă sub formă de pumn în timp ce înveți, acest obicei poate ajuta memoria. Ruth Propper de la Montclair State University a realizat un studiu și a analizat modul în care mișcările corpului influențează funcționarea creierului. În urma cercetării s-a constatat că cea mai bună combinație pentru îmbunătățirea memoriei a fost atunci când participanții au încheștat mâna dreaptă înainte de memorare și apoi au format pumnul stâng pentru a-și aduce aminte mai bine cuvintele învățate.

● **Dormi** - unul dintre beneficiile aduse de somn este acela că îmbunătățește memoria, întărește amintirile, le restructurează și reorganizează.

● Fă o plimbare, fă exerciții fizice

Studiile au indicat că este de ajuns să mergem pe jos doar 10 kilometri pe săptămână pentru a ne menține buna funcționare a memoriei. O activitate fizică moderată ajută la ameliorarea imediată a memoriei, nu doar la cei vârstnici, ci și la persoanele tinere, deoarece contribuie la o mai bună conexiune între ariile cerebrale care exercită această funcție, 10 minute de "efort ușor" putând determina "beneficii cognitive considerabile". S-a demonstrat că perioade scurte de exerciții moderate duc la creșterea conexiunii "între girusul dentat din hipocamp și ariile corticale legate de procesarea detaliată a memoriei".

În general, se recomandă mișcare cel puțin 30 min/zi. Dar de ce este util și creierului?

- sportul are ca efect producerea unei cantități crescute de endorfine în corpul nostru; endorfinele sunt neurotransmițători care ajută la diminuarea durerii și a stresului
- exercițiile fizice regulate sunt însoțite și de creșterea serotoninei –alt mesager chimic care contribuie la stare generală de bine
- în timpul efortului fizic, aportul de sânge și oxigen către creier crește, cu consecințe benefice și asupra memoriei

● **Ignoră stereotipurile** – un studiu realizat în 2003 sublinia faptul că atunci când oamenii în vârstă li se amintește despre aceste stereotipuri legate de înaintarea în vârstă și pierderea naturală a memoriei, aceștia chiar începeau să aibă rezultate mai slabe la testele de memorie.

● **Citește** (cărți, reviste, postări de pe rețelele de socializare). S-a constatat că postările de pe Facebook sunt mai ușor de memorat decât propoziții din cărți, acest lucru datorându-se, probabil, faptului că postările de pe Facebook sunt scrise într-un limbaj spontan, simplu și natural, mai ușor de asimilat.

- **Lasă-te de fumat, renunță la alcool**

Deși beneficiile fizice ale renunțării la fumat sub deja destul de cunoscute, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că există și beneficii aduse memoriei; fumatul afectează memoria, dar renunțarea la acest obicei dăunător poate restabili funcțiile cognitive normale.

- **Folosește produse naturiste benefice**



S-a demonstrat că mirosul de ulei esențial de rozmarin poate îmbunătăți memoria pe termen lung. Consumați produse naturiste cu efect benefic asupra memoriei: turmeric, Ginkgo biloba, Ginseng, Roinița, Schinfuf.

- **Slăbește**

Excesul ponderal este deseori asociat cu apariția problemelor de memorie, iar slăbitul poate ajuta la refacerea funcțiilor cognitive.

S-a constatat că performanțele obținute de participanți la testele de memorie, s-au îmbunătățit după scăderea în greutate.

- **Închide computerul și bucură-te de liniște**

Chiar și atunci când suntem inactivi, creierul continuă să realizeze funcții importante legate de memorie, această pauză ajutând la consolidarea amintirilor.

- **Socializează cât mai mult**

Interacțiunile sociale ajută la combaterea bolilor mentale. Studiile au descoperit că socializarea are efecte la fel de puternice ca și exercițiile mentale în ceea ce privește stimularea creierului și consolidarea memoriei. Mai mult, lipsa de socializare poate duce la depresie și alte tulburări de sănătate mintală. O conversație oferă șansa de a face exerciții de gândire, de memorie, de evocare, activează logica, gândirea critică, conexiunile emoționale și consolidarea cunoștințelor.

- **Construiește un puzzle**

Rezolvarea unui puzzle aduce cel puțin 3 avantaje observate de cercetători:



- antrenează funcțiile creierului: percepția vizuală, rotația mentală, flexibilitatea cognitivă
- ajută la un mai bun control al stresului și emoțiilor menținând atenția focusată într-o direcție
- îmbunătățește memoria de lucru: capacitatea noastră de a reține date pentru perioade scurte și care ne dictează mare parte din acțiuni.

● **Învăță ceva nou**

S-a constatat că dobândirea unei abilități noi îmbunătățește activitatea creierului (croitorie, fotografie digitală, un program nou de computer, cum se repară un obiect)

● **Învăță pe altcineva ceea ce știi**

Explicarea cuiva presupune exersarea propriei capacități de a raționa, de a evoca amintirile

● **Lărgeste-ți vocabularul**

Îmbunătățirea vocabularului limbii materne este o altă variantă de a-ți exersa memoria, o metodă de a te menține în formă din punct de vedere cognitiv

● **Ascultă muzică**

Este deja cunoscut "efectul Mozart" care rezumă efectele benefice ale muzicii asupra funcțiilor creierului, asupra capacității noastre de a argumenta logic.

● **Învăță un nou dans**

Învățarea și reproducerea pașilor unui dans nou accelerează capacitatea de a procesa informațiile și memoria, iar socializarea pe care o implică practicarea unui dans, are, de asemenea, efecte benefice.

● **Folosește-ți toate simțurile**

În orice moment creierul nostru primește informații pe care le percepem cu cele 5 simțuri: văz, auz, miros, gust și atingere; și pentru memorare implicarea este multisenzorială. Cercetătorii susțin că memoria de lucru este multisenzorială, fiind un sistem prin care creierul codifică și reține informații de la toate simțurile noastre

● **Meditația sau rugăciunea zilnică**

Practicarea meditației/rugăciunii zilnice reduce stresul și anxietatea, dar crește și abilitatea creierului de a procesa informații; exersarea atenției, focusării simțurilor și gândirii într-o anumită direcție, activează toate regiunile creierului: corticale, subcorticale și chiar substanța albă și regiunile mai vechi fi logenetic. Meditația este un proces mental activ care poate determina chiar modificări structurale ale creierului; ele au fost puse în evidență cu ajutorul tehnologiei moderne (RMN) la persoane care au practicat meditația timp îndelungat.

BIBLIOGRAFIE

1. What is normal in normal aging? Effects of Aging, Amyloid and Alzheimer's Disease on the Cerebral Cortex and the Hippocampus. Prog Neuro- biol. 2014 jun. Anders M. Fjell, 2014
2. Normal Cognitive Aging, Harada, Clin Geriatr Med, Nov. 2013
3. www.hindawi.com Neural Plasticity in the Entorhinal Cortex
4. Generalizing age effects on brain structure and cognition. Hum Brain Mapp, 2019 jun
5. <https://www.neuroage.ro>
6. American Psychiatric Association DSM-5 Development. [March 25, 2012]. Available at www.dsm5.org DSM-5
7. Ghidul European de prevenție a bolilor cardiovasculare 2007
8. Type 2 diabetes and cognitive impairment. Diabet Med 2003
9. Increased dementia risk predominantly in diabetes mellitus rather than in hypertension or hyperlipidemia (Alzheimer Res Ther. 2017). Yen-Chun Fan et al
10. Risk of dementia in diabetes mellitus: a systematic review. Lancet Neurol. 2006, J. Biessels et al
11. Epidemiology of Diabetes and Risk of Dementia, Ohara T. Brain Nerve. 2016
12. Type 2 Diabetes Mellitus Increases the Risk of Late-Onset Alzheimer's Disease: Ultrastructural Remodeling of the Neurovascular Unit and Diabetic Gliopathy. Brain Sci. 2019. Melvin R. Hayden
13. Ghidurile Federației Europene a Societăților de Neurologie pentru Diagnosticul și tratamentul bolilor neurologice- Ghid de diagnostic și tratament în Demențe. Coordonator științific al ediției în limba română: Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru. Editura Medicală Amaltea, 2013
14. Knopman DS, Petersen RC Mild cognitive impairment and mild dementia: a clinical perspective Mayo Clin Proc. 2014
15. Sudo FK, Alves GS, Alves CE, et al. Impaired abstract thinking may discriminate between normal aging and mild cognitive impairment. Arq Neuropsiquiatr. 2010
16. Zanetti M, Ballabio C, Abbate C, et al. Mild cognitive impairment subtypes and vascular dementia in community-dwelling elderly people: a 3-year follow-up study. J Am Geriatr Soc. 2006
17. Costantino Iadecola The pathology of vascular dementia. Neuron. 2013 Nov 20; 80(4):10.1016 / j.neuron. 2013
18. Philip B. Gorelick, Angelo Scuteri, Sandra E. Black; Vascular Contribution to Cognitive Impairment and Dementia; Stroke. 2011 sep
19. Jellinger KA. Morphologic diagnosis of "vascular dementia": a critical update. J Neurol Sci. 2008.
20. Schneider JA, Arvanitakis Z, Leurgans SE, Bennett DA. The neuropathology of probable Alzheimer disease and mild cognitive impairment. Ann Neurol. 2009.

21. 52. University of Florida . ClinicalTrials.gov National Library of Medicine (US); Bethesda, MD: 2010. The LIFE Study: Lifestyle Interventions and Independence for Elders.<http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01072500>
term=Lifestyle+Interventions+and+Independence+for+Elders+Study&rank=1. NLM identifier: NCT01072500.
22. Scarmeas N, Stern Y, Mayeux R, Manly JJ, Schupf N, Luchsinger JA. Mediterranean diet and mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2009
23. Ravaglia G, Forti P, Lucicesare A, Pisacane N, Rietti E, Bianchin M, Dalmonte E. Physical activity and dementia risk in the elderly: findings from a prospective Italian study. Neurology. 2008
24. Association of Midlife to Late-life Blood Pressure Patterns with Incident Dementia. Jama, 2019, Keenan Walker et al
25. Dementia prevention, intervention and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet 2020, Gill Livingston et al
26. Impact of Hypertension on Cognitive Function, Hypertension. 2016. Constantino Iadecola
27. Age of Onset of Hypertension and Risk of Dementia in the Oldest-Old. Alzheimers Dementia. 2017. Maria Corrada et al
28. Defining the relationship between hypertension, cognitive decline and dementia: a review. Curr. Hypertens Rep. 2017. Keenan Walker et al
29. Statins Reduces the Risk of Dementia in Patients with Late-Onset Depression. PloS One 2015, Ya-Hsu Yang
30. LDL-Lipids from patients with hypercholesterolemia and Alzheimer's disease are inflammatory to microvascular endothelial cells: Mitigation by statin intervention. Clin Sci (Lond). 2016. H. Ki. Dias et al
31. Genetics in Alzheimer's disease, E Moruzzi, 2014
32. Risk factors associated with the onset and progression of Alzheimer's disease
33. Alzheimer's disease: risk factors and potentially protective measures. J. Biomed Sci , 2019, Silva et al
34. High prevalence of sleep disorders and behavioral and psychological symptoms of dementia in late-onset Alzheimer disease. Medicine Baltimore 2019. Guoyu Zhou et al
35. The sleep-wake cycle and Alzheimer' disease. Neurodegener Dis Manag. 2015. Miranda Lim et al
36. Aging with Alcohol-Related Brain Damage: Critical Brain Circuits Associated with Cognitive Dysfunction. Int Rev Neurobiol. 2019. P. Toledo Nunes et al
37. Alcohol and the Brain: Neuronal Molecular Targets, Synapses and Circuits. Neuron. 2017. K. P. Abrahao
38. Ghid clinic de evaluare și intervenție în cazul bolii Alzheimer. Florin Alin Sava. 2019
39. Baza de date a Spitalului județean de Urgență Reșița. Compartimentul de Statistică și Informatică

40. 1. Moore A., Patterson C., Lee L. et al. Fourth Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia Recommendations for family physicians. Canadian Family Physician – Le Medicine de famille canadien. 2014; (60): 433-38. (accesat pe <http://www.cfp.ca/content/60/5/433.full.pdf+html> - martie 2017).
41. Petersen R.C., Roberts R.O., Knopman D.S. et al. Prevalence of mild cognitive impairment is higher in men. Neurology. 2010; 75(10): 889–897. (accesat pe <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938972/> - martie 2017).
42. Langa K.M., Levine D.A. The Diagnosis and Management of Mild Cognitive Impairment: A Clinical Review. JAMA. 2014; 312(23): 2551-2561. (accesat pe <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4269302/> - martie 2017).
43. Albert M.S., DeKosky S.T., Dickson D. et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dement. 2011; 7(3): 270–279. (accesat pe <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312027/pdf/nihms363316.pdf> - martie 2017).
44. Barnes D.E., Beiser A.S., Lee A. et al. Development and validation of a brief dementia screening indicator for primary care. Alzheimers Dement. 2014; 10(6): 656-665.e1. (accesat pe <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119094/> - martie 2017).



Interreg - IPA CBC România - Serbia



UNIUNEA EUROPEANĂ

Cooperare dincolo de frontiere.

Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) și cofinanțat de statele partenere în program

Titlul proiectului: Îmbătrânire sănătoasă și demența ~ o viață mai bună

Editorul materialului: Spitalul Județean de Urgență Reșița

Data publicării: Iunie 2021

**Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a Uniunii Europene.**

Pentru eventuale sesizări, contactați: romania-serbia@mdrap.ro

www.romania-serbia.net

Aging and dementia - a better life.
Project co-financed by the European Union and partner states.



Violeta Moroşoi

Tatjana Voskresenski

MODIFIED RISK FACTORS AND DEMENTIA PREVENTION



Violeta Moroşoi - author

Tatiana Voskresensky - coauthor

Liana-Oana Filimon - English translator

Liubiţa Raichici - Serbian translator



FOREWORD

Europe faces the enormous challenge of providing an optimal quality of life for citizens of all ages. Category elderly is special, and is treated specially by the European Institutions. It is a challenge for the member countries to address the issues of the elderly in an effective way. In the challenges of the various illnesses that older people face, mental illness is a key one of the challenges. Dementia is one of the most common mental illnesses, that is not yet curable. In the EU as a whole, the life expectancy is expected to increase in the coming years, until 2080 from 65, as it was in 2015, by six years and one month for men and by six years and six months for women. As a consequence of the increase in life expectancy and the aging of the population, the predictions of prevalence and incidence indicate that the number of people with dementia will increase in the coming years.

The international research collaboration and the flow of knowledge across national borders are essential, given that the viable solutions must be found to these global challenges. In the border region, the lifestyle of the inhabitants is similar, as is the socio-economic situation, so the medical problems are similar. For this reason, there is a need for cooperation in finding solutions to common problems.

Starting from a concrete situation, the increase of life expectancy and the increase of the aged population will implicitly lead to the increase of the number of the population with a degenerative diseases such as dementia. Unfortunately, there is currently no cure for dementia. Therefore, the primary prevention is very important. Many factors have been associated with dementia and anything that can help prevent dementia is important.

Several recent studies have projected that up to 30% of dementia cases can be prevented by targeting modifiable risk factors.

The population-based studies show that, although the total number of dementia cases is increasing, age-specific incidence rates are declining in parallel with population reductions in risk factors such as low education, smoking, cardiovascular disease, etc.

The purpose of this paper is multiple: to raise awareness that, the risk factors can reduce the onset or slowing of dementia development, introduce a wider audience, education, lifestyle change (physical and social activity, reduce vascular risk, diet, quitting smoking or alcohol consumption) are decisive in reducing the risk of dementia. The paper addresses both specialized staff and the general public, who can understand



the risks, but also how to approach the treatment of a person with dementia, how to change the life of such a person, but also a family that has a member affected by this disease.

By publishing this paper, the European Union contributes directly to improving the lives of people in the cross-border area, in this case in Caras Severin and Vojvodina counties.

This publication is funded by the European Union under the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Program Romania - Republic of Serbia through the project "HEALTHY AGING AND DEMENTIA - A BETTER LIFE" code RORS 241.

The partners in this project:

- "Dr Slavoljub Bakalovic" Mental Illness Hospital Vrsac, Serbia - project leader
- Resita County Emergency Hospital.

The overall objective of the project is "Improving the quality of life for patients with dementia in the cross-border area".

The specific objectives are: to increase the capacity of the Vrsac hospital, to identify the major risk factors for dementia in the border region and to reduce the risk of stigmatization and social exclusion of patients with dementia.

The project implementation team

INTRODUCTION

1.1 GENERAL DATA: COGNITIVE DECLINE AND DEMENTIA - THEIR IMPACT ON LIFE AND SOCIETY

THE IMPORTANCE AND CURRENTNESS OF THE TOPIC

Dementia, with its various subtypes, is a broad category of chronically evolving brain diseases, characterized by progressive and irreversible global cognitive regression, affecting daily functionality, often leading to permanent disability and even premature death; usually associated with a wide range of neuropsychic symptoms - emotional and personality disorders, as well as psychiatric symptoms (depression, psychotic disorders, behavioral disorders). The cognitive function includes five sectors / domains: learning and memory, language, visual-spatial perception, executive and psychomotor, all of which are affected to varying degrees in minor cognitive decline (MCI-mild cognitive impairment) and dementia.

It is a problem of great social, medical, ethical, economic-financial and even cultural importance as it is one of the biggest causes of disability in the elderly population and is often associated with significant mental, psychiatric and social disabilities.

SOCIAL IMPACT OF DEMENTIA: Dementia has become a major public health problem globally, in many countries the treatment and care of patients with dementia is considered a national priority, investing in research, health education, care and social services. The social cost of dementia is very high, being borne by both the family and society. The magnitude of the social impact of dementia also derives from the huge number of people affected globally (according to the WHO, in 2012 there were approximately 35.6 million people with dementia, and in 2015 their number reached 47.5 million, anticipating is that their number will triple in 2050). There are 7.7 million new cases of dementia each year, placing a huge burden on the family, primary caregivers, social workers and the financial costs to society. It was also found that about 3% of the population aged 65-74, 19% of the age group 75-84 and almost 50% of those over 85, have dementia. The prevalence of dementia varies between 5-10% in people over 65, the prevalence of Alzheimer's disease doubles every 4.3 years, and the prevalence of vascular dementia doubles every 5.3 years. In 2013, there were 1.7 million deaths due to dementia, compared to 0.8 million deaths in 1990. Dementia remains an overwhelming and costly disease.

THE ECONOMIC-FINANCIAL IMPACT OF DEMENTIA: The economic costs of treating, maintaining and caring for these goodies are huge, which is why they are an overwhelming burden on human society. It is estimated that about \$ 604 trillion / year is spent in the US, surpassing the cost of cancer and heart disease (Hurd et al. 2013) and about \$ 55 trillion / year in Europe.

THE MEDICAL IMPACT OF DEMENTIA: despite the progress made in recent years in the field of etiopathogenesis of dementia of various types, in reality only the improvement and development of the classification of dementia has been achieved, without much practical value, as no drugs have been discovered to prevent or cure dementia. ; there is no specific treatment for dementia - ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORS (Donepezil) are used in mild and moderate forms, but the therapeutic benefit is minor and side effects such as bradycardia or syncope may occur; NMDA-MEMANTINE-RECEPTOR BLOCKERS may be useful and beneficial, but the evidence is less conclusive than for acetylcholinesterase inhibitors; the two therapeutic categories can be combined, but the efficacy is very low. For symptomatic treatment - behavioral disorders, antipsychotics can be used, but they do not affect the underlying process of the disease, and can even have severe side effects - stroke or even death. Other measures that can improve the quality of life of these patients are cognitive and behavioral interventions, palliative therapy.

ETHICAL AND CULTURAL IMPACT OF DEMENTIA: Dementia patients are socially stigmatized and often addicted, many of whom can survive as long as there is support from society, in some countries there are even national strategies for managing these patients.

1.2 MOTIVATION OF THE TOPIC:

Given the increased frequency of dementia among the population (46 million people affected in 2015), the disabling nature of this condition - up to total functional dependence, high risk of death, huge social costs and lack of treatment specifically addressed to the underlying pathological process and given that these drugs unanimously accepted for the treatment of dementia not only bring a minor benefit, but they are also marketed at exorbitant prices, and in Romania special approvals are required from the Insurance House to prescribe them, we meet these problems with a possible strategy, effective and less expensive, namely: prevention of dementia and cognitive decline by intervening on their modifiable risk factors **"Praevenire melius est quam curare"**.

The World Health Organization (WHO) recommends that member countries develop comprehensive multi-sectorial public policies to improve patients' quality of life, increase their equitable access to services and reduce the stigma and social isolation faced by patients and their carers. The WHO has also initiated the process of preparing



recommendations to reduce the risk of cognitive decline and dementia. Studies have shown that there is a link between the risk of cognitive decline and dementia and lifestyle risk factors such as lack of physical activity, smoking, unhealthy diets and alcohol abuse. Several medical conditions are associated with an increased risk of dementia, including high blood pressure, diabetes, hypercholesterolemia, obesity and depression. Other risk factors that can potentially change are social isolation and cognitive inactivity.

Of great interest is the evaluation of risk factors and protective factors, in order to promote brain and cognitive health until old age; the existence of risk and protective factors, it largely applies to interindividual variations in cognitive performance and brain structural changes among the adult population.

Also, the existence of all these potentially modifiable factors means that the prevention of dementia is possible through public health approaches, including the implementation of key interventions that delay the onset or evolution of cognitive decline or dementia. Thus, reducing the risk of dementia has become one of the 7 strategic areas of intervention in the global action plan 2017-2025 on the public health response to dementia.

2. THE NATURAL AGING OF THE BRAIN – SENESCENCE

Age-related structural changes in the brain, such as decreased hippocampal volume, frontal lobe and temporal lobe, are a common aspect of natural aging that contributes to some changes in neurocognitive processes.

Major aspects of human cognitive function are influenced by a variety of factors, including genetic inheritance, lifestyle, diet, disease, trauma, medication, and normal and pathological aging. It has been found that a marked decline in age-related neurocognitive function occurs in healthy individuals from the age of 20 and continues throughout adulthood.

This decline occurs in all individuals, encompassing a wide range of major aspects of cognitive function: memory, coherent and fluid thinking, information processing speed, attention, non-declarative memory, language, visuospatial skills, rational skills, executive function. Cognitive changes as a normal aging process have been well documented in the scientific literature. Some cognitive skills, such as vocabulary, are resistant to the passage of time and may even improve with age. Other skills, such as conceptual reasoning, memory, and processing speed, gradually decrease over time. There is significant heterogeneity among adults as they age, in the rate of decline in skills, such as perceptual reasoning and information processing speed, this differentiation being dictated by multiple individual factors influencing cognitive endowment (genetic and acquired).


2.1 STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF THE BRAIN WITH AGING

As we age, the brain undergoes changes in structure and function; the reduction in brain volume is well documented, with an annual decrease of 0.2-0.5% (Hedman et al. 2012); thus, after 60 years, there is a decrease in volume by 7-9%, reduction of its weight by 100-150 g, enlargement of the cortical grooves and cerebral ventricles. These changes are signs of cortical atrophy (= atrophy of neurons with loss of connections between them).

Adults normally lose 100,000 neurons a day, with lifetime neuronal loss of only 10%; it is considered that it is not the loss of neurons that is responsible for memory disorders, but their atrophy and the loss of connections between them.


Traditionally, the Frontal Lobe is considered the most vulnerable to normal changes in aging, inspiring the Frontal theory of cognitive degradation. Currently, it is considered that the reduction of Temporal areas in healthy elderly people is comparable in magnitude with Frontal changes, registering an annual atrophy rate of 0.79% - 2% for the hippocampus and 0.3% - 2.4% for entorinal cortex - Aria 28 Brodman (Fjell et al.2009). The entorinal cortex is a relay between the hippocampus and the associative

areas, has connections with the prefrontal area (activating the prefrontal ventrolateral region) and ensures the performance of episodic memory.



In some cases, these changes may not cause clinically obvious symptoms due to the brain's significant compensatory capacity, which masks certain changes and delays the onset of decline. The brain has a great capacity for plasticity, repairing damage and cortical remodeling. It was found that the process of formation of new neurons persists in the 8th decade of life; neurogenesis in the adult brain is limited to the dentate gyrus of the hippocampus and the olfactory bulb.

It is believed that while normal aging affects the Fronto-Striatal system, important for cognitive control and executive function, Alzheimer's Dementia has additional effects on the Tempo-ro-Parietal circuits, essential for episodic memory (A. Fjell, 2014).



Fronto-striatal vs. temporo-parietal networks

BIOCHEMICAL AND METABOLIC CHANGES:

- significant loss of receptors to which neurotransmitters bind
- reducing the activity of the cholinergic system (acetylcholine)
- decrease in the synthesis of dopamine and norepinephrine, decrease in hormones released by the pituitary gland (cortisol and sex hormones)
- reduction of noradrenaline compared to serotonin, which remains at a constant level, leads to noradrenergic depression and sleep disorders

The volume of gray matter decreases

The volume of gray matter begins to decrease after the age of 20. Atrophy is the most advanced in the prefrontal cortex, and age-related changes in the temporal lobes are more moderate and involve a decrease in hippocampal volume.

Neural size and synaptic density - Despite the many theories that explain neuronal loss, the decrease in gray matter volume in older adults is best explained not by the death of neurons, but by their size and the number of connections between them. Neurons undergo morphological changes, a decrease in the complexity of dendritic arborization, the length of dendrites and a decrease in dendritic extensions, the major sites for excitatory synapses. These morphological changes directly contribute to the reduction of synaptic density. The most important properties of the brain are the perception of information, its processing, storage and retrieval from memory, the prefrontal cortex being responsible for all these processes.

Problems related to the activity of the prefrontal cortex can be easily recognized but these signs are not specific, they can be caused by other diseases: attention problems, misinterpretations, inability to plan and implement the plan, disorganization.

The hippocampus is the brain structure that allows the learning and storage of information, having an important role in passing information from short-term memory to long-term memory, as well as in space navigation. Damage to the hippocampus leads to initial symptoms of memory loss and disorientation.

White matter

The volume of white matter decreases much more than the volume of gray matter with age (precentral gyrus, right gyrus, corpus callosum, parahippocampal gyrus). In addition to changes in the structure of white matter, a functional decline of the white matter has been observed in vivo by altering its integrity with age (Madden et al).

The integrity of the central nervous system is reflected in the performance of cognitive functions - each function referring to a different region of the brain. Impaired cognitive function occurs with age, but can be found in correlation with various diseases and situations (depression, delirium, traumatic brain injury, infection or substance abuse - alcohol, cocaine).

2.2 THE SPECIFIC AREAS OF COGNITION and examples of cognitive processes underlying these mechanisms

Social cognitions Response to emotion-induced stimuli	Identifying emotions Recognition of emotions in facial expressions	Emotional bias Biases in the processing of information regarding positive / negative stimuli
Executive functions Higher level thinking / complex reasoning and decision making	Mental flexibility Ability to adapt to behavioral ideational level	Planning and Problem solving
	Working memory Strategy	Response inhibition Ability to eliminate wrong / inappropriate answers
Memory Long or short term information storage	Episodic memory The ability to associate an event with a specific place and time	Working memory Short-term storage and handling of information
	Sensory memory Recognition of images, objects and visuospatial information	
Attention Ability to focus on one piece of information and ignore others (selective focus)	Sustained attention Ability to concentrate continuously	
Psychomotor speed Ability to detect and respond to the presence of a stimulus	Reaction time Reaction time to several stimuli, level of alertness	

Cognitive assessment is the objective measurement of distinct cognitive abilities, such as working memory, inhibition, cognitive flexibility, psychomotor speed, and sustained attention. Knowledge can be measured using a variety of methods, with different levels of objectivity and sensitivity.

Numerous age-related changes in cognitive skills are relevant to daily activities and have substantial social importance. For example, decreased cognitive abilities

increase the risk of older adults making mistakes in financial decisions and suffering financial fraud and abuse. Age-related changes in knowledge can affect the driving performance of vehicles, which have implications for public safety and health. Current research indicates that age-related changes in cognitive processes affect performance on technology-based tasks, such as searching the Internet for health information. Given the ubiquitous use of computers and the Internet for many routine interactions in business, public services, and social events, the natural, cognitive decline caused by aging has substantial implications for adults' ability to participate in many areas of life.


2.3 NATURAL AGING VS DEMENTIA

Decreased specific cognitive skills - processing speed, executive function and episodic memory are common experiences in the aging process, while verbal and comprehension skills are typically maintained. But it should also be noted that the three major signs of Alzheimer's dementia (AD) - episodic memory impairment, cerebral atrophy and amyloid protein accumulation - have also been identified among presumably healthy elderly. There is a relative pattern of cerebral atrophy in Alzheimer's dementia, through the initial involvement of specific pathways involving the entorinal cortex and hippocampus, later extending into the associative areas cortex.

The rate of cortical volumetric reduction is more than double in MCI (Mild Cognitive Impairment) than in healthy elderly, and in AD, the rate of atrophy is more than three times higher. Thus, we can consider that the location of cerebral atrophy, as well as its extent, can be used to differentiate normal aging from dementia (AD). The rate of cerebral atrophy in the hippocampus and entorinal cortex differentiates AD from normal, these Temporal areas being dominant in the risk pattern for AD, and for healthy elderly, the pattern is affecting the prefrontal cortex, especially the orbitofrontal wall.

The challenge of identifying the boundaries between cognitive changes associated with the natural aging of the brain and those associated with neurodegenerative dementias, including Alzheimer's disease, is a constant concern of the medical world.

It is quite difficult to identify the boundary between natural cognitive decline and the initial phase of a neurodegenerative disorder, but there is sufficient knowledge of natural cognitive decline to support the distinction of neurodegeneration. In the field of neurocognitive disorders, for example, mild cognitive impairment syndrome (MCI) is considered an intermediate phase of clinical diagnosis between the time when an individual's cognitive function falls within the normal range and when the person meets the criteria for dementia. Although consensus criteria have been established that are widely used, it remains a challenge to determine the boundary between natural cognitive aging and MCI.



Dementia is often accepted as part of the normal aging process, but just because people are aging, does not mean they will develop dementia.

The difference between normal cognitive decline and dementia

Clinical and personality changes in the elderly. Symptoms

Symptoms of normal cognitive decline include:

- the impossibility of remembering every detail of a conversation
- forgetting a friend's name
- difficulty finding the right words and realizing that memory can get worse
- decreases the ability to learn and retain new information
- decreases working memory and information processing speed
- 25-50% of the elderly over the age of 65 perceive a decline in memory and intellectual functioning
- the individual can become egocentric, conservative, apathetic, irritable
- difficulties in adaptation, acceptance of criticism, suspicion

Mild cognitive impairment

- represents a decline in cognitive functions of greater intensity than would be justified by the age and degree of education of the person, but without reaching the level of dementia
- occurs in 10-15% of the elderly population and may remain stationary or may progress to dementia
- there is an obvious cognitive impairment for those around, but the patient's activity is preserved
- memory, attention, language disorders appear, the patient's performance in psychological tests being diminished

Symptoms of dementia include:

- completely forgetting conversations
- forgetting the names of family members
- replacing incorrect words with sentences
- ignoring potential memory problems.

The symptoms of dementia negatively affect a person's daily life, diminishing their ability to live independently. In the case of normal aging of the brain, although they may have memory loss, these people may live alone and perform daily tasks. Age-related memory impairment and dementia can be differentiated in several ways.

Normal cognitive decline due to aging	Dementia
The person cannot remember the details of a conversation or event that took place a year ago	The person is unable to recall details of recent events or conversations
He can't remember the name of an acquaintance	He no longer recognizes or knows the names of family members
Forget things and events occasionally	Forget things or events more often
Occasionally he has difficulty finding words	Long breaks and frequent replacements finding the words
The person is worried about his memory, is se relatives are not	Close relatives are worried about the person's memory, but are not aware of any problems

Symptoms to follow:

- Frequent wanderings in familiar places;
- Repeated questions;
- Strange behaviors or inappropriate to the context;
- Forgetting recent events;
- Repeated falls or loss of balance;
- Personality changes;
- Decline in planning and organization;

- Changes in diet / eating habits;
- Hygiene changes;
- Increased apathy;
- Changes in language skills, including comprehension;

The progression of cognitive impairment observed in conditions such as Alzheimer's disease can be accelerated in a few years before diagnosis. Thus, it is important to perform regular medical checks to monitor the extent and severity of cognitive impairment. Independent living is not compromised during normal aging, unlike the transition to a neurodegenerative state.





3. RISK FACTORS IN MINOR COGNITIVE IMPAIRMENT AND DEMENTIA

In 2015, there were 47 million people with dementia, and it is estimated that this number will triple in 2050; Ten million new cases appear every year, according to WHO figures. By 2030, the cost of caring for the sick would exceed \$ 2,000 billion. Given that there is still no adequate treatment for dementia to cure or change the disease, as dementia is still a disease without treatment, it is welcome to intervene on the risk factors of cognitive decline, by reducing or eliminating them.

Alzheimer's disease is the most common type of dementia (60-70% of all cases of dementia) and affects about 27 million people. Typical clinical manifestations of this condition consist in the progressive loss of episodic memory and cognitive functions, deficiencies of language and visuospatial skills. Behavioral disorders are often associated: apathy, depression, aggression. The appearance of the disease has a huge impact on social and family life, but it also involves huge financial costs from society. It is estimated that about 50 million people worldwide have some form of dementia, but at this time, the exact causes of this multifaceted condition are still unknown; It is estimated that 70% of the risk of developing Alzheimer's disease is due to genetic causes. Prevention guide published

The WHO points to 12 lifestyle risk factors and provides advice on how to approach them. "In the next 30 years, the number of people with dementia is expected to triple. (...) We must do everything we can to reduce the risk of dementia. The scientific evidence gathered for these guidelines confirms what we have suspected for some time, that what is good for our heart is also good for our brains "point, at the launch of the guide, WHO Director-General, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Until an effective treatment for cognitive impairment and dementia is identified, risk reduction is a key strategy for reducing the number of patients with these conditions.

12 factors that lead to dementia


"Crucially, while age is the strongest known risk factor for cognitive impairment, dementia is not a natural or inevitable consequence of aging. Several recent studies have shown a relationship between the development of cognitive impairment and dementia with more lifestyle-related risk factors, "notes WHO experts in the new guidelines entitled" Reducing the risk of cognitive decline and dementia ". 12 possible risk factors for dementia are assessed and advice is given on how to approach each of them. These possible factors that favor the appearance of a form of dementia are: low levels of physical activity, smoking, a poor diet, alcohol abuse, insufficient or impaired cognitive reserve (the brain's ability to compensate for neural problems), lack of social activity, increased unhealthy weight, hypertension, diabetes, dyslipidemia (unhealthy cholesterol levels), depression and hearing loss.

"Dementia prevention is possible"


"The existence of potentially modifiable risk factors means that dementia prevention is possible through a public health approach, including the implementation of key interventions that delay or slow down cognitive decline or dementia," says the official WHO document.

It is considered as major risk factors for Alzheimer's disease and other dementias: age, family history (hereditary collateral antecedents) and genetic susceptibility (presence of Apolipoprotein E-Epsilon 4 alleles). None of these risk factors can currently be altered by a particular type of medical intervention or change in individual behavior. Associated, there are acquired risk factors that increase the risk of developing dementia, but that can be modified and influenced, thus reducing the risk of cognitive decline

3.1.MODIFIABLE ACQUIRED RISK FACTORS




Strength of evidence on risk factors for cognitive decline



3.1.1 Cardiovascular risk factors

Cardiovascular risk refers in principle to atherosclerosis processes that subsequently cause a deficient supply of oxygen and nutrients to the organs and tissues of the human body. In addition to the chronic, deteriorating over time, degenerative effect, the acceleration of the atherosclerotic process is also the platform on which acute cardiovascular, coronary and cerebral damage occurs (Acute Stroke). As a result, it is considered that medical interventions to limit it are essential, the configuration of a complete cardiovascular risk profile being of great importance and practical utility. The analysis in a complex and complete algorithm of this profile, and not the simple summation of specific pathologies, provides an adequate picture of the risk of acute stroke or coronary artery for a patient. This evaluation takes into account not only

diseases, but also other parameters related to the patient (age, sex, hereditary predisposition). The result is a conglomeration of diseases and characteristics of the patient whose identification allows a primary and secondary prophylaxis for cardiovascular diseases. Cardiovascular risk factors are neither etiological agents nor disease markers (they reveal the existence of the disease and not the risk of it occurring), cardiovascular risk factors are conditions that are associated with an increased risk of developing cardiovascular disease. Quantification of risk factors allows accurate assessment of the risk of cardiovascular disease




Classification of cardiovascular risk factors

There are several types of classification of cardiovascular risk factors:

A. Risk factors: modifiable or unchangeable

Unchangeable: age, sex, family history of early-onset cardiovascular disease (presence of atherosclerotic manifestations in first-degree relatives under the age of 65 for women and under 55 for male relatives).

Modifiable: smoking, alcohol, obesity, dyslipidemia, hypertension, diabetes



B. Risk factors: causal (major) / conditional / predisposing / atheromatous load of vascular walls / random

- **Major:** high prevalence in the population, with a proven high and independent association with the evolution towards stroke or coronary heart disease, their correction being certainly effective in reducing cardiovascular risk (smoking, hypertension, serum LDL, HDL, triglycerides, diabetes, metabolic syndrome);
- **Conditional:** limited prevalence, causal role not fully proven (elevated serum lipoprotein level and small LDL particles, hyperhomocysteinemia, fibrinogen, plasminogen activator inhibitor);
- **Predisposing:** not causally related to the risk of cardiovascular disease, but which increase the likelihood of the person developing a certain cardiovascular pathology during life (obesity, sedentary lifestyle, family history, male sex, alcoholism, age over 45, mental stress elongated, certain personality traits, increased insulin resistance, socioeconomic status, ethnic characteristics);
- **Atheromatous load of the vascular walls:** the risk of developing cardiovascular diseases that derive as complications of atheromatous arterial plaque can be estimated by knowing the severity of atherosclerotic lesions (eg, resting electrocardiogram, exercise electrocardiographic testing, echocardiography, coronary computerized electron beam corona);
- **Random:** acts accidentally, limited in time, but can significantly increase the risk of cardiovascular disease (eg, acute physical or mental stress, cardiotoxic medication, contraceptives - prothrombotic effect, antiarrhythmics - proarrhythmic effect, cardiovascular interventional therapies).

C. Classic or new risk factors

- **Classics:** smoking, alcohol, obesity, dyslipidemia, hypertension, diabetes;
- **New:** homocysteine and homozygous deficiency of some enzymes in its metabolism, lipoprotein (a), proinflammatory factors, prothrombotic, sleep apnea syndrome.


Other pathologies that increase cardiovascular risk

- **Influenza** - increases the risk of cardiovascular events, so it is recommended annual vaccination of those known to have cardiovascular disease.
- **Chronic kidney disease** - microalbuminuria increases the risk of cardiovascular disease 2-4 times, and the risk increases up to 50 times in chronic kidney disease stage 5 (with lower glomerular filtration rate 15 ml / min / 1.73 m²).
- **Obstructive sleep apnea** - is associated with an increase in cardiovascular morbidity and mortality of 70%.
- **Erectile dysfunction, autoimmune diseases** (psoriasis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis) are diseases that increase cardiovascular risk.

Diagnosis of cardiovascular risk factors

Cardiovascular risk factors represent the risk of developing cardiovascular diseases potentiating the pathophysiogenic links of atherosclerosis by inducing an accelerated degeneration of the arterial wall, with the risk of complicating it by rupture, fissure, thrombosis and subsequent, stroke and coronary stroke.

The **SCORE grid** estimates the 10-year risk for a fatal event due to atherosclerosis (heart attack, stroke, aortic aneurysm), based on the following risk factors: age, sex, smoking, blood pressure and total cholesterol. A calculated risk of 5% or more requires lifestyle intervention and drug treatment.





The SCORE diagram: risk of fatal CVD at 10 years, for populations at high risk of CVD, depending on the following risk factors: age, sex, smoking, systolic blood pressure and total cholesterol. The European Society of Cardiology

Very high risk (SCORE $\geq 10\%$):

- subjects with cardiovascular disease documented by invasive or non-invasive tests;
- type 1 or 2 diabetes with one or more risk factors and/or damage to target organs (microalbuminuria 30 - 300 mg/24 hours);
- severe chronic kidney disease (glomerular filtration rate <30 ml/min/1.73 m²);

High risk (SCORE between 5 and 10%):

- the presence of a risk factor such as severe hypertension or familial dyslipidemia;
- type 1 or 2 diabetes, but without affecting the target organs;
- chronic kidney disease with glomerular filtration rate 30 - 59 ml/min/1.73 m²;

Moderate risk - patients with SCORE 1 - 5%

Low risk - patients with SCORE $<1\%$.

This system allows the configuration of a profile that can know in evolution, either improvements or aggravations, being thus useful both in diagnosis and for monitoring the patient's evolution. The SCORE diagram can be a valuable working tool useful in motivating patients, possibly by projecting current, potential or future risks in order to increase their compliance with medical recommendations for the correction of cardiovascular risk factors.

Diabetes mellitus

Recent studies have shown a decline in cognitive performance and an increased risk of developing dementia in people with diabetes; moreover, patients with minor cognitive decline and diabetes have a higher risk of progressing to dementia compared to those with MCI without diabetes.

Correlations between diabetes and cognitive decline:

One of the mechanisms by which diabetes influences cognitive function is hyperglycemia and glycation end products, which can damage vascular tissue and endothelial function, increase free radicals, inflammatory responses and amyloid deposition. Chronic hyperglycemia can affect cerebral blood flow, neurotransmitter functions, or nutrient transport to the brain. In addition, diabetes could influence cognitive function by triggering cardiovascular events and strokes. Repeated hypoglycemic events, metabolic and vascular impairments may influence long-term cognitive function. Diabetes may also be a marker of other factors, such as insulin resistance and hypertension, or it may be a genetic susceptibility to Alzheimer's disease. In the de-terminism of cognitive decline, five major intersecting pathways are considered:

- **aging** (chronic age-related diseases)
- **metabolic pathway** - hyperglycemia and advanced glycation end products
 - interaction with AGE/RAGE receptors



-hyperinsulinemia and insulin resistance

- **oxidative and nitrosative stress** (reactive Oxygen and Nitrogen species)
- **inflammation** (peripheral macrophages and central cerebral microglia)
- **vascular pathway** (accelerated macrovascular atherosclerosis, vascular stiffening, and at the microvascular level, re-modeling of neurovascular and neuroglial units; all these changes result in impaired cerebral blood flow)

Peripheral insulin resistance and glucotoxicity of hyperglycaemia play an important role in the development of cerebral insulin resistance. Omental visceral obesity induces the excessive production of toxic free fatty acids, and hyperglycemia induces end products of advanced glycation (AGE), thus causing the permeabilization of the Blood-Brain Barrier; this is followed by inflammation of the cerebral neuroglia (astrocytes and microglia), with the production of toxic chemokines and cytokines, inducing cerebral resistance to insulin and stress in the endoplasmic reticulum, with synaptic dysfunction or synaptic loss, neuronal dysfunction and neurodegeneration. Regardless of the mechanisms, several prospective studies have been conducted in recent years that have found a correlation between diabetes and cognitive decline or dementia. There was a significant association between diabetes and the rate of cognitive decline, with a risk of more than 60% for cognitive decline among people with diabetes compared to people without diabetes. Associations have been observed in several cognitive areas, such as attention, concentration, memory, visual-spatial orientation, and psychomotor speed. Studies have also shown that diabetes is a 50% higher risk for dementia and Alzheimer's disease, and for vascular dementia, the risk is double.

Obesity in middle age

Also, the close relationship between obesity at age II and the increased risk of cognitive decline and dementia was highlighted, a relationship that can change with age. People who are overweight have an increased risk of developing diseases such as diabetes and high blood pressure. Increased body weight contributes to increased cardiovascular risk by increasing insulin resistance, increasing blood pressure, increasing systemic inflammatory process and prothrombotic status. These obesity-related diseases cause cardiovascular disease, which results in impaired memory and dementia. Studies show that low-fat diets reduce the risk of developing Alzheimer's disease.

High blood pressure

High blood pressure is one of the most important modifiable risk factors for cerebrovascular disease, affecting more than a third of the population and which, along with other risk factors, participates in the development of atherosclerotic disease, it is well known that hypertension is a major risk factor for stroke and myocardial infarction.

"Elevated blood pressure most likely leads to dementia due to a series of small 'silent' strokes that occur over time" (Dr. Harkin). Any blood pressure above normal (120/80 mm Hg) increases the risk of stroke. In addition, high blood pressure is considered by many doctors to be the "number one public enemy" in terms of the cause

of brain damage that can lead to dementia. In this regard, a study SPRINT-MIND (Systolic pressure intervention trial) conducted in the United States, argues for the role of hypertension in the pathogenesis of dementia, and a rigorous control of blood pressure can prevent or improve the symptoms of patients affected or in the area. of risk.

The complications of this disease are determined by the effects that high blood pressure values have on the vascular level, hypertension being an important risk factor for cardiovascular and cerebrovascular diseases and by the fact that it participates in the development of atherosclerosis - degenerative disease, which affects diffuse large muscular and elastic arteries and characterized by the presence of atheroma plaques formed from lipids, inflammatory cells, connective tissue, extracellular components such as matrix, enzymes and calcium deposits. In addition to atherosclerosis, hypertension causes other changes in the structure of the vascular wall: endothelial dysfunction, lipohyalinosis, increased stiffness of the arterial wall, but also adaptive changes in the cerebral vessels, such as hypertrophic or eutrophic remodeling.

Small cerebral vessel disease is a spectrum of pathological processes that affect small cerebral vessels such as small arteries, arterioles, capillaries, small veins and venules, but this term is usually used for the arterial component of the circulation. to describe lesions in the cerebral parenchyma secondary to abnormalities of the small cerebral vessels. The term SCVD refers to a syndrome whose clinical neurological, neuropsychological, imaging and neuropathological manifestations are caused by disorders that occur in the small cerebral vessels, SCVD mainly affecting the vessels of the basal ganglia and the white periventricular substance, leptomeningeal arteries, vascularization of the thalamus, the cerebellar white matter and the brainstem, usually the cortices are not affected. High blood pressure is the most common risk factor for all types of lesions in the brain parenchyma in SCVD.

The SCVD describes a series of imaging changes in the white matter and the subcortical gray matter: small subcortical infarction, gaps, white matter hyperintensities, microcerebral hemorrhages, dilated perivascular spaces and cerebral atrophy.

Small vessel disease present in patients with MCI is associated with executive dysfunction, decreased processing speed, and memory impairment. It is assumed that SCVD causes cognitive impairment by disruption of frontal cortico-striated circuits secondary to the presence of gaps and hyperintensities in the white matter level, the consequence of all these changes being the alteration of frontal lobe function. Using functional MRI at rest and tractography it has been shown that there is a close link between cognitive impairment, the structural integrity of the white matter and the functionality of neural networks.

Aggressive antihypertensive therapy, which targets a systolic blood pressure below 120 mmHg (current recommendations are to reduce it below 130–140 mmHg), has been shown to be able to reduce the risk of mild cognitive impairment (MCI) by 19%. Also, by strict control of hypertension, the frequency of lesions in the cerebral white matter was reduced. It was found that all forms of dementia, including



Alzheimer's, were reduced by 17% in patients who could be brought to systolic blood pressure levels below 120 mmHg, compared with patients whose systolic blood pressure persisted at higher values. big.

In the group of patients at risk for Alzheimer's dementia or with clinical forms of predementation, those who could be effectively treated with antihypertensive medication and had the desired reduction in systolic pressure (below 120 mm Hg), maintained consistently for more than three years, have shown a 17% reduction in the incidence or progression of the disease, greater than that ever achieved with any antiamyloid medication.

The beneficial effects of blood pressure control have long been confirmed in the incidence, complications and mortality of cardiovascular, renal and ocular diseases, but the SPRINT study is the first to highlight a direct link between hypertension and dementia and is the first study to report an effective reduction in the risk of progression in all forms of dementia through antihypertensive therapy. Early detection of hypertension-induced brain damage could lead to therapeutic interventions to lower blood pressure in these patients, either through medication or lifestyle changes (smoking cessation, more physical activity, proper diet).

Hyperlipidemia

Systematic analyzes have identified the link between hypercholesterolemia and dementia, noting that statins used to maintain serum cholesterol levels within normal limits may have a protective role against cognitive decline. Statins are considered as first-line therapeutic agents for hypercholesterolemia in the primary and secondary prevention of cerebrovascular disease, reducing the risk for them by reducing atherosclerosis and improving cerebral perfusion.


Hypercholesterolemia is considered to be an important factor in oxidative stress, a condition of an imbalance between the production of oxygen free radicals and their removal by antioxidant and micronutrient enzymes; if the production of free radicals exceeds that which can be controlled by antioxidants, irreversible damage to proteins, lipids and DNA occurs. Evidence for protein oxidation and nitration, with the formation of carbonyl and 3-nitrosyrosine groups, is common in plasma in both patients with hypercholesterolemia and those with dementia. Similarly, oxidized lipid free radicals (eg, isoprostanes, lipid hydroperoxides) are more prevalent in the plasma of patients with AD than healthy controls. The involvement of systemic oxidation of lipids / proteins has been demonstrated as a characteristic found in AD and hypercholesterolemia. The beneficial effects of statins against brain and cardiovascular diseases have been attributed both to lowering cholesterol and, above all, to eliminating oxidized LDL.

Lifestyle

Smoking

There is strong evidence that regular smoking increases the risk of dementia, virtually doubling the risk of developing dementia in old age. It is considered that the

simple cessation of smoking restores the risk of developing dementia at a level comparable to that of non-smokers. Smoking automatically means disease, accelerated atherosclerosis being a definite process proven epidemiologically, clinically, but also experimentally. Quitting smoking reduces the risk of dying from an acute myocardial infarction or stroke.



Smoking induces the generation of free radicals, increases oxidative stress, exerts proinflammatory action, and can promote the appearance of cerebrovascular diseases.

According to the World Health Organization (WHO), smoking tobacco is a significant risk factor for the development of dementia, by affecting memory, concentration and learning ability. Thus, in 2014, the WHO issued a document highlighting the link between tobacco smoking and dementia. It is estimated that "14% of Alzheimer's cases worldwide are potentially attributed to smoking". It is believed that there is a relationship between how much a person smokes and the risk of dementia, atrophy of the cortex with age, being accelerated by smoking.

The health risks of smoking tobacco are many and well established - smoking is strongly linked to cancer, heart disease, COPD, emphysema, but also to brain health. Extensive studies that have investigated the link between smoking and dementia have shown that heavy smokers - those who smoke approx. 40 cigarettes a day - has an increased risk of Alzheimer's disease or "vascular" dementia - two common forms of dementia, a growing condition that is a heavy burden for both families and families. for the health system. For those who smoke two packs of cigarettes a day in middle age, the risk of developing Alzheimer's disease in old age is more than double that of non-smokers, and the risk of developing vascular dementia increases by 172%.

Smoking damages the vascular system, affecting blood pressure and blood clotting through the platelet pro-aggregating effect of nicotine, increasing the risk of stroke and therefore the risk of vascular dementia (VaD). However, many studies have concluded that smoking may influence the risk of VaD independently of stroke status and therefore may have an effect beyond cerebrovascular disease. In addition, studies that have shown a direct impact of smoking on Alzheimer's dementia (AD) suggest that



smoking may in fact influence neurodegeneration by inducing oxidative stress and inflammation, both of which are key mechanisms in the pathogenesis of AD. However, it is also biologically plausible that smoking could protect against cognitive decline and AD, as nicotine can increase acetylcholine release and increase nicotine receptor density as well, thus improving attention and processing. information. AD is known to be characterized by deficiencies in the cholinergic system that can be delayed by tobacco use. There are studies that have shown that nicotine can increase concentration and attention, but not only nicotine is found in cigarettes. Cigarettes contain about 4,000 chemicals, of which 50 are recognized as toxic (eg carbon monoxide, butane, methanol).). In the long run, smoking affects working memory and learning ability.

It was found that in the case of those who quit smoking in middle age, the risk of dementia, 20 years later, does not differ from that of people who have never smoked.

In the case of age-related cognitive decline (if older adults experience a gradual decline in thinking and memory but are still able to function well), smoking has been linked to a faster decline in memory capacity and executive operation.

Second-hand smoke risk

Secondary smoke, also called secondhand smoke, environmental tobacco smoke or involuntary smoking, has been associated with the same general health risk factors - heart health, lung function and cancer, but also with a risk increased dementia. Exposure to smoke at home, at work and elsewhere was associated with an increased risk of dementia, and exposure in all three places was associated with the highest risk.

Alcohol

It is considered that low or moderate alcohol consumption by the elderly reduces the risk of cognitive decline and dementia, but not excessive alcohol consumption. Moderate alcohol consumption (10-30 g / day) reduces cardiovascular mortality. Red wine is a cardiovascular protector due to its content in polyphenols with vasodilatory, antithrombotic and antioxidant effects.

Alcohol has a depressing effect on the central nervous system, causing a reduction in neural activity. It also has an anxiolytic, antidepressant, relaxing and sedative effect, being used by many people who face anxiety, depression or insomnia. At the level of the brain it acts on the centers of pleasure mediated by dopamine. The amount from which the risk of alcohol problems increases is:

- in men 14 drinks / week or 4 drinks / day
- in women 7 drinks / week or 3 drinks / day

A standard drink (or “drink”) is defined as 12 g of pure alcohol and is equivalent to 330 ml of beer or 150 ml of wine or 30 ml of spirits (vodka, whiskey).

Diet

The role of a diet rich in vitamins and nutrients is difficult to assess, due to interference with many other lifestyle factors, however a dietary pattern can be represented by the Mediterranean diet based on fish, fruits, vegetables, olive oil, nuts, whole grains, which reduces the risk of cognitive and mental decline.



However, there are also fats that are good for brain health (a diet rich in olive oil with a protective effect against cognitive decline associated with aging). Vitamin C and A, having an antioxidant effect, can also protect the brain. The relatively high antioxidant capacity of some fruits and vegetables has been proven: blueberries, strawberries, tomatoes, broccoli.

Physical and mental activity

Regular exercise, walking, can have protective effects against cognitive decline. Regular participation in physical activity or aerobic exercise is associated with decreased cardiovascular mortality in healthy divisions, in subjects with coronary risk factors and in patients with known cardiovascular disease. Performing 2.5 - 5 hours per week of moderate physical activity or 1 - 2.5 hours per week of intense activity is class I recommendation in cardiological guidelines. The combination of excessive caloric intake and lack of physical activity is a risk factor for metabolic syndrome. Physical activity maintains or even reduces body weight, alters the lipid profile by increasing HDL-cholesterol and lowering triglycerides, increasing insulin sensitivity and lowering blood pressure. The beneficial effects of physical activity (gymnastics, running, cycling, walking, swimming) are as follows: increases mental tone and quality of life, improves cardiovascular risk factors, is an adjunct to weight loss diet, relieves hypertension mild and moderate blood pressure, improves lipid profile (lowers triglycerides and LDL-cholesterol, but increases HDL-cholesterol). Physical activity reduces the risk of dementia by 45%. The protective effects are achieved through various mechanisms: reduction of BP, prevention of obesity, decrease of proinflammatory activity, improvement of lipid profile and endothelial function, improvement of cerebral blood flow and, secondarily, oxygenation of brain areas important for cognitive functions. Physical activity can also prevent Alzheimer's dementia by increasing neurotrophic factors (BDNF-Brain Derived Neurotrophic Factor), IGF-1 (Insulin-Like Growth Factor), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), stimulates neurogenesis, synaptogenesis and neuroplasticity; reduces free radicals in the hippocampus, increases superoxidismutase and eNOS (endothelial nitric oxide synthase). Studies have also shown that physical activity increases hippocampal volume and serum BDNF in the elderly.

The risk of developing Alzheimer's disease is lower among intellectually active people. People who are accustomed to reading and performing stimulating activities for the intellect or related to the learning process, maintain their mnemonic function better and for a longer time.



3.2. MAJOR RISK FACTORS MODIFYING AND NON-MODIFYING ALZHEIMER'S DISEASE

Alzheimer's disease is the most common form of predominantly neurodegenerative dementia, as it causes the progressive and irreversible loss of mental function, which is associated with cognitive decline and which remains one of the current major public health problems. Alzheimer's disease is currently the leading cause of dementia in the elderly; In general, it is diagnosed after the age of 65, with about 10% of the population being affected, the first signs of the disease often being confused with normal aspects of the aging process of the brain or with other neurological conditions such as vascular dementia. Alzheimer's dementia is the most common type of dementia (60-70% of all cases of dementia) and affects about 27 million people. Typical clinical manifestations of this condition are the progressive loss of episodic memory and cognitive function, deficiencies of language and visuospatial skills. Behavioral disorders are also frequently associated: apathy, depression, aggression. The appearance of the disease has a huge impact on social and family life, but it also involves huge financial costs from society.

From an anatomopathological point of view, two types of lesion pattern are characteristic: extracellular lesions-senile plaques, containing a β -amyloid nucleus (A β 42) and intraneuronal lesions-neurofibrillary tangles composed of phosphorylated Tau protein (P-tau).

The etiology of Alzheimer's disease is multifactorial, with the involvement of various mechanisms of disease onset and progression, being a dementia with complex pathogenesis. The most important risk factor for Alzheimer's disease is aging or, so to speak, if new methods of preventing Alzheimer's disease do not appear, the number of people with this disease will increase in proportion to the size of the elderly population.

3.2.1 Genetic factors have a special value in Alzheimer's disease given the molecular genetics studies that have shown the existence of mutations in members of families with Alzheimer's disease in which the presence of an autosomal dominant pattern has been demonstrated. Genetic testing is currently used to make a differential diagnosis of various forms of dementia; Four genes related to the onset and development of Alzheimer's disease are known:

- amyloid precursor gene;
- presenilin 1;
- presenilin 2;
- apolipoprotein E, variant 4.

The amyloid precursor protein, presenilins PS 1 and PS 2 cause Alzheimer's disease, while the presence of apolipoprotein E may be considered a possible risk. predictive of Alzheimer's disease with an accuracy of 95-100%. The mutations present in the amyloid precursor protein and niline presses PS 1 and PS 2 are considered to determine the



familial form with early onset of Alzheimer's disease, involving cases of disease in people under the age of 65, being transmitted from affected parents. This type of autosomal dominant pattern is a rare form of Alzheimer's disease, with early onset and familial transmission, being genetically heterogeneous. It involves the existence of at least three genes:

1. Amyloid precursor protein gene

2. The PS 1 and PS 2 presenilin gene, which acts on three separate chromosomes:

- 21 for amyloid precursor protein;
- 14 for presenilin 1;
- chromosome 1 for presenilin 2.

3. Apolipoprotein E is associated with almost all forms of Alzheimer's disease, but its presence cannot confirm or rule out the existence or risk of developing Alzheimer's disease. The presence of apolipoprotein E has been shown in other forms of dementia such as vascular dementia, Lewy corpuscle dementia and frontotemporal dementia.

β -Amyloid precursor protein (APP) is a type I transmembrane protein that plays a central role in the pathogenesis of the disease. Sequential cleavage of APP by β and secretase generates β -amyloid ($A\beta$), which is stored in the brains of affected patients in the form of senile plaques, representing one of the main pathological signs.

Secretase is a proteolytic complex that cleaves the trans-membrane domain of APP until it is low enough to cause the release of $A\beta$ from the membrane. Peptides generated by secretase cleavage differ in their carboxy-terminal end. The major element is $A\beta$ 40, while $A\beta$ 38 and $A\beta$ 42 represent the minor categories. $A\beta$ 42, a neurotoxic peptide and predisposed to aggregation, is considered to be the causative agent of the onset of the cascade of pathogenic manifestations, which ends neuronal death, synapse destruction, formation of neurofibrillary tangles and senile plaques, and finally neurodegeneration and dementia. The increase in $A\beta$ 42 production underlies the mutations associated with familial Alzheimer's disease that manifest with early onset. Most mutations were found in presenilin 1, which encodes the catalytic subunit of secretase, while only a few mutations were found in presenilin 2.

It has been found that people with Down syndrome may develop distinctive neuropathological signs of Alzheimer's disease after the age of 40, and 50% show clinical signs of cognitive decline. The association between Alzheimer's disease and Down syndrome is due to overexpression of the APP gene on chromosome 21 encoding the amyloid precursor protein. Accumulation of amyloid begins in these patients in the first decade of life.

The fourth gene involved in the transmission of Alzheimer's disease is apolipoprotein E. Forms of Alzheimer's disease, ie forms of disease with early onset, with sporadic late onset, as well as forms with late onset, and environmental factors on the other hand. There is an associative correlation between apolipoprotein E and Alzheimer's disease, but the possibility of correlating apolipoprotein E with other age-dependent neurodegenerative processes is not excluded. Apolipoprotein E is one of the



genes involved in this complex process, being located on chromosome 19, there are three isoforms of the protein E 2, E 3 and E 4 and which are encoded by three different alleles –2, 3 and 4. Carriers of the 4 allele of the apolipoprotein E gene have the highest risk of developing Alzheimer's disease. Homozygotes for the 4 allele of the apolipoprotein E gene develop Alzheimer's disease at a younger age than heterozygotes. Apolipoprotein E genotyping is neither specific nor sensitive and may play an adjuvant role in the diagnosis of Alzheimer's disease in people with clinical manifestations, and for asymptomatic people the role is minor. The presence of the 4 allele is neither necessary nor sufficient to develop Alzheimer's disease. It has been suggested that 50-60% of cases of Alzheimer's disease are caused by several factors; changes in chromosomes 1, 9, 10, 12 and 13 have been reported in cases of late onset disease. Research to date has supported the idea that late-onset Alzheimer's disease is a complex form involving several genes. There are so far three forms of the disease in those families in which the manifestations of the disease appeared early, caused by mutations in one of three genes:

- **Alzheimer's disease subtype 1 (FAD 1)** represents 10-15% of cases and is determined by the mutation of the amyloid precursor gene, which encodes β -amyloid A4.
- **Alzheimer's disease subtype 3 (FAD3)** represents 30-70% of cases with early onset and is caused by the PSEN1 mutation encoding presenilin 1.
- **Alzheimer's disease subtype 4 (FAD4)** accounts for less than 5% of all early-onset forms and is caused by mutations in the presenilin 2 gene. for first-degree relatives. This condition is diagnosed in families with more than one person with Alzheimer's disease, in whom the age of onset is consistently less than 60-65 years, and most often occurs before the age of 55. for years.
- In terms of the age of onset of the first symptoms, Alzheimer's Dementia can be classified into:
 - form with early onset (4-6% of all cases), at ages <65 years
 - form with late onset, at ages > 65 years
- It is estimated that 70% of the risk of developing Alzheimer's Dementia is attributed to genetic factors. The early-onset form is due to mutations in the APP, PSEN1 and PSEN2 genes (amyloid precursor protein, presenilin 1 and presenilin 2), and the late-onset form is mainly associated with a polymorphism of the APOE gene (apolipoprotein E genes), especially with the presence of $\epsilon 4$ alleles.

3.2.2 Acquired Risk Factors in Alzheimer's Dementia

Of these, the most important are: cerebrovascular disease, diabetes, high blood pressure, obesity and dyslipidemia.

Cerebrovascular disease and Alzheimer's dementia have common risk factors, sometimes overlapping. Cerebrovascular changes (cortical cerebral infarctions, vasculopathies-especially, small vessel disease (arteriosclerosis), hemorrhagic transformed infarcts, ischemic demyelination of white periventricular substance, amyloid angiopathy, atrophy) increase the risk of cognitive decline. Studies have shown the presence of cerebrovascular damage in up to 47% of people diagnosed with dementia, leading to the assumption of a potential role of homeostatic mechanisms in the pathogenesis of Alzheimer's dementia. Taking into account the "double-stroke" theory of Alzheimer's disease, the "first stroke" vascular risk factors lead to dysfunction of the blood-brain barrier and, secondarily, to the reduction of cerebral blood flow; thus, neuronal damage occurs in both non-amyloidogenic and amyloidogenic ways. First, BHE dysfunction causes oligemia, hypoxia and the accumulation of neurotoxic molecules, an event associated with the appearance of micro-injuries, multiple microinfarcts. Amyloidogenic pathway, vascular distress increases APP expression and A β peptide synthesis, respectively. Accumulation of amyloid in the brain ("second stroke") amplifies neuronal dysfunction and neurodegenerative processes; both the accumulation of A β peptides and cerebral hypoperfusion lead to hyperphosphorylation of your protein and the appearance of NGF (Neurofibrillary tangles).

High blood pressure

Studies have shown that hypertension increases the risk of developing Alzheimer's Dementia, especially when it is present in middle age, through changes in the structure of vascular walls, causing hypoperfusion, hypoxia, cerebral ischemia, accumulation of APP and A β ; In parallel, it stimulates the expression of Presenilin which is involved in the synthesis of A β . High blood pressure can also disrupt the blood-brain barrier, an event associated with the genesis of Alzheimer's dementia.

Type 2 diabetes

Epidemiological studies have shown a clear association between type 2 diabetes and an increased risk of developing AD, with the mechanisms in question being insulin resistance, insulin deficiency, insulin receptor dysfunction, hyperglycemia toxicity, advanced glycation end products, vascular inflammation, ; Advanced glycation end products (AGEs) are thought to induce neuronal apoptosis by activating cell death pathways in parallel with stimulating APP processing by increasing the expression of β and γ -secretase complexes.

Obesity

The role of obesity as a risk factor for AD is still uncertain, the results of the studies being inconclusive and contradictory. Thus, it is considered that obesity in middle age may be associated with an increased risk of AD, while obesity in old age is inversely correlated with a low risk of developing dementia; for these ages it is considered risky, underweight, this usually preceding dementia by about 10 years.



Dyslipidemia

Elevated cholesterol is a risk factor for the development of atherosclerosis, dementia, and other neurodegenerative diseases. Studies have shown that hypercholesterolemia compromises the integrity of the blood-brain barrier; hypercholesterolemia is also associated with increased A β peptide deposits, increased NFT formation, neuroinflammation, cerebral microhemorrhages, cholinergic neuron dysfunction, and, secondarily, cognitive decline. By comparison, those who use statins have a lower risk of AD or a decreased progression of cognitive decline.

Stress

Stress activates the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, thus inducing increased cortisol production which causes increased A β peptide deposition in certain regions of the brain, especially in the hypothalamus and prefrontal cortex, and prolonged stress causes the accumulation of protein phosphorus. and neurodegeneration. Studies have shown elevated cortisol levels in patients with Alzheimer's dementia compared to healthy subjects, identifying significant correlations between high cortisol levels and rapid disease progression, altered MMSE score and decreased hippocampal volume. Hippocampal atrophy is thought to have a disinhibitory effect on the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, with secondary increase in cortisol levels.

Depression

Depression in young adults is an important risk factor for the development of dementia in old age. Significant associations were found between major depression in middle age, hippocampal atrophy, increased cortisol levels and amyloid β deposits in the brain (observed by PET). It is thought that depression in adulthood may be a signal for cognitive decline or early onset of dementia. More than 25% of people over the age of 65 have cognitive and depressive disorders. It is also estimated that there are clinical and neurocognitive similarities in depression and early-onset dementia.

Depression in old age, one of the most common nosological entities, is often underdiagnosed and undertreated. Early diagnosis and prevention are particularly important, given the tripling of the number of elderly people to 1.9 billion in 2050. Increasing life expectancy to 82 years in developed countries will increase the number of elderly people over 85 years of age. years and secondarily, the number of patients diagnosed with mood disorders. Thus, depression in old age will be one of the most expensive conditions, due to the increased risk of suicide, somatic comorbidities, decreased daily functionality and quality of life of both the patient and the family.

According to the Alzheimer's Association, about 40% of people with Alzheimer's disease also have depression. According to a large study published in the Archives of General Psychiatry in 2012, it was found that dementia is more common among people who have suffered from depression in adulthood or old age. It has been found that the age of onset of depression can determine the type of dementia: people who develop depression later in life have a double risk of Alzheimer's onset, while

people who develop recurrent depression in adulthood have an increased risk of developing he had vascular dementia.

Depression in old age is currently considered a distinct clinical entity, the clinical picture of depression having many different aspects compared to the clinical picture of depression in young people. The prevalence of depression is on average 20%.

Other emotional disorders that occur frequently in the evolution of patients with depression are: anxiety, aggression, irritability, in 85% of cases. The incidence of depression increases in patients with a history of stroke, 60% of them have a depressive episode in the first 2 years, and the percentage increases later. Depression is also a risk factor for patients with acute myocardial infarction (Frasure-Smith, 1996; Glassman and Chapiro, 1998).

Sleep disorders

Sleep disorders have a two-way relationship with Alzheimer's dementia: they occur during the early stages of dementia and tend to worsen with its evolution, and on the other hand sleep disorders increase the risk of developing dementia and aggravate it. People with insomnia are thought to be at increased risk for Alzheimer's disease, but not for vascular dementia or other causes; Also, people with sleep apnea are at increased risk of developing any type of dementia, including Alzheimer's and vascular.


It is believed that sleep disorders may precede the onset of cognitive symptoms and there is a strong link between sleep disruption and the development of AD. Disorders of sleep and circadian rhythm are common (25-60%) and disabling in patients with AD; the most common complaints are: insomnia, sleep fragmentation and excessive daytime sleepiness.

Sleep is essential for the normal functioning of memory and its consolidation. Declared memories (memory for conscious events) are enhanced by NonREM (or slow-wave) sleep, while non-declarative memories (learned skills/habits, procedural memories) are enhanced by REM sleep. Poor sleep quality and lack of sleep cause deficits in synaptic plasticity and memory processes, negatively affecting memory and cognition.

Polysomnography in AD reveals the reduction of slow sleep waves, the reduction of the REM phase, the prolongation of the REM latency, the increase of sleep fragmentation. Wake-up EEG highlights the disorganization of the fast rhythm and the predominance of slow waves.

An early feature of AD pathogenesis is degeneration locus coeruleus, the main source of epinephrine cloud to the cortex and a critical region for maintaining normal wakefulness. Deficiencies of the awakening-promoting molecule-Orexin (Hypocretin), which is involved in narcolepsy, have also been identified; Orexin CSF levels are significantly correlated with CSF levels of A β 42, your tau and phosphorylated protein, in patients with AD.

Sleep disturbances in patients with AD negatively affect not only cognition, but also exacerbate their neurobehavioral disorders, there is a close relationship between sleep-cognition-neuropsychiatric disorders.



4. MINOR COGNITIVE DECLINE - MILD COGNITIVE IMPAIRMENT

MCI is a clinical syndrome placed in an intermediate position on the scale of a cognitive amount, between normal aging and dementia as reference points that, in recent years, has particularly attracted the attention of researchers; it is more a subclinical pathological entity characterized by mild, minor cognitive disorders that do not significantly impede the social or professional functionality of the individual. Minor “soft” cognitive disorders are frequently encountered in the elderly, being considered as an intrinsic feature of the aging process, they gain clinical significance due to the difficulties encountered in carrying out routine activities encountered by patients. Cognitive decline, physiological in the elderly, occurs in exacerbated form and in many clinical conditions, mainly in dementia and, in general, in all brain injuries of various causes (vascular, infectious, traumatic, tumor, etc.). It is characterized by decreased short-term memory, delayed access to stored data, loss of sustained attention, executive functions and motor skills, latency in problem solving, decreased performance (Peterson 1992, Rapp & Heindel, 1994).

Cognitive function comprises six major areas:

- **attention** (concentrated attention, distributive attention, attention stability, processing speed);
- **learning and memory** (learning ability, working memory, immediate / delayed reproduction, simple / with clues);
- **language** (verbal processing / comprehension, verbal fluency);
- **visual-spatial function** (visuospatial perception and processing);
- **executive function** (planning, decision making, working memory, cognitive flexibility, cognitive inhibition);
- **psychomotor** (praxis - performing practical tasks).

After Wisocki 1991, abstraction, conceptual flexibility, mental arithmetic, speed of information processing, accuracy and quality of information, temporal orientation are added, and after Sava 2020, **social cognitions** are added - behavior according to acceptable social pattern, changes in personality, inhibition, empathy.

For the diagnosis of MCI, only one of these areas needs to be affected, while for the diagnosis of dementia, several areas need to be affected. Minor cognitive decline and mild dementia are common problems of the elderly, the main distinctions between them being the number of cognitive areas affected, as well as substantial interference with daily life.

4.1 MCI CLASSIFICATION

Three subtypes of MCI are described:

- Amnesic MCI (with very probable evolution towards Alzheimer's Dementia)



- MCI with several slightly affected cognitive domains
 - MCI with only one cognitive domain affected, other than memory
- There is another systematization of MCI that differentiates four subgroups:
- MCI single and multiple-domain amnesic
 - Single and multiple-domain nonamnesic MCI

All studies revealed the link between amnesic MCI and Alzheimer's Dementia; also, it is considered that single-domain nonamnesic MCI represents the preclinical phase of Fronto-Temporal Lobular Degeneration, and multiple-domain nonamnesic MCI is a clinical condition of vascular pre-dementia (represents the prodromal phase of Vascular Dementia-VaD).

4.2 EPIDEMIOLOGY. DEMOGRAPHIC INDICATORS

It is considered that 14% of people over 70 years of age have dementia-type cognitive impairment and a similar percentage of 14% of people in the same age group report mild cognitive impairment; according to other authors, the prevalence of MCI is about 16%, increases with age, is more common in men than women, more common in the unmarried, as well as those with APOE $\epsilon 3 \epsilon 4$ or genotype $\epsilon 4 \epsilon 4$; also, the amnesic type of MCI is the most common; It is assumed that women go directly from normal cognition to dementia, but at an older age, but in their case, the evolution is faster and much steeper. The prevalence of nonamnesic MCI is considered to vary between 17% and 38% of all cases of MCI.

4.3 ETIOLOGY

The etiology of MCI can be established by general clinical and neurological examination and by paraclinical investigations (laboratory analyzes and CT / MRI skull imaging). The most common causes of MCI are:

- * Alzheimer's dementia is the leading cause of amnesic type of MCI in people over the age of 65
- * Cerebrovascular disease is a common cause with age, being involved especially small cerebral infarctions of the lacunar type that have long been clinically unmanifest "silent" ones; In the case of cerebrovascular disease, both amnesic MCI and nonamnesic MCI occur
- * Parkinson's disease with cognitive impairment, also called Parkinson Plus
- * Lewy body disease presents with parkinsonism, nonamnesic cognitive disorders, personality disorder, sleep-wake rhythm disorders
- * Fronto-Temporal degenerations can produce an MCI syndrome
- * Depression
- * Traumatic brain injury



* Various toxins and drugs

* Other diseases (comorbidities): metabolic, endocrine, autoimmune, deficiency, infectious, tumor disorders

Given that neurodegenerative diseases and cerebrovascular diseases are chronic and progressively evolving diseases, it is considered that when MCI is determined by them, aggravation is a certainty. The diagnosis of MCI and Mild Dementia is established by assessing the six cognitive domains, based on history, history, neurological examination, psychiatric examination and neurocognitive examination (neuropsychological tests, eg questionnaire of functional activities, assessment of mental status by MoCA scale -Montreal Cognitive Assessment, MMSE). In people with MCI, the MMSE score is between 25-30.

4.4 DIAGNOSTIC CRITERIA FOR MCI:

- mild memory loss (amnesic flashes), confirmed goal of family, colleagues and memory tests
- signs of cognitive impairment correspond to the 3rd stage on the GDS scale (Global Deterioration Scale Reisberg) and 0.5 to the Clinical Dementia Assessment Scale (CDR)
- preserved general cognitive functionality
- the diagnosis of dementia cannot be established (absence of dementia diagnosis)
- the patient's daily activity remains unaffected, taking place normally, but there is a slight disturbance for complex, daily or professional activities [24,26]

The GDS scale is structured in seven degrees of severity of cognitive and functional disorders:

1 = normal

2 = normal aging

3 = MCI

4-7 = mild, moderate, moderate-severe and severe stages of dementia

Grade 3 of GDS corresponds to MCI and is a slight impairment of cognitive function with impairment of functionality only for complex types of social and professional activities.

4.5 MINOR VASCULAR COGNITIVE DECLINE (VaMCI)

VaMCI is characterized by the absence of mnemonic disturbances, the decline of frontoexecutive performances by the disconnection of Fronto-Parietal subcortical circuits, the interruption of connections between the prefrontal cortex and the dorsal medial nucleus of the thalamus causing compromising downward projections of the prefrontal area to the thalamus.



Cognitive impairment in stroke patients consists of delayed mental processes, loss of generalization of concepts, language and attention disorders, emotional lability, apathy, slowing of thinking. There are various neurological signs that constitute the clinical neurological picture specific to the location of the brain injury: sensory-motor deficits, balance disorders, disorders of higher mental functions - agnosia, apraxia (gait apraxia that is characteristic of frontal lesions, is common in dementia), pseudobulbar syndrome (emotional lability, spasmodic episodes of laughter / crying, oral automatism, delayed mental processes). VaMCI necessarily correlates with the presence of stroke, the relationship between the two being intrinsic and specific, similar to the relationship between the amnesic type of MCI and Alzheimer's Dementia.

The determination of the vascular nature of cognitive disorders is based on the presence of cerebrovascular risk factors and the concomitant association of cerebrovascular disease (territorial cerebral infarction, lacunar infarction, cerebral hemorrhage, amyloid angiopathy, lesions of the white periventricular substance).

Cognitive decline may also occur in cerebral hemorrhage, but is more common in microhemorrhages caused by damage to the small arteries in hypertensive patients (amyloid angiopathy). It has been found that vascular cognitive decline is most often caused by small, repeated, multiple, and usually "silent" strokes, being only a neuroimaging discovery.

VaMCI is considered to be the preclinical phase of vascular dementia (VaD), specific to the vascular nature of MCI being the nonamnestic disexecutive type of MCI, and the multiple-domain nonamnestic subtype is a clinical condition of vascular predominance. Multiple-domain nonamnestic MCI was associated with hypertension, the presence of extrapyramidal motor signs and changes in periventricular and profound white matter (T2 hyperintensity eg MRI). Impaired executive function (working memory, inhibitory control / self-control, cognitive flexibility, planning, problem solving) is prevalent in multiple-domain MCI. Multi-infarct dementia (cortex, corticostriatal) is common after stroke; these patients also have an increased risk of later developing Alzheimer's dementia. Studies have linked the link between cerebrovascular disease (history of stroke, extensive periventricular and deep white matter lesions) and multiple-domain nonamnestic MCI characterized by declining nonmnemonic cognitive domains, especially executive functions and behavioral disorders. Neuropsychological tests that are useful for differentiating VaMCI from AD-MCI have been shown to be the Stroop test and the writing fluency test.

4.6 NEUROIMAGING CORRELATIONS – RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF MCI

Current modern imaging techniques (CT-CT and Nuclear Magnetic Resonance-MRI) can detect the MCI substrate by clarifying the etiology by specifying the nature,

size and location of the associated brain injury, while highlighting "silent" brain changes that amplify the risk of developing MCI lesions. diffuse white matter (leukoaraiosis), cerebral microhemorrhages, cerebral atrophy; Regarding cerebral atrophy, studies indicate that this is the major factor correlated with the risk of developing cognitive disorders, both generalized, diffuse cerebral atrophy and especially localized temporal atrophy and, in particular, hippocampal atrophy. It was also found that cognitive decline does not correlate with territorial cerebral infarctions caused by thromboembolism of the large cerebral arteries, but with cerebral microlesions caused by microvascular pathology (multiple lacunar cerebral infarctions and cerebral microhemorrhages), as well as with cerebral atrophy. (this can also be the consequence of cerebral vascular lesions). From a neuroimaging point of view, aging correlates with the impairment of the subcortical white matter, the prevalence of deep white matter hyperintensity being 92% of cases with MCI.

4.7 MCI PROGNOSIS

Both minor cognitive impairment and mild dementia present a major risk for aggravation, both of which may progress to worsening cognitive decline. The rate of progression of MCI to dementia is 7.1% per year compared to the rate of progression in cognitively normal people which is only 0.2% per year, the risk of progression to dementia increasing with age. The conversion of nonamnesic VaMCI to VaD is estimated to be 26% in the next 3 years, 46% in the next 5 years, the conversion rate being 8% per year (Zaneti et al.2006)

4.7.1 Predictive factors for the progression of MCI and conversion to dementia are considered to be the severity of the lesions (hyperintensity on MRI) of the periventricular white matter and the decline in executive functions, language and sustained attention. Nonamnesic MCI single domain will progress to Fronto-Temporal Degeneration, being its preclinical phase, nonamnesic MCI multiple-domain will converge to VaD, it is considered that nonamnesic MCI single-domain is less likely than the amnesic single-domain type to progress to dementia. It is estimated that approximately 70% of people with MCI will develop some form of dementia over time. There are studies that show that MCI can return to cognitive normal with or without specific treatment, variable or unstable MCI.

4.7.2 Predictive factors for MCI's shift to the onset of Alzheimer's dementia are:

- presence of the apolipoprotein genotype epsilon 4
- hippocampal atrophy (CT / MRI) and study of the volume of the hippocampal head (the atrophic process begins at the head, extends to the body, finally including the hippocampal tail, when the impairment of cognitive function occurs)



- functional imaging (which reveals in cases of MCI, a reduction in blood flow in the Temporo-Hippocampal-Parietal region, representing an unfortunate prognostic factor, as the progression of degeneration and the onset of dementia is favored).

4.8 MCI TREATMENT

Although MCI is a controversial pathological entity by some (given the benefits of this diagnosis, but also its implications - social stigma, therapeutic opportunities, spontaneous remission of MCI to cognitive normalcy), in general it is considered particularly useful to recognize MCI as a transitional phase between normal aging and dementia, thus allowing therapeutic intervention in the early stages of cognitive impairment, giving the patient a chance to improve cognitive function, delay the onset of dementia by prolonging the prodromal phase or even preventing it.

Non-pharmacological treatment refers to the management of cerebrovascular risk factors, physical and mental stimulation, cognitive and behavioral interventions.

Pharmacological treatment addresses both cerebrovascular risk factors and cognitive and possibly psychiatric symptoms. To improve cognitive functions, a wide range of nootropic products are used that can be classified into four main groups:

- substances that act on neurotransmitters (Ach, glutamate)
- substances with neurotrophic action
- substances with neurometabolic action
- substances with cerebral vasoactive effect

Thus, AchE inhibitors (Donepezil, Galantamine, Rivastigmine) are recommended in patients with amnesic MCI. Some researchers have tried preventive treatment with Donepezil in carriers of apolipoprotein epsilon 4 and MCI, but without notable benefits. Also modest results (delayed progression to dementia) were obtained in the case of other AchE inhibitors. It is considered that there are no drugs to prevent or treat dementia; drugs can be used for cognitive and behavioral disorders, but they do not target the pathogenesis of cognitive decline. NMDA receptor blockers (Memantine, Glutamate) may be useful, but there are not enough studies as for deAChE inhibitors. Because they have different mechanisms of action, NMDA antagonists may be associated with I-AChE, but also with poor results. In vascular MCI, placebo-controlled studies have shown poor efficacy of AchE inhibitors and NMDA receptor blockers.



5. DEMENTIA

5.1 DEFINITION

Dementia is a neurocognitive disorder with varying degrees of severity (DSM-5); represents a wide category of brain diseases with chronic evolution, usually slowly progressive, characterized by the gradual decrease of cognitive abilities, especially memory and learning, attention, language, spatial orientation, calculation, thinking and judgment, to the stage in which the daily functioning of the patient and, consequently, his total dependence on his entourage, family and society may be affected. It is often associated with: emotional imbalances, personality changes, psychiatric disorders, decreased motivation, behavioral disorders.

5.2 CLASSIFICATION

5.2.1 After localization, dementia may be:

CORTICAL - by affecting the cerebral cortex

- memory, language and praxis disorders predominate

SUBCORTICAL - dominates personality disorders, behavioral disorders, thinking (bradyphrenia) and attention, memory and language are usually spared

5.2.2 From an etiological point of view, dementia is a heterogeneous group of neurological and systemic disorders:

- Alzheimer's disease - the most common type of dementia (50-70% of dementia cases)
- Vascular dementia (25%):
 - Hachinski multi-infarct dementia
 - Binswanger disease
 - Strategic heart attack
 - CADASIL
- Dementia from alpha-synucleinopathies - Dementia with Lewy bodies (15%) and
 - Dementia associated with Parkinson's disease
- Mixed dementia (10%) - Alzheimer's disease associated with dementia from cerebrovascular disease or dementia with Lewy bodies, etc. (usually a combination of Alzheimer's disease with a type of dementia)
- Frontal-Temporal Dementia
- Dementia from Huntington's disease
- Hallervorden-Spatz disease
- Progressive supranuclear palsy
- Posttraumatic dementia
- Dementia from Hydrocephalus with normal pressure (Hakim & Adams syndrome)
- Dementia from HIV infection (AIDS-dementia complex)
- Dementia from Multiple Sclerosis



- Bala Creutzfeldt-Jakob
- Neurosyphilis (Progressive Generalized Paralysis)
 - Dementia of various causes: metabolic, endocrine, autoimmune, infectious, deficiency, paraneoplasia
 - Dementia induced by the consumption of toxic and medicinal substances: alcohol, drugs, lead, mercury, pesticides, tricyclic antidepressants, lithium.

5.3 EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA

Incidence. Prevalence. Death rate

Dementia with its different types is a chronic condition, more and more frequently diagnosed, which mainly affects the elderly, about 10% of the population developing mnemonic disorders, the frequency increasing with age. It is considered to occur at:

- about 3% of the population aged 65-74,
- about 19% of people aged 75-84 years and at
- about 50% for those over 85 years old

Worldwide, in 2015 there were about 47.5 million patients with dementia, in 2012 there were 35.6 million patients, anticipating that their number will triple in 2050. After the age of 65, the prevalence dementia generally varies between 5-10%; it is considered that the prevalence of dementia doubles every 5 years, so that at 75 years, 4% of the population will be affected, and at 85 years - 16% of the population; the prevalence of Alzheimer's disease doubles every 4.3 years, and the prevalence of VaD doubles every 5.3 years. About 7.7 million new cases of dementia appear every year, because, increasing the average life expectancy of the population, implicitly increases the number of elderly people and, consequently, the percentage of patients diagnosed with dementia.

Mortality - in 2013 there were 1.7 million deaths due to dementia,

- in 2015, 1.9 million deaths were declared due to dementia, compared to 0.8 million deaths in 1990.

It is unanimously accepted that dementia is underdiagnosed in over 50% of cases and undertreated in over 75% of cases.

5.4 POSITIVE DIAGNOSIS OF DEMENTIA

Because there are various causes of cognitive decline and dementia, differentiating multiple specific types of MCI and dementia and due to the fact that the symptoms are very similar, it is usually quite difficult to diagnose the type of dementia based only on the symptoms. Currently, the **criteria in the DSM-IV** are used for the diagnosis of dementia, namely:



- development in the last 6 months of cognitive deficits, mandatory memory impairment plus at least one of the following: aphasia, apraxia, agnosia, executive function (planning, organization, sequencing, abstraction)
- cognitive deficit must be declining from a previous level and significantly affect social and occupational functionality
- delirium and any other type of confusing disorder are excluded
- specific diagnostic criteria are applied for etiological specification
- memory impairment is mandatory, but not necessarily dominant

For the diagnosis of Mild Cognitive Impairment, the guidelines recommend the use of the Petersen criteria:

- subjective accusations of the patient / family regarding the memory alteration
- objectification of these mnemonic disorders in neuropsychological tests
- preservation of daily, social and professional functionality
- normal cognitive function
- absence of dementia

For the positive diagnosis of dementia, in addition to the DSM-IV diagnostic criteria, in order to specify the etiological type, complex clinical-paraclinical evaluation of the patient is recommended: history and history, general clinical examination, neurological and psychiatric (neuropsychiatric inventory), hologic neuropsychological evaluation (MMSE, Clock Drawing Test and daily activity questionnaire function - ADL are mandatory); from a paraclinical point of view, laboratory tests are recommended (usual tests, serum ionograph / electrolytes, TSH, serum B12 level, folic acid, homocysteine, but also specific tests (including CSF examination), depending on the etiological suspicion as well as neuroimaging (CT or craniocerebral MRI), all of which are absolutely necessary to establish the etiology of cognitive impairment and to determine the type of dementia. Sometimes encephalographic (EEG) is recommended , being useful for the diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease and encephalitis.

5.5 DIFERENTIAL DIAGNOSIS OF DEMENTIA SYNDROME (PSEUDODEMENTIA)

Dementia must be distinguished from other conditions, which may have a similar clinical picture:

- general medical conditions hypothyroidism, hypercalcemia, hypoglycemia, vitamin deficiency (B12, niacin), liver or kidney failure, autoimmune diseases or neurological disorders (stroke, brain tumors)
- conditions determined by different substances: alcohol, drugs, medicines;
- mental disorders: delirium, mild cognitive impairment, cognitive decline associated with aging, elderly depression (pseudodementia), mental retardation, cognitive impairment from schizophrenia.

6. VASCULAR DEMENTIA

Vascular dementia (VaD) is a heterogeneous group of cognitive disorders primarily determined by cerebrovascular pathology and accounts for over 20% (20-25%) of all cases of dementia, seconding Alzheimer's disease (Gorelick et al. 2011). The brain injuries that can cause cognitive dysfunction are:

- Stroke (large cortical infarctions)
- Strategic subcortical infarcts (angular gyrus, Temporal inferomesial, Frontal mesial, left internal capsular knee, basal ganglia, thalamus)
- Multiple lacunar infarctions, polytopic
- Degeneration of the subcortical white matter (leukoaraiosis)

6.1 EPIDEMIOLOGY OF VaD

VaD prevalence is thought to double every 5.3 years; Imaging studies (MRI) in recent years have shown an increased prevalence of small vessel disease in the elderly population (23% for small, lacunar infarcts and 95% for lesions / hyperintensity of deep periventricular and deep white matter) correlated with increased risk of stroke and dementia (by compromising the cholinergic system). Also, the prevalence of VaD in asymptomatic ("silent") strokes varies between 5.8% and 17.7%, with an average of 11%, and in the case of a single stroke, the prevalence differs depending on the location. (52% for basal ganglia, 35% for subcortical localizations and 11% for cortical localization). White matter lesions begin to appear after the age of 30, are common in the elderly and are a major risk factor for VaD. Regarding the prevalence of VaD after stroke, it is considered that it depends on the period after stroke, the size and location of the infarction, as well as the associated comorbidities; thus, it is estimated that post-stroke VaD has a prevalence of 30% immediately after stroke, and the incidence increases by 7% new cases of VaD after one year after stroke and 48% after 25 years after stroke. Usually, a stroke doubles the risk of dementia, with VaD patients having a significant functional decline as well as a high mortality rate. Depending on the coexistence of Medial Temporal Atrophy, the incidence of VaD three years after stroke is 81%, compared to those without Temporal Medial Atrophy where it is 58%. The prevalence of VaD in developed countries varies between 0.6 and 2.1%, being 1.6% in people over 65 years. Some studies have shown a higher incidence of VaD in men than in women, as well as a higher incidence in black than in white; other studies found no gender or racial differences.



6.2 VaD ETIOLOGY. NEUROPATHOLOGICAL AND BIOLOGICAL CORRELATIONS

Among the cerebrovascular diseases that cause cognitive decline, the most common is the cerebral infarction; chronic, small, silent (asymptomatic) strokes are often found in the elderly and much more common than clinical stroke, and microscopic infarcts are more common than macroscopic ones; if the inclusion in microscopic pathology of microscopic infarcts and white matter lesions as an expression of the suffering of small vessels were considered, then the frequency of cerebrovascular disease in the elderly would increase to over 75%. Clinico-pathological studies have found that large cerebral infarctions, as well as the increased number of macroscopic infarcts, correlate with a significant risk of developing VaD, but currently neuropathological criteria regarding the size and number of cerebral infarcts for the diagnosis are not accepted. In clinical dementia, however, there is a degree of correlation with their location; thus, it has been shown that the areas most frequently involved in the development of cognitive dysfunction are the angular gyrus, the basal ganglia, and the thalamus. Also, multiple microinfarcts are more likely to develop dementia, as they are correlated with diffuse chronic cerebral hypoxia, oxidative stress, inflammatory phenomena, altered permeability of the blood-brain barrier (BBB). It was found that in the elderly the association between cerebral infarctions and Alzheimer's Dementia is frequent, approximately 50% of patients with AD actually have mixed pathology, the association of vascular pathogenesis with neurodegenerative pathology increasing the risk, but also the extent of cognitive decline (increase). Other vascular causes for cognitive dysfunction are:

- cerebral microhemorrhages
- degenerative lesions of the periventricular white matter
- primary vascular disease of small vessels (arteriolosclerosis / lipohyalinosis, atherosclerosis and cerebral amyloid angiopathy)

Neurobiological studies have shown that the neurovascular unit (neuron, glia, vascular and perivascular cells) is profoundly altered in VaD and AD by microvascular changes (thickened basement membrane, hyaline degeneration, sinuous vessels, reduced number, amyloid beta accumulation in the cortical arterioles).), oxidative stress and inflammation being the main causes of neurovascular dysfunction; this in turn causes cerebral hypoperfusion, altered BBB, reduction of trophic factors and, as a result, decreased repair potential. It should be noted that oxidative stress and inflammation can be potential true therapeutic targets.



6.3 NEUROPATHO-IMAGING CORRELATIONS

Neuroimaging studies have shown that the phenomenon of white matter degeneration (NMR sequences: fluid-attenuated inversion recovery and Diffusion tensor imaging), as well as cerebral microhemorrhages, are correlated with both VaD and Alzheimer's disease, and neuropathological studies have found that they are correlated with lipohyalinosis, although white matter degeneration is mainly associated with AD, and cerebral microhemorrhages are predominantly associated with cerebral amyloid angiopathy. Hippocampal volume studies have shown that hippocampal atrophy correlates with both AD and VaD, so it is associated with both etiopathogenic, neurodegenerative and vascular processes; therefore, the degeneration of the white matter and the microhemorrhages considered until recently to be specific for VaD, may also appear in neurodegenerative pathology, and the hippocampal atrophy appreciated as a specific biomarker of AD, could also reflect vascular pathology.

6.4 POSITIVE DIAGNOSIS

VaD refers to cognitive disorders with ischemic or hemorrhagic cerebral vascular pathogenesis; VaMCI is the vascular equivalent of MCI, the transition on a cognitive continuum from normal to dementia, caused by a manifest clinical stroke or subclinical cerebral vascular distress. The **clinical criteria** for the diagnosis of VaD are the NINDS-AIREN Criteria which are based on two factors:

- Demonstration of cognitive impairment (history, eg clinical and neuropsychological tests) and
- History of clinical stroke or neuroimaging evidence of cerebral vascular disease

The positive clinical diagnosis of VaD is established on the decline of cognitive function compared to the previous level with the involvement of at least two cognitive areas (domains), severe enough to interfere with the patient's daily activity and independent of sensory-motor sequelae. postAVC. Cognitive decline is assessed by cognitive tests that must investigate at least four cognitive areas: executive function / attention, memory, language, and visuospatial function. The vascular nature of cognitive decline is usually determined by objective neurological examination that detects the presence of focal neurological signs (central facial paresis, hemiparesis / hemiplegia, reflex changes, pathological reflexes - Hoffmann, Babinski, sensory syndrome, hemianopsia, aphasia, cranial nerve damage etc). Neuroimaging (CT / MRI) completes the positive diagnosis of VaD by detecting cerebral infarctions (single, multiple, single strategically located infarction, multiple gaps in the basal ganglia or periventricular white matter, deep white matter degeneration). The causal relationship between cerebrovascular disease and cognitive decline should also be established temporarily.



6.4.1 Probable positive diagnosis of VaD:

- there is cognitive decline and cerebrovascular disease evidenced by neuroimaging
- there is a temporal link between cognitive deficit and cerebral vascular event
- there is an obvious link between the severity and pattern of cognitive decline with diffuse subcortical cerebrovascular disease (eg CADASIL)
- if there is no history of progressive and gradual cognitive deficit after stroke, the presence of a nonvascular neurodegenerative disease is suggested.

There are several neuropsychological clinical signs considered characteristic for the diagnosis of probable VaD, namely:

- gait disorders (ataxic, apraxic or parkinsonian)
- postural stability disorders
- urition disorders
- pseudobulbar syndrome
- alteration of personality and emotional mood

6.4.2 Positive diagnosis of VaD possible

There is cognitive decline and neuroimaging evidence of cerebrovascular disease, but:

- the temporal connection is not clear, nor the relationship of severity or cognitive pattern between vascular disease and cognitive dysfunction
- there are not enough arguments for the diagnosis of VaD (clinically suggestive for vascular disease, but normal imaging)
- the severity of aphasia does not make it possible to evaluate with cognition tests
- there are other neurodegenerative diseases or other comorbidities that may affect cognition:
 - pathological personal history of neurodegenerative disease (Parkinson's disease, Lewy body dementia, Progressive supranuclear palsy, Alzheimer's disease confirmed by biomarkers- PET, CSF, amyloid ligands - or by genetic examination-PSI mutation)
- history of active cancer, psychiatric or metabolic diseases

6.4.3 Unstable (variable) VaMCI: a person diagnosed with probable or possible VaMCI in whom cognition returns to normal.

Cerebrovascular disease with or without clinical stroke may be associated with depression, having a major impact on VaD, negatively influencing the patient's daily functionality and cognitive performance, treatment of depression decreasing in parallel and the severity of cognitive decline; this “reversibility” is one of the peculiarities of VaD, another peculiarity being the spontaneous poststroke recovery tendency, both of the neurological and of the cognitive deficit, the cognition process being part of the post-stroke recovery process.



Within cognitive abilities, the most affected field in VaD is that of executive function, but not being specific for VaD such as memory disorders for Alzheimer's dementia. In conclusion, the positive diagnosis of VaD is based on general clinical, neurological, psychiatric examination, function evaluation cognitive by neuropsychological tests and on neuroimaging.

7. THE CLASSIC TREATMENT IN DEMENTIA. NEW THERAPEUTIC PERSPECTIVES

The treatment of dementia is very limited; At present, despite scientific research and discoveries, there are no effective drugs in the prevention or therapy of dementia, and the few currently used are only a symptomatic treatment and not one that addresses the basic etio pathogenic process. In the treatment of dementia, the therapeutic targets are the management of risk factors and symptomatic treatment.

7.1 MANAGEMENT OF RISK FACTORS

7.1.1 Primary prevention is addressed to modifiable risk factors:

- lifestyle (education, vegetarian diet with antioxidant factors-vitamin E, vitamin A, omega 3,6,9 polyunsaturated fatty acids, vitamin D, vitamin B-B6, B12, folic acid-involved in homocysteine metabolism)
- physical and mental activity (it has been shown that exercise causes an increase in cerebral neurotrophins-BDNF, improves cerebrovascular function and cerebral perfusion, increases brain plasticity by stimulating synaptogenesis and neuronogenesis).
- other risk factors: obesity, alcohol, smoking (although it is associated with oxidative stress and inflammation, nicotine directly stimulates cholinergic receptors thus improving cholinergic synaptic transmission; however, the platelet proaggregating effect of nicotine must be considered, with increasing blood viscosity).
- clinical and biological conditions: hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidemia, chronic inflammation (by increasing the serum level of specific inflammatory proteins alpha1-antichymotrypsin and C-reactive protein)
- vascular comorbidities: coronary artery disease, atrial fibrillation, heart failure, chronic kidney disease (associated with uremic and hypertensive metabolic encephalopathy, as well as the risk of stroke), stroke (increases the risk of VaD by 10%, and in case of recurrence by about 30%).

7.1.2 Secondary prevention

It refers to the treatment of secondary prevention of strokes (statins, hypotensives, antiplatelet agents, anticoagulants, cerebral vasoactive agents).

7.2 Dementia Treatment

7.2.1 Non-pharmacological treatment is recommended as an adjunct in the therapeutic management of dementia and refers primarily to the social support to be provided to these patients (integrated medical services-primary care at home, day medical services,



specialized assistance in hospital homes), as well as psychological therapies for stimulation and cognitive rehabilitation, but also palliative care. Is recommended:

- Structured cognitive stimulation programs
- Programs for the development of new neuromotor skills
- Occupational and social therapy
- Supportive therapy
- Permanent care and supervision (advanced stages)
- Group therapy for the families of patients with dementia
- Simple memory enhancement techniques

In addition to drug treatment, diseases that affect memory can be slowed down or even stopped by a healthy lifestyle and a few simple but extremely effective techniques. These include:

- Drawing up a daily list of activities and using a daily diary;
- Regular physical activity, beneficial regardless of age;
- Brain training by solving crossword puzzles, Sudoku, reading and logic exercises;
- A healthy and balanced diet.

7.2.2 Pharmacological treatment of Dementia

Therapy of cognitive symptoms (reduction of neurodegenerative processes, amelioration and stabilization of cognitive decline): cholinesterase inhibitors (Donepezil, Rivastigmine, Galantamine), NMDA antagonists (Memantine). Cerebral cholinergic deficit is early, important and characteristic of patients with dementia, causing mnemonic disorders and progressive cognitive decline; therefore, the acetylcholine pathways represent one of the targeted therapeutic targets, aiming to increase the amount of this neurotransmitter in the brain. Acetylcholine “memory molecule” is essential for the development of the processes involved in storage and evocation memory, as well as in analytical and associative reasoning.

Despite research and advances in dementia, no specific drugs have yet been discovered to treat it at the etiopathogenic level. In practice, there are two approved, clinically applicable therapeutic categories: stigma, Galantamine and Tacrine) and NMDA receptor blockers (Memantine); the two therapeutic categories can also be used in combination.

Acetylcholinesterase Inhibitors (I AchE)

Their studies tested their effectiveness on cognition, as well as on daily and global functionality. Thus, it has been shown that Donepezil (5-10 mg / day) brings cognitive benefits, but without influencing the overall functionality (Class IIa, Level of Evidence A), and a study revealed that the mortality rate was higher than in the placebo group; sometimes causes bradycardia and syncope. It is generally considered that Donepezil may be useful in AD, in dementia associated with Parkinson's disease, in Lewy body disease and in VaD. Galantamine (16-24 mg / day) has been shown to have



beneficial cognitive effects, including for executive function, but no impact on daily functionality (Class IIa, Level of Evidence A); may be beneficial in mixed dementia (AD-VaD). Rivastigmine (6-12 mg / day) is less studied, it would be beneficial for executive function. Its efficacy is not well established for VaD (Class II b Level of Evidence A).

NMDA - Memantine receptor antagonists (10-20 mg / day) are recommended as a second-line medication for VaD, associated with the treatment of secondary stroke prophylaxis; has cognitive benefits as well as behavioral disorders, but does not influence overall and daily functionality; its benefits are not established for VaD (Class II b, Level of Evidence A).

In general, the two pharmacological categories currently recommended for the treatment of dementia are considered to have a minor benefit, below expectations. Due to the different mechanisms of action, the two types of drugs can be used in combination, but also with little benefit. Symptomatic noncognitive pharmacological treatment - refers mainly to antipsychotics, antidepressants and thymoleptics addressed to psychiatric disorders of patients with dementia (behavioral disorders, changes in mood) - anxiolytics, sedatives, neuroleptics, antidepressants, antiepileptics, hypnotics.

New therapeutic perspectives. New promises for patients with dementia. Other therapeutic categories with symptomatic cholinergic and possibly neuroprotective action

Other medicinal substances have been studied that could be useful in improving the cognitive functions of patients with dementia, many of them without the expected efficacy, but others have been shown to be worthy of attention in scientists, remaining only as the results of research in the near future to decide their effectiveness or not. Of these, we mention:

- **DIMEBOLIN** = AchE inhibitor, L-type calcium channel inhibitor and NMDA receptor blocker
- **FENSERINE** = inhibits acetylcholinesterase, reduces apolipoprotein B and Beta-amyloid
- **MEMOQUINA** = inhibits acetylcholinesterase, has antioxidant effect, reduces beta-amyloid aggregation and hyperphosphorylation
- **BIS-TACRINA**
- **LIPOCRINE**
- **CITIDINEDIFOSFOCOLINA**
- **NIMODIPINE**
- **PIRACETAM**
- **VINPOCETIN**
- **HUPERZINE A** = alkaloid extracted from HUPERZIA SERRATA, with complex action and multiple effects on the brain, constituting a promising solution in the treatment of minor cognitive decline and dementia.



Of the wide range of substances studied for the treatment of dementia, only two were retained by scientists to continue their research, namely: Nimodipine and Huperzine A, both of which are proving to be promising especially in vascular disease. small and deserving to be studied in depth in the future.

- Therapy of non-cognitive symptoms: antidepressants, antipsychotics;
- Improving the functional component of cerebral circulation: Piracetam, Pramiracetam;
- Treatment of somatic comorbidities: antihypertensives, statins, antiplatelet agents;
- Prevention of evolutionary risk factors (cerebral hypoxia, metabolic dysfunctions).

7.3 ETIOLOGICAL TREATMENT IN PSEUDODEMENTIA

For the situations in which the dementia picture appeared as a result of a cause that can be treated, as follows:

- Vitamins to eliminate B12 deficiency;
- Neurosurgical treatment in case of brain tumors, hydrocephalus;
- Treating depression;
- Stopping any drug treatment that triggers dementia-specific symptoms;
- Hormonal drugs to treat hypothyroidism;
- Treat encephalitis / meningoencephalitis

7.4 CARE OF PATIENT WITH DEMENTIA

Proper nutrition (nutrition and hydration) - it is very likely that a patient with dementia will forget to eat or drink water on time and therefore will need someone to ensure that he is properly fed. Also, a sufferer of advanced dementia will have difficulty handling cutlery and will need help from someone else. If a family member is unable to feed the patient, specialist help may be sought.

Creating a safe and secure environment

Because a person with dementia is no longer aware of the danger and can no longer be responsible for his decisions, it is important that he is provided with an environment in which he cannot be injured. In order to do this, certain aspects need to be considered:

- Dangerous, sharp, sharp objects are not left at the patient's disposal
- Keep medicines and toxic substances out of the patient's reach
- Remove carpets and sills that the patient may be obstructing
- The rooms used by the patient are lit at night, so that there is no risk of injury

Even though dementia is, in most cases, an incurable and irreversible disease, it is important to make sure that people suffering from such a condition are properly cared for and are helped to live a dignified life in a safe environment.



8. EARLY DIAGNOSIS OF COGNITIVE IMPAIRMENT

Patients diagnosed with mild impairment of cognitive function have minimal impairment and an increased risk of progression to dementia. This damage is often neglected both by the patient or his family and by the family doctor. To date, there are no effective therapies in changing the evolution and prognosis of the disease, its management being limited to the active detection, from the onset stage, of clinical manifestations and adequate control of comorbidities and risk factors incriminated in increasing the risk of occurrence. and progression. At present, no screening is performed for the mass detection of impaired cognitive function in the asymptomatic population, over 65 years of age, but neuropsychological testing of patients with comorbidities, which may be risk factors, is frequently recommended for dementia.

Mild cognitive impairment is defined as the minimal impairment of cognitive function (most commonly, memory capacity) observed by the patient, family, or physician, the severity of which can be measured by validated assessment tests. mental status and allows preserving functional independence.

Cognitive dysfunction (cognitive impairment) refers to structural and functional changes in the brain that result in impaired cognitive functions (memory, learning, orientation, perception, judgment, etc.). Several types of cognitive dysfunctions (with multiple subtypes) are described, with different causes and therapeutic approaches: delirium, dementia, amnesia, other cognitive dysfunctions, for example mild cognitive dysfunction or nonspecific cognitive dysfunctions.

The presumptive diagnosis is based on clinical criteria, but there is rapid progress in the validation of neuroimaging or laboratory tests that will allow a positive diagnosis and assessment of the risk of conversion to Alzheimer's dementia as early as possible (brain atrophy, genetic testing, beta-amyloid detection, etc.).

It is very important to exclude other medical conditions that could explain your neurocognitive dysfunction: iatrogenic causes (anticholinergics, antihistamines, tricyclic antidepressants, hypnotics, benzodiazepines, opioids, neuroleptics, antiepileptics, muscle relaxants, digoxin, corticosteroids), and electrolyte disorders, of intercurrent disorders of the elderly or psychiatric disorders (depression).

It is also recommended to evaluate the metabolic and vascular risk factors of middle-aged adults (diabetes, obesity, hypertension, hypercholesterolemia), which are correlated with a decline in cognitive function and an increased risk of developing dementia. It is considered that the early detection of cognitive impairment and the control of the installation and evolution of comorbidities, which are high risk factors in the occurrence of minor cognitive decline, are the only management options.

It should be noted that there is no sign of equality between the concept of neurocognitive disorder and dementia, the first being a broader one, the neurocognitive disorder may also include cases in which the deterioration manifests itself in a single



cognitive area (only memory, only language, attention only, etc.), while dementia involves impaired functioning in at least two areas of cognition; In the case of Alzheimer's dementia, one of the impaired cognitive areas necessarily concerns the field of memory and learning. An interdisciplinary approach is recommended in the evaluation of dementias, because relevant clues can be obtained: genetics, neurology, psychiatry, psychology.

8.1 THE IMPORTANCE OF EARLY DETECTION OF MILD IMPAIREMENT OF COGNITIVE FUNCTION

Studies in primary care have shown that over 90% of patients with minor cognitive decline are not clinically evaluated and remain undetected by their family doctor, although this is the first link with patients with high-risk comorbidities. This reality can be explained by neglecting or not recognizing the onset symptoms, by appreciating that memory loss is a physiological process in the elderly, due to lack of effective medication or because symptomatic medication can not be initiated by the family doctor. It is advisable to inform patients at risk of developing dementia at an early stage, and the detection of minor cognitive impairment can provide advantages in terms of appropriate treatment and control of comorbidities that increase the risk of developing or progressing functional decline.

8.2 PRESUMPTIVE DIAGNOSIS OF MINOR IMPAIREMENT OF COGNITIVE FUNCTION

The presumptive diagnostic algorithm includes:

- exclusion of iatrogenic, vascular, traumatic, metabolic, psychiatric causes (delirium, depression), which can lead to a cognitive decline
- examination on four clinical levels:
 - ▶ anamnestic, to identify the accusations or observe the alteration or decline of cognitive function by the patient or family
 - ▶ objectification of this decline through structured testing of cognitive function (memory, attention, etc.)
 - ▶ exclusion of the affectation of normal daily activities
 - ▶ exclusion of signs of dementia
- analysis of hematological and biochemical parameters (electrolytes, blood glucose, markers of renal function), thyroid function testing and determination of serum levels of vitamin B12 or folic acid.
- neuroimaging: CT, MRI, PET, SPECT

It is recommended that cognitive function be tested in all patients who experience (through self-assessment or mid-term assessment) impaired memory or

thought processes, as well as in adults over 65 years of age who are associated with high risk factors. for MCI: history of diabetes stroke, depression, difficulties with self-management of medication or professional or personal activities. It is appropriate to maintain an evaluative attitude towards signs and symptoms of cognitive impairment, especially memory and language in high-risk patients, through the use of tools such as the Dementia Screening Indicator in primary care clinics. The family doctor may perform such tests or transfer the patient to the psychiatric, geriatric, neuropsychology departments or to centers specializing in the diagnosis and follow-up of patients with cognitive decline or dementia.

In some countries (eg the United Kingdom) it is recommended to actively detect cognitive impairment and secondary prevention of dementia in middle-aged or elderly patients with vascular risk factors or controllable risk factors (smoking, excessive alcohol consumption, obesity, diabetes, hypertension or hypercholesterolemia). These patients are provided with regular follow-up consultations at 6-12 months or whenever the progression of cognitive decline or the appearance of the functional one is observed.

8.3 PRECLINICAL STAGE OF ALZHEIMER'S DEMENTIA

36 million people worldwide suffer from Alzheimer's disease, and by 2050 it is estimated that there will be 115 million cases. Brain changes occur even 20 years before the onset of the first symptoms.

The two main features of this stage are related to the absence of clinical symptoms (cognitive impairment does not appear yet), but to the presence of changes in specific biomarkers (beta-amyloid accumulations). Thus, the evaluations performed at this stage do not aim at diagnosing the disease, but may assess the level of risk of further developing dementia and refer in particular to genetic testing and β -amyloid markers in the cerebrospinal fluid. Cognitive assessment at this stage is recommended only to differentiate, clinically, the initial cognitive status from the next, when mild cognitive impairment occurs. Patient history data (family dementia cases), genetic data, patient lifestyle data, an active lifestyle, and a positive mood can also be collected, and are considered protective factors, while a sedentary lifestyle, lack of physical and intellectual activities, as well as a depressed mood, are risk factors for dementia. The evaluation performed at this stage of disease evolution has more of a prognostic purpose.

Early detection of the disease is essential, given the irreversible nature of neuropathological changes, and currently the main challenge is the discovery of biomarkers to be highlighted by minimally invasive methods.

Scientists at the National Institute on Aging and the Alzheimer's Association are proposing a new definition of dementia, based on biomarkers. The biological changes that appear in the patients' brains are brought to the fore, and not the clinical

manifestations as before. Thus, asymptomatic patients will be able to be enrolled in studies, new drugs can be tested more effectively and the natural evolution of the disease will be investigated, being able to intervene at the optimal time, which is certainly not the stage of dementia.

Until now, clinical criteria were used to establish the diagnosis, symptoms related to cognitive and behavioral changes, and biomarkers had the role only to confirm the diagnosis. It is considered that dementia is not a disease but a syndrome that includes signs and symptoms that can be caused by multiple diseases, Alzheimer's being one of them. It was found that between 10 and 30% of those diagnosed with Alzheimer's disease do not have neuropathological changes associated with autopsy or do not show characteristic changes on PET examination or examination of cerebrospinal fluid. Also, the neuropathological changes associated with Alzheimer's disease may occur without signs or symptoms. Between 30 and 40% of individuals with cognitive impairment presented at autopsy with neuropathological changes or altered biomarkers. Cognitive symptoms are not the ideal way to define Alzheimer's disease. The traditional approach used so far introduces biomarkers into the diagnostic process after the clinical manifestations appear, which happens late in the evolution of the disease.


Modification of biomarkers in the evolution of Alzheimer's disease

Studies have shown that irreversible changes occur in the preclinical stages (before the disease manifests itself). Also, little is explored therapeutic options that address the early stages of the disease. Cerebrospinal fluid (CSF) is currently used as an important source of biomarkers such as **amyloid beta** ($A\beta$), tau protein and tau phosphorylated protein.

AT (N) (C) is the proposed scheme that groups biomarkers into 3 categories.

A refers to **$A\beta$ amyloid plaques** observed by PET imaging or by determination of CSF - $A\beta_{42}$ or by the $A\beta_{42}/A\beta_{40}$ ratio.

T corresponds to **tau protein** - determined either from CSF, as your phosphorylated protein (p-tau) or by PET highlighting the specific neurofibrils in the parenchyma, which when accumulated blocks communication between neurons.






N refers to the neuronal injury or neurodegenerative process caused by MRI, PET, or measurement of your total CSF protein. Neural injury can occur due to trauma, the aging process and not necessarily due to the disease itself.

C - describes cognitive changes

If before we talked about preclinical Alzheimer's disease, mild cognitive impairment (MCI) and dementia, today we propose another notion - "cognitive continuum".

Changes in Alzheimer's disease are not considered separate entities, but early or advanced stages of this condition. **Category A** determines whether the person is in this continuum, while **category T** biomarkers identify patients with Alzheimer's disease. Indices A and T show specific neurological changes that define the disease while (N) and (C) are nonspecific. The parameters that end BA must be specific, while the parameters by which severity is assessed do not. If the A β biomarker is present and your protein is normal, the patient would fall into the category of "pathological change associated with Alzheimer's disease". The term 'Alzheimer's disease' is used only in the presence of both markers - A β and tau.



A team of researchers at the Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SBP) has identified a new biomarker, the DAG peptide, that could function both as an accessible method for diagnosing disease early and as an effective route of administration. of drugs in areas of the brain where a neuroinflammatory process occurs.



The target of the DAG peptide is CTGF, a growth factor of connective tissue that occurs in the brains of Alzheimer's patients before amyloid plaques.

The DAG peptide binds to the endothelial cells that make up the inner layer of the cerebral vessels, which has very important implications both for diagnosis and in terms of easy administration of treatment. DAG reaches the affected areas, not only in the case of Alzheimer's disease, but also in other diseases that have an inflammatory component: glioblastoma, brain trauma, Parkinson's disease, stroke; is a cyclic peptide composed of nine amino acids that are concentrated in the hippocampus, accumulates in endothelial cells lining the cerebral vessels and in astrocytes that form part of the neurovascular unit, the substrate to which DAG binds is the growth factor of connective tissue (CT), a protein expressed in large quantities in the brain affected by Alzheimer's. CTGF is an extracellular matrix protein with multiple roles: in cell adhesion, angiogenesis, migration, cell proliferation and in the process of tissue repair. The protein is expressed in increased amounts in response to inflammation, which confirms previous studies that have shown the important role that inflammation plays in the pathogenesis of Alzheimer's disease. effective and early therapeutic intervention.

The diagnosis of Alzheimer's disease only on the basis of clinical symptoms and cognitive tests is correct in 70-80% of cases. Therefore, a definite diagnosis of the presence of a degenerative disease is very important to distinguish between age-related memory disorders and dementia in the early stages.

In this context, a series of immunological tests have been developed, with the help of biomarkers taken from cerebrospinal fluid (CSF), which allow a clear, rapid and complete diagnosis of Alzheimer's disease:

- ▶ Elecsys β -Amyloid test (1-42) CSF
- ▶ Elecsys Phospho-Tau test (181P) CSF
- ▶ Elecsys Total-Tau CSF test

Early diagnosis of dementia allows affected people and their families to become aware of the situation at an early stage, so that they can take steps to ensure an improved quality of life. In addition, a diagnostic tool that better identifies patients with Alzheimer's disease can help doctors better evaluate treatment options.

8.4 STAGE OF MILD COGNITIVE DYSFUNCTION

8.4.1 Symptoms of dementia

During this stage, the first clinical signs appear, manifested by slight to moderate deterioration of one or more cognitive areas, but without affecting the person's functionality in daily activity. The symptoms of dementia are related to frequent and progressive memory loss, loss of concentration, attention to certain everyday things and decreased visual perception.



Early Signs of Dementia & Alarm Signs for Dementia

Dementia is very difficult to detect, and the signs that appear in the early stages of the disease are subtle and vague, and can often be ignored. One or more of the following manifestations may suggest changes specific to cognitive impairment:

- Confusion
- Loss of the ability to perform daily tasks, difficulties in performing daily activities
- Behavior and personality changes
- Apathy and withdrawal in isolated areas
- Frequent and progressive memory loss
- Language and communication problems, difficulties in finding words
- Disorientation in time and space
- Impairment of judgment and reasoning
- Wandering things
- Loss of motivation and initiative, restriction of the sphere of interests
- Mood swings
- Reduced compliance with medication and recommendations

Incipient/Minor Cognitive Impairment

People diagnosed with MCI (mild cognitive impairment) are already experiencing symptoms such as memory loss, but these are very difficult to differentiate from normal aging. The person will experience daily problems, which differ in severity. Usually, people with MCI get dementia, generally Alzheimer's. About 40% of people with MCI end up suffering from dementia within three years, and about 80% of these people suffer from the condition within 6 years. Although a person suffering from MCI cannot resort to a treatment to heal, there is a chance to slow down or even stop the progression of the disease. Normally, one in 8 people with memory impairment will progress to dementia, but it is not possible to say which of these people will be affected.

8.4.2 Medical evaluation of a patient with dementia syndrome

History and history of the disease:

Premorbid level of cognitive functioning, risk factors, personal pathological history, mode of onset

Discussion with the patient, with the family

The most common questions asked by the doctor will be:

- What are the symptoms?
- When did they start?
- How do your symptoms manifest?
- Do you have symptoms that appear and disappear or are persistent?
- Did you give up certain activities you were doing because of your symptoms?



- How severe are these symptoms?
- Are you on medication? If so, what kind of treatment?
- Do you have other conditions?
- Are there cases of Parkinson's, Huntington's disease in your family?
- Have you been going through a moment of major importance lately?
- Have you had a more stressful time lately?

General clinical examination:

- Signs can be highlighted to guide the diagnosis of a general medical condition that is accompanied by dementia: hypothyroidism, severe anemia, neoplasm, AIDS, syphilis, etc.

Psychiatric examination (of mental health and clinical cognitive examination):

Other conditions (delirium, depression, post-psychotic states, substance dependence, pseudo-cognitive impairment: anticholinergics, benzodiazepines, beta-blockers, diuretics, etc.) that may influence cognition must be excluded.

All psychic functions are examined, with emphasis on orientation, attention, memory, language, praxis, execution functions

Neurological examination:

Specific neurological signs can be highlighted to guide the diagnosis of a primary neurological disease that is accompanied by dementia (Parkinson's disease, Wilson's disease, Creutzfeldt-Jakob disease, etc.)

Alzheimer's dementia can be distinguished from vascular dementia or the rebrovascular component of the neurodegenerative process is evaluated

8.4.3 Neuropsychological examination:

The psychological evaluation in the stage of mild cognitive dysfunction can have multiple purposes, all being in the direction of a better conceptualization of the case, necessary for the elaboration of the intervention plan. The evaluation may aim at:

► a screening purpose to identify cases with a risk of mild cognitive impairment. Standardized tools for assessing the level of cognitive impairment are considered the most appropriate screening tools, as they meet three essential conditions: they involve low costs, have a short application time and are easy to analyze and interpret; they may also detect minor changes indicative of mild cognitive impairment. It is recommended that screening tools target multiple cognitive areas. From the perspective of the ability to discriminate between normal cognitive functioning and mild cognitive dysfunction, the most useful tests are Qmci (Quick Mild Cognitive Impairment Screen) and MoCA (Montreal Cognitive Assessment). In terms of the effectiveness of tools to discriminate between patients with mild cognitive dysfunction and those with dementia, the most recommended tests are GPCOG (General Practitioner Assessment of Cognition), Mini-Cog or MIS.

► a diagnostic purpose, respectively a differential diagnosis. In this situation, longer-term cognitive tests are used, which capture a larger number of cognitive domains: ADAS-Cog Alzheimer's Disease Assessment Scale and Mo- CA, Montreal Cognitive Assessment.

► a purpose of monitoring the efficiency of the treatment (evolution of the dysfunction). To evaluate the effectiveness of a therapeutic intervention, it is recommended to periodically check (every six months) the evolution of cognitive performance, preferably using the ADAS-Cog test.

► a prognostic goal (estimating the evolution of the disease according to protective or risk factors). It should be noted that not all people with dementia-specific biomarkers will develop a mild cognitive impairment, as well as the fact that not all individuals diagnosed with Mild cognitive impairment will later develop dementia. Therefore, an analysis of risk and protection factors is also useful. Thus, it is considered that there is a higher probability that an individual will reach the stage of dementia, if he presents damage in several cognitive areas than in one. Another category of risk factors is the existence of comorbidities (anxiety, depression, diabetes, hypertension, obesity) associated with mild cognitive dysfunction. Also notable is the relevant genetic predisposition for dementia (the presence of genetic mutations - APP, PS1, PS2). Not to be neglected is the lifestyle and health that can influence the prognosis of mild cognitive dysfunction (sedentary lifestyle, smoking, alcohol, diet, isolation, lack of social relationships and intellectual activities, etc.).

For cognitive testing (examination of attention and concentration, temporal-spatial orientation, short and long-term memory, language or execution functions) standardized tools are used. Although there is no standard battery of neuropsychological tests for assessing cognitive function, the most widely used in the outpatient department remain MMSE (Mini Mental State Examination), 6-CIT (6-item Cognitive Impairment Test), GPCOG (General Practitioner Assessment of Cognition) , 7-minute Screen or Mon treal Cognitive Assessment (MoCA), clock drawing test. It is necessary that the interpretation of the scores of these tests take into account factors that may influence the outcome, for example the patient's level of education, the initial score of a previous assessment, sensory impairment, various psychiatric or neurological disorders. MoCA and especially GPCOG are particularly effective and useful questionnaires for detecting minor cognitive impairment, easy to administer, in about 5-10 minutes, by medical or non-medical staff, are validated for the outpatient environment, are not influenced errors related to the level of education, are not influenced by linguistic diversity or other cultural differences and do not require the payment of copyright.

Diagnostic staging

I. Establishing the diagnosis of neurocognitive dysfunction

- observing a cognitive decline compared to previous performance in one or more cognitive areas
- cognitive deficit does not occur as a result of delirium



- cognitive deficit cannot be explained by another mental disorder (depressive disorder, skiing)

suffocation, substance abuse, etc.)

II. Establishing the etiopathogenic type of neurocognitive dysfunction (caused by Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Wilson's disease, Huntington's disease, Creutzfeldt-Jak disease, a cerebrovascular disease, etc.)

III. Establishing the degree of severity of neurocognitive dysfunction (mild - difficulties in instrumental activities such as shopping, moderate - difficulties in basic activities such as dressing, eating, severe - with total dependence on the entourage)

IV. Establishing the association of behavioral disorders (mood disorders, psychomotor agitation, apathy, etc.)

The following arguments are eloquent for Alzheimer's neurocognitive disorder:

- genetic - the existence of genetic evidence / a relevant family history
- pathophysiological - highlighting β -amyloid accumulations, neuronal degenerations
- cognitive - affecting several cognitive areas
- behavioral - cognitive impairment is often accompanied by psychopathological disorders, especially mood
- functional - affecting the functionality of the individual in his daily activity
- evolutionary - cognitive decline is slow but progressive
- exclusion - other medical conditions were excluded that could explain the occurrence of cognitive decline

After establishing the diagnosis and initiating the therapeutic intervention, periodic evaluations of:

- the level of functionality are necessary
- the level of cognitive impairment
- behavioral and emotional mood changes
- comorbid medical conditions
- efficiency of the medication administered

8.4.4 Laboratory tests:

In order to avoid confusion between dementia and another condition with similar symptoms, it is necessary to perform certain laboratory tests to determine exactly what is causing the symptoms. The recommended hematological and biochemical parameters are:

► Usual tests: blood count, blood glucose, transaminases, markers of renal function (urea, creatinine), ESR, urine summary, thyroid function test (TSH, fT4), electrolytes (serum ionogram), cholesterol, triglycerides, determination of serum vitamin B12 levels, folic acid, homocysteine

► In some cases specific analyzes may be required:

- serological tests for infectious diseases: AIDS, syphilis, borreliosis, herpes encephalitis

- immunological tests for the diagnosis of systemic vasculitis
- toxicological tests (drugs, heavy metal poisoning)
- genetic tests (early familial Alzheimer's disease, fronto-temporal dementia, CADASIL)

► Evidence of biological markers for β -amyloid deposition (A β 42, your CSF protein)

8.4.5 Neuroimaging investigations:

In the field of basic research, highlighting biological markers for β -amyloid deposition (PET imaging for amyloid) or markers for neuronal damage (phosphorylated tau, atrophy in the temporal or hippocampal association area) using FDG-PET imaging techniques (Fluorodeoxyglucose-Positron Em Tomography), volumetric MRI or SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography), as well as the detection of synaptic dysfunction (FDG - PET, fMRI), contribute to the differential diagnosis between these three forms (normal cognitive function, MCI and dementia in the stage of onset), flattened into a clinical continuum. In the absence of biologically evaluable biological markers, neuropsychological assessment remains the gold standard for detecting impaired cognitive function.

Electroencephalographic examination (EEG) - may sometimes be required for the etiological diagnosis of dementia (suspected Creutzfeldt-Jakob disease or herpes encephalitis)

8.5 BENEFITS OF EARLY DIAGNOSIS OF DEMENTIA

Early diagnosis of dementia helps both the patient and family members by obtaining information about the disease, initiating appropriate treatment from an early stage, allows intervention on modifiable risk factors, setting realistic expectations and planning for the future.

Making an accurate diagnosis is extremely important because some conditions such as depression, thyroid disease, infections or drug side effects can sometimes produce symptoms similar to those of dementia. An accurate diagnosis can also be beneficial because some causes of dementia are treatable and totally or partially reversible, depending on the nature of the problem. A complex medical evaluation ensures the accuracy of the diagnosis and the establishment of appropriate treatment.

An early diagnosis involves maintaining the patient's independence for a longer period of time, actively involving the patient in treatment decisions, health care, and future planning. Allows the patient to make informed decisions about legal, financial and care aspects and to make known the wishes of family and friends. With a correct and early diagnosis, patients and their families can benefit from counseling and support. Families who understand the disease and the challenges that come with it are better able



to support the person with dementia and receive the right help. Early diagnosis is also extremely important for research. People with dementia can participate in clinical trials and other research to improve the diagnosis, treatment, care services and prognosis of this condition.

9.ALCOHOL AND THE BRAIN EXCESSIVE ALCOHOL CONSUMPTION - RISK FACTOR IN DEMENTIA



Alcohol is the most accessible and used drug due to the euphoric states it causes, although it has countless harmful effects on health. Although legal, alcohol, especially consumed in a frequent and excessive way, can cause chemical changes in the brain, like any narcotic. Regular consumption of a significant amount of alcohol is an important risk factor for the development of dementia of all kinds. , but especially the early one. Alcohol is a legal substance, with a wide availability, accepted by most societies, with the potential for abuse and acute and chronic toxicity. It has a depressing effect on the central nervous system, causing a decrease in neural activity. It also has an anxiolytic, antidepressant, relaxing and sedative effect, being used by many people who face anxiety, depression and insomnia. At the level of the brain, it acts on the dopamine-mediated pleasure centers. The amount from which the risk of alcohol problems increases is:

- ▶ in men 14 drinks/week or 4 drinks/day
- ▶ in women 7 drinks/week or 3 drinks/day

A standard drink (or “drink”) is defined as 12 g of pure alcohol and is equivalent to 330 ml of beer or 150 ml of wine or 30 ml of spirits (vodka, whiskey).

Studies have shown that of the more than 57,000 cases of early dementia observed in France between 2008 and 2013, more than half (57%) were directly attributed to alcohol-related brain injuries (18% being associated with excessive consumption), according to the study published in the journal *Lancet Public Health*. In addition, excessive alcohol consumption has been associated with a three-fold higher risk of dementia of all types. The link between dementia and alcohol requires further study, but it probably results from the fact that alcohol causes permanent brain damage.

It has also been found that a significant amount of alcohol consumption is frequently associated with:

- **hypertension**
- **diabetes and**
- **heart disorders,**

factors that “per se” are considered a major risk for stroke and dementia.

9.1 HOW ALCOHOL IS PROCESSED BY THE BODY

The body measures alcohol according to the amount of alcohol consumed. Because the liver cannot metabolize too much alcohol, the excess will be sent into the blood and the body will experience intoxication. When it senses the presence of alcohol in the blood, the brain releases dopamine, a neurotransmitter associated with the sensation of pleasure. The brain learns to associate alcohol with pleasure, and over time, after alcohol tolerance sets in, it needs increasing amounts to identify pleasure. If this practice is not kept under control, addiction leads to abuse. Once in the brain, alcohol acts directly on nerve cells and intervenes in synaptic processes, stopping any activity in the body, also having an effect on emotions, judgment, balance, memory, speech or anger level.

9.2 THE IMPACT OF ALCOHOL ON THE BRAIN

At the brain, alcohol acts on neurons in the ventral tegmental area (ATV), also known as the "pleasure center", stimulating the release of dopamine - the neurotransmitter of well-being by blocking a potassium channel called KCNK13, which is located in the membrane of neurons. which releases dopamine in ATV; when the canal is blocked, the neurons increase their activity and release more dopamine.

The KCNK13 channel is absolutely necessary for the alcohol to stimulate the release of dopamine from those neurons, without this channel the alcohol cannot stimulate the release of dopamine, the alcohol consumption being less satisfactory. Researchers believe that this KCNK13 channel may be an extremely important new target for drugs that could help those who are addicted to alcohol.

In addition to stimulating the activity of dopaminergic neurons, alcohol also enhances synaptic transmission mediated by GABA and Glycine; inhibits glutamatergic receptors and NMDA receptors, modulates the function of nicotinic acetylcholine receptors.

9.2.1 Brain structures affected by alcohol:

- cerebral cortex, causing impaired cognitive function and behavioral disorders.
- the frontal lobe, which plays an important role in the processes of planning, forming ideas, making decisions or activating self-control.

- ▶ the cerebellum, responsible for coordination, causing balance and coordination disorders.
- ▶ the hippocampus, affecting short-term memory or the ability to learn.
- ▶ the hypothalamus, causing disturbances in blood pressure and pulse, hunger and thirst and body temperature.
- ▶ spinal bulb, causing damage to vital cardiorespiratory centers.

Excessive alcohol consumption causes a neuroinflammatory response in the hippocampus and frontal cortex, neuronal loss and functional deficits, reduced hippocampal neurogenesis, loss of cholinergic neural phenotype and changes in the frontal cortex.

9.2.2 The effects of alcohol on the brain

- alcohol has a depressing effect on the central nervous system, its ingestion causing drowsiness, an effect depending on the amount consumed; Over time, alcohol changes the architecture of sleep, decreasing periods of deep sleep and increasing the number of awakenings during the night;
- under the influence of alcohol, emotions can become exaggerated: the consumer is excessively happy, expansive or on the contrary, cries easily;
- in the short term, alcohol has an anxiolytic effect, but the period of relaxation and mental comfort is short;
- influences the pleasure centers (dopamine-mediated) and the reward system in the brain, which partly explains the installation of alcohol dependence;
- acts on the production of opioid substances, which explains the analgesic effect;
- affects the hippocampus, with a direct impact on memory (the consumer no longer remembers what he did during consumption and immediately afterwards);
- increased blood alcohol level above 0.05% causes disorders of nerve activity in the frontal lobe and thus, difficulties in impulse control and decision making, decreased thought and judgment, reduced censorship;
- the effect of alcohol on the cerebral amygdala determines consumers not to realize that certain actions of theirs can have dangerous effects and thus scandals, violence, accidents can take place;
- the action of alcohol on the cerebellum leads to loss of balance, coordination of movements and instability of gait;
- when the alcohol level exceeds 0.04%, the functioning of the reflex centers in the brainstem that controls breathing, circulation, coughing, sneezing, swallowing can be inhibited, they become unable to regulate the vital functions of the body, in extreme cases death can occur;
- can cause Wernicke-Korsakoff syndrome by affecting the metabolism of vitamin B1, a deficiency that can lead to memory and mental disorders.

9.3 NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF ALCOHOL CONSUMPTION

Alcoholic dementia

It is caused, in addition to the direct toxic effect of alcohol, by multiple nutritional and vitamin deficiencies induced by chronic alcoholism, as well as by repeated craniocerebral trauma. It occurs in chronic alcoholics (former heavy-drinkers), after many years of degradation and social marginalization.

Stroke

Stroke is common in alcoholics; they may be hemorrhagic, embolic and thrombotic in nature and are due to the presence of hypertension, dyslipidemia, atherosclerotic disease and / or coagulopathies. The presence of a coagulopathy may also be responsible for the increased incidence of their subdural hematomas in those with craniocerebral trauma.

Symptomatic seizures (rum fits)

Alcohol-related seizures are usually generalized, without aura, shortly (6-8 hours) after the breakdown of alcohol consumption and may herald the onset of withdrawal.

Chronic alcohol use and its repeated interruptions lead to a lowering of the threshold for the onset of seizures. The risk of seizures is proportional to the amount of alcohol administered.

Cerebellar disorders

Alcohol intoxication leads to coordination disorders, changes in motor skills and causes balance disorders.

Alcoholic peripheral neuropathy

It is determined both by the direct action on the nerve fiber and by the indirect action by fictitious nutrition. In severe cases, the nerves that regulate the internal functions of the body can be affected. Symptoms may include: paresthesias, limb pain, muscle weakness, muscle cramps, heat intolerance, impotence, urinary incontinence, difficulty urinating, constipation, diarrhea, nausea, vomiting, etc.

Alcoholic amblyopia

This condition can occur in people with chronic alcohol use. Symptoms include visual disturbances, including scotomas, and decreased visual acuity beginning with the central portion of the visual field. The disorder is caused by the toxic effect of alcohol on the optic nerve, leading to optic neuropathy. Because alcohol causes depletion of nutrients throughout the body, alcoholic amblyopia is linked to thiamine deficiency, which leads to damage to the optic nerve. Alcoholic amblyopia is reversible if treated with proper diet and multivitamins, especially thiamine (vitamin B1). Untreated, it leads to irreversible damage to the optic nerve and loss of vision.



Effects on sleep

Alcohol is an stimulant that leads to sleep and maintenance insomnia, as well as fatigue, primarily psychically, during the day; decreases the REM (Rapid Eye Movement) period of sleep, ultimately causing sleep deprivation.

The occurrence of obstructive sleep apnea may be caused or aggravated by alcohol due to the inhibitory effect of alcohol on respiration and relaxation of the upper respiratory tract.

9.4 OTHER SOMATIC COMPLICATIONS OF ALCOHOL CONSUMPTION

The effects of alcohol on the liver

Liver toxicity to the liver is due to the preferential use of alcohol by liver cells as a "preferred fuel". Even a small amount of alcohol disrupts gluconeogenesis and causes the metabolism of certain carbohydrates in fats to bypass. Liver damage begins with steatotic transformation of the liver followed by alcoholic hepatitis, perivenular fibrosis and, in the last phase, by liver cirrhosis.

The effects of alcohol on the stomach

Alcohol promotes colonization of the stomach with the bacillus *Helicobacter Pylori*, leading to gastritis and ulcers.

The effects of alcohol on the pancreas

Alcohol can cause a decrease in pancreatic enzymes, causing chronic and acute pancreatitis. Recurrent episodes of pancreatitis manifested by exocrine and endocrine insufficiency can lead to diabetes mellitus, poor absorption and deficiency of fat-soluble vitamins (A, D, D2, E, K, F).

Cardiovascular complications

25% of patients with chronic alcohol use have some form of cardiovascular disease. Pathogenesis is primarily due to the toxicity of alcohol on striated muscle fiber leading to inflammation of the heart muscle, cardiomyopathy, arrhythmias and abnormalities of the left ventricle, toxic heart syndrome, hypertension, hyperlipidemia (which is the result of increased lipogenesis by oxidation alcohol).

Metabolic complications

- anomalies in the regulation of carbohydrate metabolism due to liver and pancreatic dysfunction.
- decreased brain protein synthesis, causing brain atrophy

Hematological complications: anemia (iron deficiency, B12, gastrointestinal bleeding), leukopenia, thrombocytopenia, coagulopathy

Neoplasm

People with chronic alcohol use have an increased risk of cancer of the aerodigestive tract (lips, oral cavity, tongue, pharynx, larynx, esophagus, stomach and

colon), breast, liver, bile ducts and lung cancer, alcohol having the role a co-carcinogen, i.e. potentiates the carcinogenic effect of other factors such as tobacco.

Nutritional complications

Alcohol is an important source of calories without nutritional value, being one of the major causes of nutritional deficiency. Factors contributing to nutritional deficiency are direct tissue toxicity, disruption of nutrient absorption and metabolism. Lack of thiamine (vitamin B1) leads to Wernike-Korsakoff syndrome, beriberi disease and polyneuropathy. Vitamin B6 deficiency causes neurological, hematological and dermatological dysfunctions. The decrease in the amount of folic acid and vitamin B12 is manifested by megaloblastic anemia and its associated neurological deficits. Decreased zinc is associated with dry and rough skin, mental lethargy, impaired taste and decreased appetite. Levels of vitamins A, B2, C, D, E, K, Mg, Ca, folate, phosphate and Fe are low in chronic alcohol users.

9.5 PSYCHIATRIC DISORDERS ASSOCIATED WITH ALCOHOL CONSUMPTION

- acute intoxication
- alcohol abuse and dependence
- sevraj ethanolic +/- delirium tremens
- alcohol-induced depression and anxiety
- alcoholic hallucinosis
- Wernicke's encephalopathy
- psihoza Korsakoff
- mild to severe cognitive impairment (alcoholic dementia)
- personality disorders

Personality disorders (antisocial, avoidant, borderline) are frequently associated with ethanol abuse. Prolonged consumption can lead to an organic personality disorder.

Anxiety and depression are present in 90% of chronic consumers, both during consumption and during the early/late serving period.

Suicide is much more common in people addicted to alcohol, by involving serotonin that mediates the aggressive-impulsive behavior of alcoholics. One in three cases of suicide is based on alcohol consumption.

Hallucinosis refers to opinions / impressions, whose authenticity the individual tries to test; he is worried about a possible infidelity of his partner, he often has a delusional idea of jealousy, he has ideas of persecution, of prejudice.

Alcoholic dementia .It represents the degeneration of the brain due to alcohol, the progressive degradation of the cerebral functions, in a first phase being disturbed the short-term memory, later, the evolution being towards aggravation, seriously affecting the quality of life of the patient.



Symptoms of alcoholic dementia:

- Inability to make decisions
- Irrascibility
- Inability to recognize people, places and things
- State of psychomotor agitation
- Mental confusion
- Memory disorders, Alcohol-induced persistent amnesic disorders
- False memories

Alcoholic dementias are differentiated from other dementias by early impairment of ethical and moral sense, by sexual disinhibition, immoral acts, crimes and forensic acts.

Wernicke-Korsakoff syndrome

The most common form of alcoholic dementia is Wernicke-Korsakoff syndrome, a combination of Wernicke's encephalopathy and Korsakoff's psychosis. This is caused by a deficiency of thiamine (vitamin B1), which occurs as a result of chronic alcohol consumption. Wernicke encephalopathy is a short-term condition that occurs in the first stage of this syndrome and poses a serious danger to the patient's life. Wernicke encephalopathy is followed by the second phase of the disease - Korsakoff's psychosis, which is actually caused by the damage caused by encephalopathy.

Korsakov Psychosis (Alcohol Deficiency Encephalopathy)

It is a chronic disorder that occurs in people addicted to alcohol, due to deficiency of thiamine (vitamin B1), a vitamin involved in alcohol metabolism. The patient is temporally-spatially disoriented and on his own person, he is not able to fix recent events, he reports events that did not happen due to memory disorders and difficulties in processing recent events (conspiracies), he has polyneuropathy. Evolution:

- for healing, under the conditions of alcohol abstinence and treatment with vitamin B1 (100mg 2-3 times a day for 3-12 months)
- to Wernicke's encephalopathy
- to alcoholic dementia
- Rarely to exitus.

Wernicke's encephalopathy

It is an acute neurological disorder due to thiamine deficiency (vitamin B1); it can progress to Korsakov syndrome (chronic disorder) or lead to death. The classical triad consists of disorders of balance and gait, disorders of the movement of the eyeballs (nystagmus, ophthalmoparesis) and altered mental status. Psychic symptoms: severe attention deficit disorder, concentration and memory, confusion, periods of apathy, drowsiness to numbness, which may alternate with psychomotor agitation and insomnia, delirium, hallucinations, confusion.

Alcohol dementia is triggered by chronic and abusive alcohol consumption combined with poor nutrition. Thiamine, which is part of the B vitamin complex, is

often lacking in the body of alcoholics, affecting brain function. It is found in foods such as whole grains, bananas, lentils and potatoes.

Treatment in alcoholic dementia

For the effective treatment of alcoholic dementia, it is important that it be diagnosed as early as possible, increasing the chances that the damage is still reversible, not permanent. First of all, the patient must give up alcohol consumption, but also adopt a healthy and nutritionally balanced diet. For the treatment of alcoholism, a drug treatment can be used to support the patient's efforts and help him get rid of alcohol addiction; Vitamin B1 (Thiamine) is also recommended, which can stop the progression of dementia, as well as Memantine, a drug that is usually used to treat Alzheimer's dementia, but which has also been shown to be effective in alcoholic dementia. partial recovery of brain functions and, especially, of memory. In cases where alcoholic dementia is detected in the early stages and treated, and the patient gives up alcohol, there is a good chance that brain functions will be fully recovered. On the other hand, in more serious cases, brain functions are permanently lost, and the patient and his family must accept and adapt to the new situation.

Alcohol





10.DEMENTIA PREVENTION

Preventing the deterioration of cognitive functions is a constant concern of researchers. Involvement in cognitive, physical, social activities reduces the rate of decline of our brain as we age. There are approximately 50 million people with dementia worldwide, and this number is estimated to increase to 152 million by 2050, especially in low- and middle-income countries, where about two-thirds live. from people with dementia. Dementia affects individuals, their families and the economy, with global costs estimated at about \$ 1 trillion annually.

The number of older people, including those diagnosed with dementia, is rising, with declining mortality, including infant mortality. However, the age-specific incidence of dementia has declined in many countries, probably due to improvements in education, nutrition, health care and lifestyle changes. In general, a growing body of evidence supports potentially modifiable risk factors for dementia, developed by the Lancet Commission in 2017, on dementia prevention, intervention and care: poor education, hypertension, hearing impairment, smoking, obesity, depression, physical inactivity, diabetes and low social contact. Currently, due to scientific arguments, three other risk factors for dementia have been added: excessive alcohol consumption, traumatic brain damage and air pollution. An updated dementia prevention model with 12 risk factors was developed. Together, the 12 modifiable risk factors account for about 40% of dementias worldwide, which could therefore theoretically be prevented or delayed. The potential for prevention is high and could be higher in low- and middle-income countries, where dementia occurs more frequently.

It is considered that it is never too early and never too late in life to prevent dementia. Early risks (under the age of 45), such as lower education, affect cognitive reserve; risk factors of middle age (45-65 years) and later life (over 65 years) influence cognitive reserve and trigger neuropathological developments. Culture, poverty and inequality are key factors in the need for change. The people who are the most private need these changes the most and will get the most benefit.

National initiatives are needed to prioritize the education of all children, public health programs that promote reduced alcohol consumption, smoking cessation, proper nutrition, regular control of systolic blood pressure (during the average life should aim at 130mm Hg or less to delay or prevent dementia) and glycemic values (especially those with predisposed hereditary position), as well as maintaining physical, social and cognitive activity in adulthood and old age. Sustained exercise during the middle life and possibly in the afterlife protects against dementia, probably by reducing obesity, diabetes and cardiovascular risk. Political decision-makers should also step up measures to improve air quality, especially in areas with high air pollution. Using hearing aids seems to reduce the risk of hearing loss.



Three prevention strategies can be distinguished:

Population prevention, prevention in people at high risk and secondary prevention. All three strategies are necessary and complementary. The population strategy is, in particular, essential for reducing the overall incidence of the disease, because its objective is to reduce risk factors at the population level, through changes in lifestyle and the environment that affect the entire population. This type of strategy is best achieved by establishing ad hoc policies and interventions at the community level. Strategies aimed at reducing overall risk at the individual level include primary prevention strategies for high-risk individuals and prevention. secondary. The first are addressed to healthy people belonging to the upper area of the risk distribution, and the secondary prevention are addressed to patients with organ injuries or installed diseases (stroke, CBT, hypertension).

Prevention refers to policies and people. Contributions to the risk and mitigation of dementia begin early and continue throughout life, so it is never too early or too late. These actions require both public health programs and personalized interventions that should be targeted especially at high-risk groups. Recommendations:

- Specific actions for risk factors throughout life
- Aim to maintain systolic BP of 130 mm Hg or less in middle age (from the age of approximately 40 years (antihypertensive treatment is the only effective preventive drug known for dementia)
- Encourage the use of hearing aids for hearing loss and reduce hearing loss by protecting your ears from excessive noise exposure
- Reduce exposure to air pollution
- Prevent head injuries, various craniocerebral injuries
- Limit alcohol consumption, as alcohol abuse increases the risk of dementia
- Avoid smoking and support smoking cessation, as this reduces the risk of dementia even later
- Provide all children with primary and secondary education
- Reduce obesity and control diabetes. Support physical activity both in adulthood and in old age
- Addressing other risk factors for dementia, such as sleep, through lifestyle interventions, will improve overall health.
- Addressing inequality and protecting people with dementia
- Many risk factors are grouped around inequalities, which occur especially in minority ethnic groups and vulnerable populations. Addressing these factors will involve not only health promotion, but also social action to improve the circumstances in which people live their lives.
- The incidence of dementia is higher in low- and middle-income countries due to an aging population and the higher frequency of potentially modifiable risk factors.

10.1 Primary and secondary prevention of cognitive decline and dementia through intervention on modifiable risk factors . Possible brain mechanisms for improving or maintaining cognitive reserve and reducing the risk of potentially modifiable risk factors in dementia

Risk factors in early life (education), middle age (hypertension, obesity, hearing loss, traumatic brain injury and alcohol abuse) and later life (smoking, depression, physical inactivity, social isolation, diabetes and air pollution) may contribute to increasing the risk of dementia. There is conclusive evidence for all of these risk factors, although some late-life factors, such as depression, have a two-way impact and are also part of the dementia prodrome.

Education and cognitive stimulation

The higher level of education of children is considered to reduce the risk of dementia, due to the increase in general cognitive ability, along with education, before reaching a plateau in late adolescence, when the brain reaches its highest plasticity; there are relatively fewer additional gains with education after the age of 20. This suggests that cognitive stimulation is more important at the beginning of life.

Hearing impairment

Hearing loss is a major risk factor for cognitive decline and dementia, probably due to reduced cognitive stimulation. The WHO threshold for hearing loss is 25 dB. A cognition was recorded at each 10 dB reduction in hearing, which continued below the clinical threshold (below 25 dB). Studies have shown that hearing impairment (measured by audiometry) is associated with a greater reduction in the volume of the temporal lobe, including in the hippocampus and entorhinal cortex.

Craniocerebral trauma (CBT)

Severe CBT has been found to be associated with hyperphosphorylated pathology in the hippocampus, increasing the risk of dementia at 1 year, and the risk has remained high, although attenuated over 30 years. Minor and moderate CBT has a lower risk of dementia compared to severe or multiple CBT. A cohort study of elderly adults with concussion found that the risk of dementia doubled; It is also interesting that those who took statins had a 13% lower risk of dementia compared to those who did not have statins, suggesting that statins may alleviate brain edema caused by injury, oxidative stress, protein aggregation. amyloid and neuroinflammation.

High blood pressure

Persistent hypertension in middle age is associated with an increased risk of late dementia, regular physical activity, healthy diet, optimal blood pressure (<120 / <80 mm Hg, cholesterol and normal blood sugar), compared to people with at least one of these risks, had a risk of less than 10 years for vascular dementia and Alzheimer's disease It has been found that in people with persistent systolic blood pressure of 130 mm Hg or higher, from a mean age of 45 to 61 years, the risk of dementia is increased even if they do not have cardiovascular disease, compared to those without hypertension. Median



hypertension, defined from the age of 40, has been associated with reduced brain volume (atrophy) and white matter hyperintensity, but not with amyloid deposition. The use of hypotensive drugs has revealed a reduction in the risk of approximately 10%. Studies have also shown that there is no difference between classes of hypotensive drugs in terms of reducing the risk of dementia or cognitive decline. It has also been reported that statins administered to the elderly at risk of vascular disease do not prevent cognitive decline or dementia, do not reduce the risk of death, physical disability or cardiovascular disease.

Vascular disease of the brain, in the pathogenesis of which long-lasting hypertension occupies an important place, leads to structural changes in microcirculation in brain tissue, which causes chronic ischemia, small strokes that destroy the substance, structural damage of white matter (B syndrome)) and scars, all of which disable nerve pathways essential for thought, memory and learning processes. The beneficial effects of blood pressure control have been confirmed in the incidence, complications and mortality of cardiovascular, renal and ocular diseases, but the SPRINT study is the first to highlight a direct link between hypertension and dementia and is the first study to report a effective reduction of the risk of progression in all forms of dementia through antihypertensive therapy. Early detection of these lesions in the brain could determine the therapeutic interventions needed to lower blood pressure in these patients, either through medication or through lifestyle changes (smoking cessation, physical activity, low-sodium diet, rich in vegetables and fruits).

Antihypertensive therapy, which targets a systolic blood pressure below 120 mmHg, reduces the risk of mild cognitive impairment (MCI) by 19%. Also, by strict control of hypertension, the frequency of lesions in the cerebral white matter was reduced. What is even more promising is that all forms of dementia, including Alzheimer's, were reduced by 17% in patients who could be brought to systolic blood pressure values below 120 mmHg, compared to patients whose systolic blood pressure persisted at higher values.

In the group of patients at risk for Alzheimer's dementia or with clinical forms of predementation, those who could be effectively treated with antihypertensive medication and had the desired reduction in systolic pressure (below 120 mm Hg), maintained consistently for more than three years, have shown a 17% reduction in the incidence or progression of the disease, greater than that ever achieved by any thiamyloid medication.

The main objective of the treatment of the hypertensive patient is to obtain the maximum reduction of the total risk of long-term cardiovascular morbidity and mortality. This requires the treatment of all identified reversible risk factors, including smoking, dyslipidemia or diabetes, as well as the appropriate management of associated clinical conditions and the treatment of hypertension per se. If possible, BP should be reduced to below 140/90 mmHg in all hypertensive patients with an indication for treatment and even lower if adverse reactions allow. In diabetic patients,

antihypertensive treatment should be more intensive, with a therapeutic target of <130/80 mmHg proposed. If possible, the same target value is recommended in subjects with installed cardiovascular disease.

Physical inactivity vs. exercise and fitness

Physical activity studies are complex. Physical activity patterns change with age, generation, and morbidity and differ by gender, social class, and culture. Studies suggest a relationship with the potential to reduce the risk of dementia, with the WHO recommending at least 150 minutes of exercise a week to adults. They can be planned exercises, cycling or usual activities.

Meta-analyses of longitudinal observational studies lasting 1-21 years have shown that exercise is associated with a reduced risk of dementia and there is compelling evidence for physical activity that protects against clinically diagnosed Alzheimer's disease. At least weekly, moderate / intense physical activity was associated with a reduced risk of dementia. People could stop exercising due to prodromal dementia, so inactivity can be either a consequence or a cause or both in dementia and could be a higher risk for those with cardiovascular morbidity.

Diabetes

In 2017, diabetes was reported as a risk factor for dementia, being associated with an increased risk for any type of dementia, the risk increasing with the duration and severity of diabetes. Distinguishing between treated and untreated diabetes as a risk factor for dementia is difficult in observational studies. The effect of different diabetic drugs on cognitive outcomes or dementia remains unclear; no protective effect of metformin for dementia was identified and no impact on cognitive decline or dementia was observed. General type 2 diabetes is a clear risk factor for the development of future dementia, and intensive diabetes control does not necessarily reduce the risk of dementia.

Dyslipidemia

The relationship between elevated plasma cholesterol and atherosclerotic vascular disease meets all causal criteria. A 10% reduction in total plasma cholesterol causes a decrease in 25% of the incidence of coronary heart disease, and a reduction in LDL-cholesterol of 1 mmol/l (~ 40mg/dl) determines a 20% reduction in coronary events. There was also a strong relationship between low HDL cholesterol and vascular risk. Elevated plasma triglycerides signal the need to look for other factors that may be associated with the so-called metabolic syndrome. In general, total plasma cholesterol should be below 5 mmol / l (190 mg / dl) and LDL-cholesterol below 3 mmol / l (115 mg / dl). Statin treatment is recommended in all CVDs and in most diabetic patients, regardless of baseline, but also in patients with cerebrovascular disease or peripheral arterial disease. The statins reduce not only hyperlipidemia, but also cardiovascular events and mortality, and in maximum doses stop the progression and even induce the regression of atherosclerosis. For this reason, they must be used as first-line agents.



Excessive alcohol consumption

Excessive drinking is correlated with brain changes, cognitive impairment and dementia, being strongly associated with cultural patterns and other socio-cultural and health factors. Studies have found that alcohol use disorders (harmful use or addiction, as defined in the DCI) have been associated with an increased risk of dementia, especially for early-onset dementia for years). Low to moderate alcohol consumption is associated with a reduced risk of dementia compared to alcohol abuse. Consumption of less than 21 units of alcohol per week (1 unit of alcohol = 10 ml or 8 g of pure alcohol) could be associated with a lower risk of dementia, and for consumers of more than 21 units per week, there was an increase in risk of 17%.

Weight control and obesity

Excess weight is a current and constant concern, with evidence supporting the relationship between increased BMI and dementia. Studies in overweight and obese adults without dementia, with a mean age of 50 years, found that weight loss of at least 2kg in people with a BMI over 25 was associated with a significant improvement in attention and memory.

Obesity is becoming a global epidemic in both children and adults. It is currently estimated that over 1 billion people worldwide are overweight and over 300 million are obese. More than a third of children are overweight or obese. Excessive adipose tissue is associated with an increase in the production of free fatty acids, with hyperinsulinism, insulin resistance, hypertension and demie dyslipis. In particular, excessive central (visceral abdominal) adipose tissue has been shown to be strongly associated with metabolic and cardiovascular risk. The BMI body mass index has been used extensively to define body weight groups [$\text{kg} / \text{height (m)}^2$], using classifications suggested by the National Institutes of Health and the WHO. In adults, overweight is defined by an increased BMI, ranging from 25 to 29.9 kg / m^2 , and obesity by a BMI $\geq 30 \text{ kg} / \text{m}^2$. Voluntary weight loss in obese patients can reduce or prevent many risk factors associated with obesity. Reducing total caloric intake and regular exercise are essential for weight control. Improvement in central adipose tissue through exercise is likely to occur just before weight loss.

Behavioral and cognitive-behavioral therapy are helpful for weight loss when added to diet and exercise programs. Behavioral changes have also been shown to be useful in maintaining weight loss.

Overweight drug treatment

Orlistat inhibits intestinal lipases, preventing hydrolysis and absorption of lipids. Weight loss is generally modest and gastrointestinal disorders can occur. This product should be used in combination with a complete and balanced diet. Sibutramine increases the feeling of satiety after food intake through the effect of its metabolites, which inhibit the uptake of norepinephrine and serotonin. Both contraindications and side effects are appreciable. Rimonabant is an endocannabinoid receptor inhibitor that induces modest



but sustained weight loss in combination with a caloric controlled diet. . May improve glucose tolerance, beneficially influence lipid metabolism.

Smoking

Smokers have a higher risk of dementia than non-smokers and have a higher risk of premature death before the age at which they could have developed dementia, with some uncertainty about the association between smoking and the risk of dementia. Quitting smoking, even at older ages, reduces this risk. Globally, it is estimated that 35% of non-smokers and 40% of children are exposed to secondhand smoke. It was found that in women between the ages of 55 and 64, exposure to secondhand smoke was associated with memory impairment, with the risk increasing in proportion to the duration of exposure.

Practical aspects: smoking prevention and management

Assessment of smoker-non-smoker status should be made on each occasion. All smokers should be encouraged to stop smoking. There is no age limit for the benefits of smoking cessation. All smokers should be professionally encouraged to give up all types of tobacco once and for all. The 5 A can be useful:

A - ASK (research): systematically identify smokers at all times

A - ASSESS: Determine the person's addiction and their willingness to quit

A - ADVISE (Advised): Unequivocally urge all smokers to quit smoking

A - ASSIST: Agree on a smoking cessation strategy, including counseling, nicotine replacement therapy and / or pharmacological interventions

A - ARRANGE a schedule for subsequent visits

Quitting smoking is a complex and difficult process, as this habit induces a strong dependence, both pharmacological and psychological. Quitting smoking can be facilitated by providing specialized assistance. The firm and explicit recommendation of the doctor to stop smoking completely is the most important factor for starting the smoking cessation process. Assessing the person's willingness to try to quit smoking, briefly reiterating cardiovascular and other health risks and agreeing on a specific plan with the establishment of subsequent visits, are the first decisive steps in clinical practice. and essentials of initial counseling. Both individual and group interventions can be helpful in stopping smoking. The involvement of the family in the smoking cessation process and the determination of other smoking family members to quit smoking with the patient are very useful. Nicotine chewing gum and transdermal patches have been widely used to help people who quit smoking overcome the difficult times of the first weeks or months. Antidepressant medication has been shown to be effective in long-term smoking cessation nortriptyline may be helpful in this process. Another novel pharmacological agent that may be useful is varenicline, an acetylcholine nicotine receptor agonist. In long-term smokers, varenicline treatment was associated with a smoking cessation rate of 23% at 1 year, compared with rates of 15% and 10.3% in the bupropion and placebo groups, respectively.



Depression - is associated with the incidence of dementia, having a wide variety of psychological mechanisms

Depression is also part of the prodrome and early stages of dementia, and a reverse causal relationship is possible, whereby depressive symptoms result from the neuropathology of dementia that occurs years before the onset of clinical dementia. It is believed that sometimes the symptoms of psychological distress can predict dementia, and at the end of life, these symptoms increase the risk of dementia. One study considered the effect of treatment with selective serotonin reuptake inhibitors, such as citalopram, known to reduce the formation of amyloid plaques, and found that the progression to clinically diagnosed Alzheimer's disease was delayed. Thus, people treated with antidepressants perform better than those who are not treated.

Social contact

Social contact is considered a protective factor, as it improves cognitive reserve and encourages beneficial behaviors, although isolation may also occur as part of the dementia prodrome. Several studies suggest that lower social contact increases the risk of dementia. Thus, lifelong single people, unmarried or widowed, have a higher risk of cognitive decline, compared to married people. High social contact (social activity and social network) was associated with better cognitive function in old age. The evaluation of socialization is done using the social contact scale which has five basic items: marital status, communication with family members, contact with friends, participation in community groups and paid employment. It was found that the score is linearly associated with low risk of dementia, the highest score on the five-point scale decreases by 46% the risk of developing dementia.

Polluted air

It is considered that air pollution and fine polluting particles have a negative impact on health in general, but also on the brain, accelerating neurodegenerative processes through cerebrovascular and cardiovascular disease, A β deposition and processing of amyloid precursor proteins. High concentrations of nitrogen dioxide (NO₂), carbon monoxide and fine pollutants are associated with an increased incidence of dementia.

Sleep

The mechanisms by which sleep can cause dementia are not very clear, but sleep disorders have been linked to β -amyloid (A β) deposition, reduced activation of glymphatic elimination pathways, a low degree of inflammation, Tau protein gain and cardiovascular disease. Sleep disorders refer to a short or long duration of sleep, poor sleep quality, circadian rhythm abnormalities, insomnia and obstructive sleep apnea. All of these disorders were associated with a higher risk of dementia of all types, including for clinically diagnosed Alzheimer's disease, compared to no sleep disorder. An association between sleep duration and the risk of mild cognitive impairment or dementia has been reported, with higher risks of dementia of less than 5 hours compared to more than 5 hours and less than 7 hours and more than 10 hours of sleep, and the risks

for dementia. The postulated mechanisms of reduced sleep that lead to the accumulation of Alzheimer's disease are incompatible with the evidence that both more and less sleep are associated with an increased risk of dementia. Late-onset sleep disorders, a few years before clinical dementia, may be part of the natural history of mental illness and may be a risk factor or reflect other disorders (mood disorders or cardiovascular disease). The use of hypnotics has been found to be associated with a higher risk of dementia, regardless of sleep duration.

Diet

Observational studies have focused on the role of micronutrients in brain health and dementia (folate, B vitamins, vitamin C, D, E, selenium) as potential protective factors. It was found that the Mediterranean diet (high intake of vegetables, legumes, fruits, nuts, cereals and olive oil, low intake of saturated lipids and meat) could influence the risk of dementia by protecting against excessive risk of cardiovascular risk factors. Studies suggest that the Mediterranean or Scandinavian diet may have value in preventing cognitive decline in people with intact cognition, especially as a component of a healthy lifestyle. A healthy diet involves:

- Wide variety of foods
- Adjusted caloric intake to prevent excess weight. Encouraging the consumption of fruits, vegetables, cereals and wholemeal bread, fish (especially fatty fish), lean meat, skimmed milk products
- Replacement of saturated fats with monounsaturated and polyunsaturated fats (vegetable and marine)
- Reduced salt intake in hypertensive subjects

Ensuring well-being is the goal of good and correct care of dementia. People with dementia have complex problems and symptoms in many areas. Interventions should be individualized and take into account the person as a whole, but also the caregiver of the patient with dementia. Psychosocial interventions adapted to the patient's needs have been shown to be effective in managing neuropsychiatric symptoms.

10.2 RECOMMENDED STRATEGIES TO REDUCE THE RISK OF DEMENTIA

The risks are particularly high in the most socially and economically disadvantaged populations, including black and minority ethnic groups.

At the level of the entire population

- Prioritize the education of all children
- Implementation of public health social policies that reduce the risk of high blood pressure in the entire population
- Developing policies that encourage social, cognitive and physical activity throughout life




- Checking the risks of hearing loss throughout life, to reduce the risk of exposure to this risk factor
- Reducing the risk of severe brain trauma, including occupational and transportation
- National and international policies to reduce public exposure to air pollution
- Continue to strengthen national and international efforts to reduce smoking exposure

At the individual level

- Treatment of hypertension with the aim of a systolic BP <130 mm Hg in middle age
- Use of hearing aids for hearing loss; people should be encouraged to wear hearing aids because many find them unacceptable, too difficult to use or ineffective
- Avoid high alcohol consumption (21 or more alcohol per week)
- Prevention of head trauma if a person is at high risk
- Quitting smoking is beneficial regardless of age
- Reducing obesity and controlling diabetes through diet and physical activity
- Maintaining physical activity until the end of life

By applying these strategies and following the recommended rules, the risk of dementia is reduced by about 40%. Therefore, it is considered that avoiding or delaying cognitive decline and dementia by intervening on potentially modifiable risk factors should be a national priority for public health.



Research shows that there are many ways we can train our brain functions. At any age we can start practicing because there is no age limit until we can learn something new. It's all about turning these exercises into habits of everyday life!

Simple tips and methods for improving memory:

● Squeeze your right fist

Experts claim that if you clench your right fist while learning, this habit can help memory. Ruth Propper of Montclair State University conducted a study and looked at how body movements influence brain function. The research found that the best combination for improving memory was when participants clenched their right hand before memorization and then formed their left fist to better remember the words learned.

● **Sleep** - One of the benefits of sleep is that it improves memory, strengthens memories, restructures and reorganizes them.

● Take a walk, exercise

Studies have shown that it is enough to walk only 10 kilometers a week to keep our memory functioning properly. Moderate physical activity helps to improve memory immediately, not only in the elderly but also in young people, as it contributes to a better connection between the brain areas that perform this function, 10 minutes of "easy effort" can determine "considerable cognitive benefits". Short periods of moderate exercise have been shown to increase the connection "between the dentate gyrus in the hippocampus and the cortical areas related to detailed memory processing."

Generally, exercise is recommended for at least 30 minutes / day. But why is it also useful for the brain?

- sports have the effect of producing an increased amount of endorphins in our body; endorphins are neurotransmitters that help reduce pain and stress

- regular exercise is accompanied by an increase in serotonin - another chemical messenger that contributes to general well-being

- during physical exertion, the supply of blood and oxygen to the brain increases, with beneficial consequences on memory.

● **Ignore stereotypes** - a 2003 study found that when older people are reminded of these stereotypes related to aging and natural memory loss, they are even beginning to perform poorer on memory tests.

● **Read** (books, magazines, posts on social networks). Facebook posts have been found to be easier to remember than sentences in books, probably due to the fact that Facebook posts are written in a spontaneous, simple and natural language that is easier to assimilate.

● Quit smoking, quit alcohol

Although the physical benefits of quitting smoking are already well known, we must not overlook the fact that there are also benefits to memory; smoking affects memory, but giving up this harmful habit can restore normal cognitive functions.

- **Use beneficial natural products**



The smell of rosemary essential oil has been shown to improve memory in the long run. Consume natural products with a beneficial effect on memory: turmeric, Ginkgo biloba, Ginseng, Roinita, Schinful.

- **Lose weight**

Excess weight is often associated with memory problems, and weight loss can help restore cognitive function.

It was found that the performance obtained by memory test participants improved after weight loss.

- **Shut down the computer and enjoy peace of mind**

Even when we are inactive, the brain continues to perform important functions related to memory, this break helping to consolidate memories.

- **Socialize as much as possible**

Social interactions help fight mental illness. Studies have found that socialization has as strong effects as mental exercises on brain stimulation and memory consolidation. Moreover, lack of socialization can lead to depression and other mental health disorders. A conversation offers the chance to do exercises of thinking, memory, evocation, activates logic, critical thinking, emotional connections and knowledge consolidation.

- **Build a puzzle**

Solving a puzzle brings at least 3 advantages observed by researchers:

- train the brain functions: visual perception, mental rotation, cognitive flexibility
- helps better control of stress and emotions by keeping focused attention in one direction
- improves working memory: our ability to retain data for short periods and which dictates most of our actions

- **Learn something new**

It has been found that acquiring a new skill improves brain activity (tailoring, photography)



digital, a new computer program, how to repair an object)

- **Teach someone else what you know**

Explaining someone involves exercising one's ability to reason, to evoke memories

- **Expand your vocabulary**

Improving your mother tongue vocabulary is another way to practice your memory, a way to stay in shape cognitively.

- **Listen to music**

The “Mozart effect” is already known, which summarizes the beneficial effects of music on the functions of the brain, on our ability to argue logically.

- **Learn a new dance**

Learning and reproducing the steps of a new dance accelerates the ability to process information and memory, and the socialization involved in practicing a dance also has beneficial effects.

- **Use all your senses**

At any moment our brain receives information that we perceive with the 5 senses: sight, hearing, smell, taste and touch; and for memorization the involvement is multisensory. Researchers claim that working memory is multisensory, being a system through which the brain encodes and retains information from all our senses.

- **Meditation or daily prayer**

Practicing daily meditation / prayer reduces stress and anxiety, but also increases the brain's ability to process information; Exercising attention, focusing the senses and thinking in a certain direction, activates all regions of the brain: cortical, subcortical and even the white matter and the older regions belogenetic. Meditation is an active mental process that can even cause structural changes in the brain; they have been highlighted with the help of modern technology (RMN) in people who have practiced meditation for a long time.



Interreg - IPA CBC Romania - Serbia



Cooperation beyond borders.

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by the European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and co-financed by the partner states in the Programme.

Project title: “Healthy aging and Dementia - better life”, eMS: RORS-241
Material editor: Resita County Emergency Hospital
Publishing date: June 2021

**The content of this material does not necessarily represent the official position
of the European Union**

In case of any complains contact: romania-serbia@mdrap.ro

www.romania-serbia.net

